

Cranthemum

Cal. tub 5-partitus. Cor. 5-fida. Tubo medio curvato. Capsula polysperma

1. angustifolium L. foliis linearibus parvis, spaciis elongatis, bracteis oblongis mucronatis, calyce longioribus
2. parvifolium L. foliis ovato linearibus imbricatis
3. sulfoloides L. foliis filiformibus carnosis, floribus racemosis pediculis, bracteis sermis subulatis

66.

~~40~~  
~~50~~

Cranthemum.

Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Tubo medio curvato.  
Caps. polysperma.

angustifolium 1. Eranthemum foliis linearibus sparsis, <sup>patentibus</sup> spicis elongatis, bracteis oblongis mucronatis calycis brevioribus. solitariis

Thymelaea aethiopica speciosa glabra foliis longioribus angustis Plukenet. mant. 100 t. 449. f. 6.

Thymelaea foliis angustissimis linearibus; flosculis speciosis Burm. afr 130. t. 47. fig. 3.

Selago dubia; racemo simplici, foliis linearibus alternis, floribus diandris Lin. Spec. pl. 877.

Eranthemum angustifolium; foliis linearibus patentibus Lin. Syst. Veget.

Habitat in Cap. bo. Spec. 5.

Caulis erectus; alternatim ramosus, glaber. Folia integerrima. Spiculae terminales, simplicissimae, erectae. Flores alterni, solitarii, superne imbricati, inferne remotiusculi. Bractea solitaria, rigida, caninata, concava. Corolla tubus filiformis et calyx persistentes; cylindrici, quinque-dentati, quinque sulcati, bracteis longitudine fere aequales. Corolla tubus filiformis, recurvus, bracteis duplo longioribus parvis, quinquefidatis; laciniis inaequalibus, obtusis. Antherae duae sessiles superne in tubo linearibus. Capsula linearis, longitudine calycis, monosperma

Spec. Selag.

~~Carunza Turf~~

~~Serratula amara Carunza Rumph. h. aeth. 5. 7. 170. fig. 1~~

~~Habitat in India orientali herb Turf.~~

~~Cal. 2 valvis, valvula altera parum minor. Cor. 1 petala, calycis brevioris lobo inferiori  
re latiore. Stamina duo eodem lobo inserta. Germen superum. Stylus 1. Baccula  
calycis tecta 2 valvis, bitoculari, polysperma, Dissepimento ovali parallelo.  
male a Lin n. ad Scutell: indicam relata~~

parvifolium. 3. Eranthemum foliis ovatis linearibus imbricatis, bracteis ovatis Berg. Cap.  
2. Lin. Syst. Veg.

Indica africanae arbor foliis, glutinosus; flore spicato alba. Comm.  
Amst. 2. p. 119. t. 60.

Habitat ad Cap. b. spei 5

Rami teretes, striati, inferne cicatricibus striati. Folia acuta, carinata  
4n, glabra, sessilia, sit unguiculata. Spica terminalis, cylindri-  
ca, sessilis, bipollicares. Bracteis acuta, carinata, glabra. Cor-  
olla tubus bracteis longior. Berg. l. 6. t

Habitatio fruticosa Thunb.

~~Folia lanceolata, spicis longis, bracteis oblongis  
numerosis calyce longioribus~~

1 angustifolium Eranthemum foliis linearibus remotis pediculis S. V. p. 57. 2.

Valerianoïdes parva, foliis in caule raris, spica in summo caule oblonga  
ex foliolis et flosculis confectis composita Razi sup. pl. 245

Valeriana africana fruticosa, foliis ericis Commel. hort. 2. pag. 221. Tab.

111. ?

Thymelæa æthiopica spicata glabra, foliis longioribus angustis Planch  
man. 100. t. 445. f. 6.

Thymelæa foliis angustissimis linearibus, flosculis spicatis Burm  
afr. 130. t. 47. f. 3.

Selago? racemo simpliciter, foliis linearibus alternis, floribus diadems  
L. Sp. pl. pag. 077. 0\*

Habitat in Æthiopia t<sup>h</sup>

Caulis erectus, alternatim ramifera glaber. Folia <sup>parva</sup> ~~confecta~~, linearia, integerrima  
<sup>spicis</sup> ~~racem~~ simpliciter, terminalia longissima, erecta. Flores <sup>æthemis, dictans,</sup> ~~superne~~ imbr-

cati inferne remoti <sup>foliis</sup> ~~foliis~~. Bractea oblonga, rigida, acuta, carinata  
concaro. Corolla tubus filiformis, <sup>recurvans</sup> ~~longa~~ bractea triplo longior, limbo <sup>##</sup>

partito laciniis inaequalibus obtusis. Calyx cylindricus <sup>perispermis</sup> ore 5 dentato quin  
que sulcato longitudine bractea. Anthera duae sessiles superne in tubo linearis

Stigma simplex Capsula linearis longitudine calycis monoperna

verte

foliis linearibus

racem

# parvo

*Eranthemum angust.*

Calyx tubulosus angulatus quinquefidus bilabreatus lobis proaequalibus  
Corolla inserta pedala infero hypocrateriformis tubus linearis superne crasso  
infero limbo quinquefidus laciniis oblongis, inaequalibus  
antheris binis linearibus <sup>planis infero</sup> faucibus tubi sessiles.  
Stylus l. filiformis

fructus sub nomine oleae

Calyx maris

Corolla campanulata 4-fida faucibus villosis laciniis ovatis  
saepe antheris quibus bifidis

in herbario hermanni confer. *Justicia procumbens strepera*  
*Eranthemum aegyptiacum anthoxanthum indicum Bobakia*

capense *Eranthemum* foliis lanceolato-ovatis petiolatis S.V. p. 57. 1. Fl. Zeyl. 19. Amoen. ac.  
385. Sp. pl. 12.

*Ephemerum*, Lychnidis flore, africanum Herm. parad. 153. Amm. herb. 232.

*Pentaurium minus*, foliis oblongis acutis, flore patulo puniceo majori

Raji suppl. 527.

Habitat in Othiopia

Herba facie Phlogis, Lychnidis aut ~~Mirabilis~~

<sup>opposita</sup>  
Folia ~~inferiora~~ oblonga utraque acuta petiolata, integerrima, acuta, veno-  
sa, pilosa, pilis adpressis; inferiora oblonga utraque acuta ~~capollitana~~  
nerv. petiolum granum decurrentia. Petiolis folio duplo brevior, superiora rotundio  
ovalia brevissime petiolata. Caulis angulatus, superne bifidas terminatus  
Pedunculis ~~basis~~ <sup>longis</sup> elongatis, villosis. Flores ~~in spicati~~ pauci dichoto-  
mis superne crassiores. Spica terminalis solitaria pauciflora. Bractea  
~~ovato-lanceolata~~, elongatis, <sup>imbricatis, pediculis</sup> acuminatis, intra singulas flos. longus  
purpureus facie phlogis, bracteis longior

Corolla et fida an existat hujus generis

Balsoloides 1 Eranthemum ~~foliis carnosis, teretibus, flexibus racemosis pedunculatis~~  
~~foliis carnosis filiformibus, floribus racemosis pendulis~~

~~bracteis ternis subulatis~~

Eranthemum Balsoloides; foliis carnosis teretibus linearibus glaberrimis, racemis axillaribus calycibusque pubescentibus; tubera curvo Lin. Suppl. 82.

Habitat in Teneriffi circa oppidum St. Cruz # ~~frequentia, pollicaria, sessiflora~~

Bractes foliis & imillimus Salzole: folia sparsa, filiformia, interrima, <sup>glabris</sup> racemi terminalis ramorum pubescentes. Bractes <sup>uniquilobis</sup>

tres subulata ad singulum pedicellum. Pedicelli reflexi. Calyx quique partitus: laciniis subulatis. Corolla tubus calyce longior: laciniis limbi orato, acuminato.

# Rami teretes, glabri, a cicutis foliorum tuberculati.



*2 parvifolium* *Cranthium* foliis ovato linearibus imbricatis L. V. p. 583. Berg. fl. Cap. 2.  
mont. 171.

Frutex africanae eni foliis, glutinosi, flore spicato albo Commel. Amp.  
2. p. 119 Tab. 60

Habitat ad Cap. b. spicity

Rami teretes & nati inferne creaturibus scabri. Folia ovata canna  
40 glabra, sessilia ut unguiculata. Flore <sup>in</sup> spicati termi  
natis cylindricis & pistis bipolliciaris. Fructus ovato  
cincto canna glabra. Tubus corollae haecum longior  
Berg.

non videtur

*Sporium* & *Eranthemum*? *Sporium*; foliis ovatis oppositis, stipulis spinosis, floribus laterali-  
bus solitariis Laur. fl. Cochinch. 1. p. 19.

Habitat ad Mozambic

Partis suffruticosus, pedalis erectus. Folia parva, integerrima pilosa  
Flores dilute violaceae, pedunculati. Cor. tubus filiformis basi cur-  
vatus. Laur. l. c. +

Vix hujus generis, planta obscura

vix Epanth. an Caranga species vel Capraia  
an huc

3 folioloides *Eranthemum* foliis carnosis terdistichis linearibus glaberrimis, racemis axil-  
laribus calycibusque pubescentibus, tuborecurvo l. v. p. 58. 4. Suppl. pag. 82.  
Habitat in Barrancas circa oppidum St. Cruz &

~~Index foliis simillimus *Salsola*. racemi terminali racemum  
pubescente. bractea & adnatum pedicellum. pedicelli reflexi.  
Calyx quinque partitus pubescens laciniis subulatis. Tubus  
corollae calycis longior in medio curvatus. Lacina limbi  
ovata acuminata l. v. foliis <sup>intelligimus</sup> parva. Capsula polysperma~~

foliis filiformibus carnosis filiformibus, floribus racemo-  
sis pendulis bracteis ternis subulatis

Rami teretes, glabri, tuberculati & cicatricibus foliorum. Folia pollicaria linearia  
frequenter sessilia, parva glabra. Racemi terminaliter. Pedunculus pubescens.  
Folium parvum ad basin pedicellum: pedicelli unguiculato pubescente

ex herb. Banks. & ~~Banks~~ 7us.

*Eranthemum capense* quod est  
Ruelliae.