

Erica

baleari Erica foliis linearibus serrulatis floribus umbellatis; Calycis ovato ^{campanulatis globosis} equante

102 Thunb. Desf. pag 52. n. 307

Erica africana glabra fruticosa arbuti flore Sch. mus. 1. p. 32. t. 21.

Erica baleari antheris cristatis, corollis globosis campanulatis vertice
Sep. 3
Stylis inulps, foliis ternis imbricatis Lin. Mont. 233. + S. V. p. 366.

Habitat in C. b. ^{Erica atque ceteris not. infra folia notatis}

ut in omnibus
fere

Frutex glaber, erectus pedalis. Ramis verticillatis et sparsis subsistis
gatis ^{maxime} ramulosis. Folio quaternis ^{plernumque} ^{et reliquis} obtusifolia margine scabra,
imbricata uncinata. ^{ramulorum} ^{tergentes} ^{et} ^{longis} ^{terminalibus} ^{binis} ^{ternis} ^{pedunculatis}
ti nutantes. Pedunculi incarnati longitudine foliorum
bracteis binis lanicolatis alternis concavis carinatis, incarnatis
tis. Calycis foliola, ovata corollam aequantia ^{fructum} et color
re bractearum. Corolla sanguinea glabra magnitudine
Pep. Anthera basi bifida flava, laciniis divaricatis lanicolatis
Stylusque inulps

anthera v. fo

46 viscaria *Erica foliis* ^{trigona} ^{glabris}, floribus ^{racemosis} ^{campanulatis}, ^{glutinosis} Calyce ^{rediv-}
^{pubescente} Th. Desf. pag. 29. n. 40

Erica viscaria: antheris multicaulis inclisus, corollae campanulatae glutinosae,
foliis quaternis floribus racemosis Mant. 231. & S.V. p. 368.

Habitat in C. boissierii

Caule bipedali et ultra erecto. Ramis et ramuli verticillati 3-4-5

glabri. Folia quaternaria in ramis fere, adpressa imbricata, apice
incurva femiunguicularia sulco longitudinali. ^{multicaulis} ^{glabra} Flores racemosi ad
apicem ramorum, sanguinei. Pedunculi breviter bracteati foliis
linearibus structura foliorum vix differunt. Calycis foliola ovata
acuta, glutinosa glabra. Corolla glabra femiunguicularis
antheris multicaulis longitudine germinis. Stylus inclisus ^{racemosis}
Conger. Germinis pilosissimum.

Thunb. igitur differt ramis ^{albo} fere tomentosis, racemi in medio
ramulorum. Pedunculi tomentosi, bractei pallidi folioli
calycinis staminibus ciliatis Corollae minoribus corolla
etiam tamen majori quam habet figura in

an mea potius pulchella Thunb. corolla quoad figuram sat conveniunt
differt

Thunb. forte spec. differt

59 Sparmanni *Erica* ^{ortus} foliis oblongis ciliato-serratis, floribus ^{tubuloso} campanulatis, ^{calycibus} ~~calycibus~~

Erica Sparmanni ~~Bot.~~ Lin. in Act. Holm. 1770. p. 24. t. 2.

Erica Sparmanni foliis quaternis imbricatis ciliatis capitulis trifloris corollae tubulose frangosa hepudis, antheris multatis
 Lin. Suppl. p. 219. p. V.

~~*Erica dentata* la Mart. ^{Erica}~~

Herbitat in Cap. bono spici

Caulis erectus, sesquipedalis, ^{subtus} ~~canalicatus~~, glaber, ramis semis ramulosa

folia sub floribus
 ovata acuminata
 margine membranaceo
 dense imbricata

caulis ^{subtus} sulcatus, lineam vix longa inferioribus longioribus
 sepe versus ^{interdum corolla marginem excepto} margines ^{per se pilis} punctato muricata. Flores in capitula
 terminali ^{quatuor} ~~calycis folioli linearis subulata remote~~

folioli calycis
 spatulata superne
 frangosa ciliata

~~ciliata corolla triplo periantha~~. Corolla valde frangosa scabra
 purpureo unguiculatae latiniis ovatis obtusis. Capitulum
 antequam flores elongantur globosum echinatum inftar aethy
 rasti dis apparet ex patentiis semis setulatis foliorum involu
 cri et calycis hinc.

Antheris multatis intus stylus exsertus stigma nullo
 folioli calycis spatulati
~~anthera diversa a Thunb. cum parum credit a Desfont. Thunb.~~

semulata L. foliis ovatis denticulatis glabris calycibus linearibus ciliatis glabris floribus
terminalibus tubulosis stygosis
Enca denticulata

Habita in capite b. spec. La Martz

Rami verticillati scabri, venosi. folia parva Enca Sparmanni om-
nis. flores 3 vel quatuor terminales sessiles rami vero apice in capitulo
umbonato unisofato ut in illa nec folia suprema latiora calycis denique
foliola linearia carinata d. p. punctis nonnullis mucronata nec stygosa
marginis denticuli carnosii foliorum ~~compositis et~~ f. ciliatis serratis

85 obliqua linearis foliis oblique sparsis tenuibus truncatis glabris Th. d. p. 44. Tab. 1. *

Habitat in montibus cap. b. sp. 7

Caules filiformes, caulis ^{glabris elongatis} truncatus, glaber, superne scaber, pedalis. Rami dichotomi simpliciter, subsessili. Folia oblique sparsa circum ramos, in petiolo attenuata, basi imbricata, apice patenti recurvata, subsessilia, semivivipara. Flores terminalis umbellati, plurimum visiosi, pubescenti. Peduncululi purpurei foliis triplo longiore. Bracteae 3. solitariae in medio, paulo superius. Ovis oppositi, minime, patentes. Calycis foliola linearia, brevissima patentia, obtusa. Corolla globosa; ore acuminato, contracto, purpureo. Anthera et stylus inclusis Th. Tab. 1. c.

peduncululi elongati

~~floribus corollae contractae~~ floribus ^{ovatis} umbellatis

articulans

67

~~articulata~~ Erica foliis ovatis glabris, floribus racemosis caule erecto.

Thunb. Desf. p. 37. n. 584

Erica articulans: antheris inflatis, corollis ovatis acuminatis, stylo intulso calycis longiore foliis ternis Lin. P. V. p. 366.

Habitat in C. b. frei. 7.

Caulis ^{erecta, cespitosa} fuscus inferne glaber pedalis: Rami et ramuli fastigiati verticillati, ^{cespitosi} ~~patentes~~ tenuis sine villosi. Folia ternis, adpressis, inter nodorum longitudine, ramos quasi articulatos formantia, ^{glabra} lineam longa. Flores ^{longitudines per ramum} distincti cernui. Racemus pollicari ^{vel} digitalis, compositus. Pedunculi capillares, purpurei tenuissime villosi, longitudine foliorum bracteae minuto, purpureo.

^{subnervosa}
calycis tuberculati
corolla parum brevior
folia ovata ^{causati}
acuta

~~calycis foliata acuta intus concava, extus carinata
superiora purpurea, ciliata, glabra, corolla dimidio brevior~~
corolla campanulata, glabra sanguinea. Antheris anfractis

Stylusque intulsi

foliis linearibus

articulans Thunb. an podium - vix minus Lin. et vice versa

reperminansi Eriua foliis linearibus glabris, floribus racemosis caule erecto

regimenans
articulans

62

foliis longis (ovatis Thunb)

ovatis campanulatis

Erica foliis ovatis glabris, floribus racemosis, caule erecto Thunb.

Desf. pag. 37 n. 588

Erica ^{regimenans} ~~articulans~~ ^{antheris} ~~articulans~~ ^{ovatis} ~~articulans~~ ^{corollis} ~~articulans~~ ^{ovatis} ~~articulans~~ ^{acuminatis}, stylo inclusis calyce
^{acutis lobis} ~~articulans~~ ^{racemosis} ~~articulans~~ ^{foliis} ~~articulans~~ ^{ternis}. ^{non} ~~articulans~~ ^{l. l. pag 366 Mant. 2327} ^{l. l. pag 364}

Habitat in Cap. b. spec 7

Caulis pedalis erectus glaber. Rami et ramuli verticillati longi pube
scentes, fastigati. Corolla terna, glabra supra concava subtus con
vexa fusco longitudinali adpressa longitudine interstitiorum, ^{longe longioribus} rami
bus quasi articulatis formantia, lobes axillares sicchi e medio ramu
lorum, pro de apicem ^{in medio} ~~interstitium~~ interruptus ^{longe} ~~interstitium~~ ^{racemosis} ~~interstitium~~ ^{ovatis} ~~interstitium~~ ^{acuminatis} utraque
longitudine foliorum. Bractea minuto purpurea. Calycis lobula
ovata, intus concava, extus carinata, fusco purpurea ^{ovatis} ~~subtilata~~
glabra corolla dimidio breviora. Corolla glabra sanguinea. Anthe
ra ariditate stylusque inclusis ~~Thunb.~~
cognoscitur facie articulata ramorum antheris cum filamentis
connatis ut filamentum potius aristatum apparet quam anthera
quod sequitur foliorum mea diffat a iua.

71
Strigosa Cnicus foliis linearibus pubescentibus ciliatis, corollis campanulatis glabris

Hort. Kew. 2. p. 17. *

Habitat in Cap. b. Speitz

Rami villosi pubuli. Folia quaternis, a cibus patentia, villosiuscula, petis
longis raris apice glandulosis ciliata, viridians. Flores in ultimis
ramulis axillares. Pedunculi sesquilineares. Bractea tres, lineares
minuta, caduca. Calycis foliola lanceolata, villosa adpressis, lineam
longa. Corolla campanulata pallide rubens, calyce fere duplo longior
tubus parum ventricosus limbi lacine obtusa. Anthera inclusa
anastata. Stylus corolla paulo longior H. Kew. l. c.

Si Schumackeri vera faciem habet arborea. Ramuli oppositi, vel terni
Calycis ciliatis

granulata Erica. foliis linearibus glabris, floribus umbellatis globosis calyce integro
lori

Habitat in Cap. bono spei Schumacher.

tota glabra. ~~Tota~~ ex inferne ~~obduro~~ gummi flavesciente variegatis rami et ramuli
filiformes sparsi rami saepe trichotomi folia triquetra internodiis longio-
ra foliis tenuissimis exarata. Flores terminales pedunculati plures. Calyx
pedicellus minutus solidus ovatis. Corolla magnitudine seminis corandri, globosa ore
longitudine calicem ~~contracto~~ ^{retracto}. Anthera ^{involupta} globosa superne anfrata. Arista sa horizontalis
nursuosa ^{fiens} ~~fiens~~ ^{dicantates} ~~muticatis~~, radium sedecim ^{radia} ~~radia~~ ^{an} ~~formantes~~ ^{purpurea}
fles filamenta alba. Stylus involutus. Stigma planum ^{involupta}

foliis quaternis
an rubens Thunbergii cui anthera crispata

75 Florida *Eriæ foliis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis, calycis villosi reflexo th.*

Des. p 40 Tab. 64

Habitat in Cap. b. spec 5

Caulis purpureus, superne villosus, flexuosus, erectus, pedalis. rami laci, virgati
subsimplices. Folia curvata patenti-erecta, semiunguiculata. Pedunculi
capillares, sanguinei. Corolla calycina linearia, obtusa. Corolla globosa pallide
sanguinea, inflata, glabra. Anthera et stylus inclusus Th. l. c.

52 glandulosa Enea foliis linearibus glandulosis pilosis, floribus clavatis glabris, calycibus
hispidis Mart. de J. p. 25 *

Habitat in Cap. b. p. 5

Folia obtusa, supra plana, subtus profunde sulcata, imbricata, lineam longa.

Calycis foliola ovata, breviflora, pilis capitatis viscidis hispida. Corolla sanguinea
pollinaria. Anthera inclusa. Stylus exsertus Th. l. c.

non vid.

umbellata Erica foliis linearibus subciliatis, caulis floribus racemosis campanulatis
calycibus subciliatis

Habitat in Cap. b. p. Schumacher f.

Rami pubescentes. Ramuli flexuosi sparsi, vel terni. Folia ~~in~~ angusta
suprema venis p. ciliata subtus convexa in p. vix p. ex arata
flos ex apice ramulorum per ramulos per majores sparsim, pedunculati
pedunculis medio bibracteatis. Calycis foliola ovata minuta subtilis
p. ciliata. Corolla parva. Anthera ~~in~~ hispida globose anthera ^{bina} ~~minuta~~
Stylus longitudine stamenum

foliis quaternis

Indes elegans floribus copiosissimis ^{late} purpureis

angulata Erica foliis oblongis glabris, floribus terminalibus campanulato tetragonis
glabris

Erica pentandra Schum. & Nees octandra

Habitat in Cap. bonae spei Schumacher & glabra ramulis fastigiatis
facies Blonis, ^{et monophyllis} rami virgati filiformes albo cuneati. Folia minuta, ovata
vel oblonga adpressis brevissima longitudine inter nodosum, trigonum crasi-
fer acute cuneata abque fultis obtusiuscula. Flores pedicellati nutantes
calycis foliola ovata, minutissima glabra. corolla vix bilobata pallide
purpurascens. Anthera ^{mutica} inferne angusta basi subaristata aristis ^{muticis}
vix conspicuis utraque in acumine obtusissimo utraque producta. Stylus
erectus

4-5 Facies Blonis articulata et flavina plura quam quatuor an igitur
converte

Tongona Erica foliis oblongis ~~triquetris~~ glabris, floribus terminalibus sessilibus aggregatis ^{erectis}
calycibus imbricatis

Habitat in Capite bono spei Schumakeri.

Index humilis caule muricato e caelo ramulorum. Rami et ramuli ^{erecti} breves ^{et} ^{quaterna} ^{confert} ^{et} ^{rimo} ^{pro}
frequenter varii flexu curvati. Folia ovato-oblonga ^{longissima} ⁱⁿ ^{bilinearia}
subtus convexa, sulcis exarata, superiora fere seta albida terminata. Flores
in apice ramulorum, solitarii sive gemini pollicares. Calyx e sequeis
trifloris imbricatus. Squama tres ovato concava, carinata semun-
guiculari, acuta rigida. Calycis foliola bracteis similibus at longioribus
corolla calycis duplo longior rigida laciniis ovatis acutis erectis.
Filamenta longitudine tubi. Anthera oblonga obtusa mutica extra
corollam. Stylus antheris longior et clavatus.
affinis E. Retwenii