

Enca

Lycopodium Linnæus

Habitat Cap. b. p. herb la Marche

Rami rufi, glabri e capi foliorum manuatis

ompullacea E foliis lanceanbus trigoni mucronatis reflexis, floribus ampli
carum umbellatis subquaternis, laevis et volle obtusis
Enia *ompullacea* foliis ciliatis mucronatis, bracteis colora-
tis, floribus umbellatis subquaternis erecto-patentibus
style effuso Rust. bot. major. no 303
Habitat in Cap. b. ppi.

non vidi

~~Lanx~~ Lanca

Habitat in Cap. l.-fci. lert la Manche
Calycer ovati mucronati. Andata
ar fructuosa.

Encia

Encia coni folio. 2. Pls: hist. 1. pag. 2.

Habitat herb truf.

Tutte ramosa pinnata, inferne glaber, superne villosa - canescens. Tota 4 ne
lineans, glabra. Calyx imbricatus, villosus, crenatus. Flores terminalis ramorum,
quaterni, cylindrici. Stylus exsertus. Anthers exstato

habeo

Erica

Erica orientalis; cori folio, floribus globosis Tournef. Cor.

Habitat in Oriente.

Trinitatis ramis ramulosis, brachiorum, fructuosa, ramuli sope $\frac{3}{3}$ - 4 vesticellati, cor
vire cinereo glabro. Tolia 4^{na} subfusca, adpresso, internodorum longitudi
ne lata, nitida, subtus sulcata et levigata. Flores laterales, fructuosi. Anthera mutica,
exserta, uti fugit.

Enia

Enia conis folio Vta Clus hist.

Enia tenuis, per inter vallis ramuli 10. Baum. p. 486

Habitat herb. mef

Caulis ram opifinii, glaber : rami et ramuli præpi, ramuli villoso, Solan
leneana, glabra, umbellata, Verona. Umbella terminalis, 5queflora

Calyx semplic. foliola lanceolata, obtusa. Styles exsertus. Corolla

4 fida

10. *axillaris* Entra foliis Virginis glabris, floribus racemosis globoſis, ramis Vomentosis Thurat. Diag. p. 16+

Habitat in C. bone spic.

Caulis erectus, glaber, pedalis. Ramis ~~fructuariis~~ oppositique, ~~tomentosi~~ ramosi. Folia erecta
et nodis paulo longiora. Flores axillares, solitarii, pedunculati minuti. Anthers
et stylis inclusis Th. l. c.

16 pasjenio Enca foliis ovatis glabis, floribus pubfolianis, calycibus tomentosis Thunb.

Obs: p. 18. n. 16 *

Enca pasjenio Mont. in Act. Upp. vol. 2. p. 289. t. 9. fig. 1.

Enca pasjenio Antheni metris inclusi, corollis campanulatis, pistillo exerto, foliis oppositis lvs. Script. pag. 221. * S. V. p. 367.

Habitat in C. b. spic.

Paucis erectis inferne glabris, superne tomentosis. Rami albo tomentosi.
ramuli breves. Solaia terna, obtusa, incavata, adpresso, inter nodos brevia-
ra, linearis longa. Petioli brevissimi tomentosi. Flores in ramulis latera-
libus terminali solitari et bini, pedunculati, erecti. Pedunculi albo
tomentosi, angustulares. Palyx foliola basi coherentia, ovata, albo-
tomentosa. Corolla campanulata rubra. Anthera metrae styligae
melupus Thunb. Herba pasjens Enca odis Thunb

Bryanthia Erica foliis ovatis ciliatis, floribus paniculatis, caule decumbente
Thunb. Des. pag 15. n^o 8

D

Andromeda Bryanthia Lin.
var. m. Androm.

novit

glandulosaErica foliis oppositis fragisque linearibus ciliatis glandulosis Thunb.
55 Duf. pug 32 n. 40.

andromeda droseroides Lin

⁸⁷
graphalodes Enca foliis ovatis inteynis glabris, calyx bracteisque navicularibus
coloratis Thunb. des. p. 45 n. 95

Enca africana unedonii flore Plut. m. ant. 60. t. 346 fig. 11.

Enca graphalodes: anthemis austrii corollis ovatis teethis, stylomini
so foliis serratis, stigmata quadripunctato Lin. s. V. p. 366.

Habitat in P. b. sprei

folius glaber, erectus, spathaceous. Rami et rameuli dichotomi et tricho-
tomi filiformes, erecto-patentes, fastigiat. Sola Vera, adpresso
longitudine internodiorum, rameulos exoscarculatos formantia
Flores in ultimi rameis terminalis, subterminali purpurei
Bracteo calyx approximata, navicularis, purpurea, venis
fine ciliata. Calyx foliolo purpureo adpresso corollo
longitudine. Corolla campanulata glabra. Anthos inflato
stylosque in superfl. l. c.

Lutea Cneia foliis lanceatis hispidis, floribus umbellatis, calyci fabro nudi
64 Thunb. Dis. p. 36. no 56.

Habitat in Cap. b. fructu

Caule erectus glaber pedalis. Rami et rami parvi vixati. Siliqua terrena
acuta fibra a marginibus revoluta fibra, ciliata, imbricata-pa-
tentia, pubescens ulana. Flores terminalis, incarnati. Calyx folio
la ciliata ad presa corolla duplo breviora. Corolla ovato-globosa
puberula. Anthers andate stylus que metaper

66 *breicolor* *Erica* foliis ovatis scabiosis, floribus ternis terminalibus glabris, calyxis villoso-colorato
Th. 2d, p 367

Habitat in Cap. b-pet.

Paucis flexuoso cunctis; Cineroso sublumentosus, sputhamoneus. Rami ramuliferi
gat: vel simplices, & Olia villoso, margine revoluta, umbonata. Flores ter-
minales sanguinei, copiofi per fructum. Calyxis stola ovata, & pre-
subtenuis, corolla diffuso breviora. Corolla campanulata glabra. Anthers
suboblongo. Stylus exstans Th. l. c.

rubens Enia foliis linearibus integris glabris, floribus umbellatis globoſis, calyce lanceolato
breve, rameis glabris Thunb. Des. p. 494

76 Habitat in Cap. bona fructuosa

glaber, purpureo-purpureus, fructuosa. Rami et ramuli lachotomi, filiformes
fastigati. Sola supra plana, subtus convexa adpressa, via extenuata exan-
ta. Flores terminales sanguinei, globosi; magnitudine pepers. Pedunculi
capillares, purpurei rotundatos. Calyx foliola vnde purpureo-purpurea
supra plana, subtus convexa. Anthera et stylus in tufa Th. I.

me amato Enia foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyci integris,

ramis ramos Thunb. Dis. p. 50. n. 84 *

97

Habitat in Capri bono perit

Caules rotundifolios, pedunculi et ultra erecti. Rami et ramuli
virgati erecti. Calea tereta, obtusa integrata, glabra ad pressa, longi-
tudine interadiorum, lineam dimidiam longa. Flores terminales
foliarii terni vel plures. Pedunculi curvatae, folius duplo longius
res. Bractea lanceolata, concava, virgantes. Calyxis foliola lanceo-
lata, integrata glabra ad pressa, purpurea, corolla quinquepolobrevio-
ra. Corolla oblonga campanulata alba semiviridulans. An-
thers ex parte inclusi. Styles longitudine corollae non extensus
fragmatae obtusus. Differt ab E. rubente corolla ~~globosa~~, foliis
longioribus. a mammosa cui valde simili anthers ex parte
foliis tenuis Thunb.

² pulchella Leda foliis sene lanceolatis, floribus axillaribus tubuloso-campanulatis Thunb.

Des. p. 22. Tab. 4.

Habitat in Cap. bono frici

glaber, pedales, erectus. Ramii verticillati, simplices erecto-patentes. Solia oblique
verticillata, integra, glabra, supra plana, subtus convexa, tubula, erecto-patentea
internodis multoties longiora, unguiculata. Flores breve pedunculati, puberulicini,
frecosi, horizontales. Bractea foliacea in pedunculo. Palycus foliola linearis
lanceolata, adpresso, viridia, corolla triplo breviora. Corolla apice dilatata
- tenuissime villosa, crassa purpurea, unguiculans: ore obtuso, laciniaeque
reflexae. Anthro incolpo. Stylus exsertus Th. l. c.

racemoso Enia folio lanceolatis vellosi, floribus raeemosis globosis, calycibus

53 Dumentosif Thunb. Des. p. 31 n. 47 +

Habitat in C. bono freii

Caulis exstans pedalis et ultra. Rami verticillati elongati, divaricati
erecti, pubescentes. Ramuli breves, per intervalla praesae. Solaqua
terna, obtusa. Subtus pilosa, hispida, patentia lancea longa. Sola
in ramulis substitutantes incarnatae. Racemi subdistichae, rotoli
casi usque digitales. Pedunculi capillares vellosi, cornuti,
constrictio corolla. Calyx foliola ovata, obtusa, mucrona
de praesae, brachypina. Corolla sub ore rotula obtusa. Antho-
muthia oblonga exserta. Stylus exstans staminibus longior
differt at L. purpurea fructuante caule erecto a vagante foliis
vellosi, a mediterranea foliis vellosi corollaque globosa.
a hinc floribus racemosis Thunb. l. c.

urceolaris Enia foliis ^{Cunean} Lanceolatis pubes ^{Urticaria} Verrucosis, floribus pubescentibus villo-

Endo pentaphylla *anthemis*. *anfracta*, *corollis campanulatis*, *stylo*
incluso, *foliis ternis floribus pubescentibus* Linn. S. V. p. 364.

Enca agerana fruticosa, juniperifolia, flore varicolore breviflora
mo Feb. Thes. p. 32. t. 21. fig. 2.

Enea unicolor Berg.

Habitat in Cap. 6. preit

Habitat in Cap. S. p. 3
Carica flexuosa erecta cinerea pedalis. Ramis rameulisque
erectis cinereo vellosis feliformibus sparsi frequentibus rovatis
folia lenea - lanceolata, supra convexa plana, marginibus revolu-
tis fimbriata, supera ^{lanceolata} ^{longiora} ^{lanceolata} tuberculata, ^{lanceolata}
flores pubescentes umbellati incarnati, toti hispiti
flexuoso ramulorum Guianula. Flores pubescentes umbellati incarnati, toti hispiti
brachiosum attilla pedalis, calyx, corolla. Calyx soleola lanceolata corolla
num 3'erni pedunculi. Duplicata breviora corolla leneam longa. Anthers anfracto stylis,
late, pedunculi breves. Antri floribus valde hispiti et pilosis, rubris et in
basi bracteis 2 minutis inclusis. Vari. I floribus valde hispiti et pilosis, rubris et in
carnato albidis Thunb. &c.

octophylla Ericia foliis octonis laevis but truncatis sparsis, floribus umbellatis
34 Corollis cylindricis clavatis vix exsertis Thunb. Des. p. 44. n. 72 + Tab. 3.
Erica fasciculans antheni ans statis corollis grossi, stylo inclusis, floribus
fasciculatis, foliis pluribus linearibus truncatis ha. sept. p.

2194 S.V. p 365

Habitat in Pap. b. p. 1

Potus glaber per daliis rami s. dit rotundis, simplicies. Oboezi patent: veru
rata, in bractea disticha unguicularia. Petioli pallidi, folio
dimidiis breviori. Flores terminales plenim ^{erecti} proceps, pur
purei pollinari. Calyxis coddolla ^{erecta} s. Calyxis foliolis
concreta glabra ad pressa corolla multo his breviora. Anthos
anstate stylusque inclusis Thunb. pedunculi valloso rugosi

cernua Enæa foliis ovatis ciliatis, floribus capitatis, calycibus ciliatis Thunb. Des. f. p. 52 +
104

Monte art. Lep. v. 2. p. 291. t. 9. f. 3. mala

Enæa cernua foliis quadrangulis, stylis inclusis, corolla ovata, calyx ciliatus, flori
bus octonis terminali. See Super. p. 22.

Habitet in Cap. bono pecc. ^{lauri} velofoli incani

Tell. glaber, brunnescens, pedalis. Phoenicea sparsa et Verni. Leiformis; ramule

pi. folia ^{inferiora leucanica} umbonata. Bouche & ^{reniformis} crenata ciliata

glabra concava inornata. Calyx ^{calyx} formatus, acutus ciliatus

flores terminales. Corolla ovata, globosa, inornata, glabra. Anthera et stylus inclusi

foliariae generis. vel Th. l. e. folia ramorum inferiorum longiora ferre canescolator

neuris

ciliati superiores ovati

inferioribus leucanibus calycibus umbonatis filicatis floribus

capitatis nudant

Vetralia Enca foliis quadratis oblongis ciliatis pubescentibus tomentosis, floribus umbella
77 tis, calyci ciliato tomentoso.

Enca decima Tertia Clus. h.

Enca ex rubro nigricans sepania Baeh. pen. 486

Habitat in Europa paludibus

Enca tetralix: antheni anfractis, corollis ordinis stylis inclusis, foliis quadratis
ciliatis, floribus capitatis Lin. L. V. p. 36 s. Bl. Dan. t. 81.

Habitat in Europa paludibus cespitoso.

Intrailes fruthamous, virginatis basi decumbens festuoso erectus. ramis
ramuleque cinereo tomentosi. folia oblonga acuta, ciliata, patentia in
ternodis breviora. Flores terminalis cunctis decem pedunculatis cernue
calyx foliola lanceolata corolla erato purpureo cincta glabra
Stylei anthera crepitate inclusa. Stylus suberectus, stigmate caputato

Erica cinerea foliis lanceolatis interius glabris, floribus umbellatis ovatis, ^{flabi} Calyx ^{pubescens} foliolato
ramis villosis Thunb. des. p. 51 n. 85 &

90 Erica cornifolia B. Blush. I. p. 43.

Erica humilis, cortice cinnereo, arboreo flore Bach. Pl. 406.

Erica foliis aceris glabris vernis, corollis oblongo ovatis flaminibus longiori
bus vestitu allato racemoflo. Locfl. t. 137.

Erica cinerea: anthers infatu, corollis ovatis, stylus pubescens foliis vernis, thy-
mate capitato Lin. S.V. p. 366. 8L Dan. t. 30.

B. Erica vernis per inter valla ramulis

Habitatio est Montes regales, Hispania pedalei erectifolii

Pales Er. tetralix ~~et glabra~~ ^{regiae semperales} Paules flexuosa ^{rami alterne et verni} rami alterne et verni
longiora atro-erecti. Ramuli pubescentes remota pubi, cader fibris
squantes brescios. Dolia lanceolata, imbricata troquetta canata. Flores

est connivere ^{in apice ramorum 2 vel plures cernui, violacei. Calyx foliolata} atillus ^{armata pubescens} lanceolata glabra. Corolla ore contractiore. Anthers cunctate
incluso stylis non extra corollam prominent

Thunbergia En'a foliis linearibus glabris, floribus umbellatis, corollo tubo globoso,
limbo campanulato Thunb. d.s.f. p. 14. n. 4 *

En'a Thunbergii Monin Act. Uff. v. 2. p. 290 tig. fig. 2. mala

En'a Thunbergii. antheni mediterranei medicinariae, corollis plenis: tubo globo
so, stylis ex proflo, foliis vernis Lin. Suppl. pag. 220 *

Habitat in C. bona fide?

Totya glabra
rami alaterni, conferti cauli similes. Sola acuta, fultus convexa
fuleo longitudinali, ad proflo, longitudo inter nodosum. Flores
glabri, pedunculi sanguinei, unguiculati. Bractea
duo alterno lanceolata, conava flava. Calyx foliata ovata
acuminata nigra & conava flava. Corolla valvula sanguinea.
Tubus calycis paulo brevir. Lobi laevius ova obtusa.
Stylus laevis brevir. Theab

Collected

Williani Enia foliis ovatis ciliatis, floribus axillaribus ^{secundis} campanulatis in calyci
basiliatis Thunb. des. p. 19. t. 19.

Enia xii. Plut. h. 1. p. 46.
Enia hispida anglica Baum. Pin. 486.

Enia foliis ovatis ciliatis ternis, corollis ovatis apicet tubulosis integris
canibus verticillato racemosis Loeffl. s. p. 503.

Enia ciliata: antheni mediis inclusi, corollis ovatis grossis, stylis et
fistulis ternis racemis secundis Lin. s. V. p. 368.

Habita in Gallia, Hispania, Aragonia

calycibus que

Caulis de deminutis ramos levissim pedalestenuis ramos rami alter
ne elongati superne pilosi ramuli oppositi vel alterni fere quin
pollicare rotente. Solia approximata parva ovata ciliata
margine parum reflexa fistulis canescens supra glabra floris
apicis ramorum brevissime pedunculata alterno frequente parvissimi
foliola duos oppositos parva in pedunculo calycis pilis super longo ciliatus
stylus corolla ciliata flamma inclusa

ovato oblongo.

umbellata Enca foliis trigonis ciliatis, glomeris umbellatis campanulatis, ^{oblongis}
erecto Thunb. Des. p. 14 n. 6. *

Enca umbellata: a nthemis multis exerto, corollis campanulatis, style
extato, foliis ternis acerosis Lin. S. V. pag. 369. Speci: pl. pag. 501+

Habitat in Hispania, Lusitania;

Index seque pedalis rami glaber. Ramis erectis longis ramulis ter-
nis oppositis ^{conspicua et spicigera} glaberrimis ^{imbricata}. Solea glabra obtusifolia depre-
cata. Longitudine interstitionum falcata et arcata. Solea pedunculata
in ramulis, terminalis plenemque quinque vel 6 erecti pedunculatis
foliis duplo longioribus ^{nervis} equalibus. Solea calycis lancolata can-
dens latiora depreca corolla dimidiis longior. Corolla oblonga.
Anthers bofi gibbosor ~~cavato~~ exerto. Stylus antheri paululum lon-
gior. Bractea tres fructuorum caulis decidua ad basim caly-

foliis lanceolatis glabri, corollis oblongo-campanulatis

an multiflora herb. Vall. hinc potius no
tamen cedo

Trollia Enda foliis oblongis his pedis; floribus variegatis; calycibus ciliatis Therab. des. f. p. 187

Habitat in *C. bonplandii*

Habitat in C. bonopari
Caulis erectus in fine rufus pedalis. Lamia dichotomia vel trichotomia, divaricata
erecta, hispidi. Setae paucis laetato, tenuam longa. Flores in ultimus ramulus terminali
natis, solitarii, bini, vel terne, brevissime pedunculati, cornui. Calyx foliolata
orata, albida, corolla breviora. Bractea ad basin calyx orata, alba calyculiformis
Anthers stylis metuku filamenta basi conata
ramuli oppositi patentia. corollo oblongo campanulato glabra

potentilla ^{entireva} *affinis floribus ferrug.*

Cenocarpus oblongis subterminalibus rameis longis

caligatus *fuscus* *subnato*

2 tenuifolia Enneacalia oppositis lato rotatis glabri, floribus ternis, calyce
Colorado Thunb. des. pag 13. n. 2.

Enneacalia africana tenuifolia, unedo nisi flore, foliis longioribus caule
ad prespī Plath mant. 60. t. 346. fig. 11. Feb. may 2. p. 11. t. 9. fig. 8

Enneacalia africana conos folio minor. Feb. may 2. p. 11. t. 9. fig. 8

Enneacalia anthemis mutica inclusa, corolla calyciginea sanguineus, foliis
oppositis her. S. V. p. 367

Habitat in Cap. b. specie ^{regalis}
caulis glaber totus exodus pubescens. Rami et ramuli filiformes capilla
res erect. ^{coprign.} folia adpressa pubescentia convexa. Flores umbellati
terminales; toti cum calyce et bracteis sanguineis. Calyx foliolata
^{concolorata} corollam ovoidibus, canina. Anthera multica stylusque
inclusus

Nota / syn: Pleth ad grapholod. repertus.

1^o *capitata* *Enea* *foliis ovali hispatis, floribus umbellatis, calyculis lanatis* Thunb
cuneati oblongo
L.S.J. p. 17 n. 15*

2 *B* *Enea promontorii b. spicifloribus albidis flaminibus rubris* Pet. gar. 5: 7-2.

Enocephalus bruneades eni a formis monimota penes capitulo globulorum
infusis interius carnis Et densa lanugine Testis Pluth. mant. 69 t. 347.

Enea *fig. 9.*
Doutest africanae aromaticae Pet. muf. 2. p. 64 t. 63. fig. 7

Enea bruneades: *Antheris medietate exsertis, corollis Testis calycis canato,*
stylo exerto foliis ternis floribus spargi floribus paup. L. I. V. p. 366

1 *A* *Enea carnea promont. b. spicifloris et floribus villosis* Pet. gar. 5.
t. 2. fig. 10.

Enea africana, *calyx caneginofo ex vindicta, floribus concoloribus*
exiguis canegine obtusis Pet. muf. 1. p. 30 t. 20. fig. 1

Enea capitata: *antheris medietate medicoloribus, corollis Testis calycis*
canato, foliis ternis floribus paup. L. I. V. p. 366

Habitat in Q. b. spic.

Caule per annos decumbens, glaber & leonis hisp. Rami fileformes villosi
ramulis frequenter paleiforme ^{in canto} tomentosi. Colia patentia pelis longis
hirsutis. Flores in extremitate ramulis terminalibus pedunculatis solita

ni boni vel terti calycibus totis densissime albo lanatis. Anthers mutato
purpureo exserto. Stylus exsertus Thunb. c.
capitata differt lana flavecente

vulgaris *Erica foliis opppositis sagittatis* Thunb. Des. f. p. 45: n. 144.

86

Erica vulgaris Tzay.

Erica prima Dad.

Erica vulgaris glabra Baeh. p. n. 405

Erica anthemis Anstatis, corollis campanulatis tuboqualibus, calycibus
Duplicatis, foliis opppositis sagittatis Lin. L. V. p. 363. Pl. Dan. t. 677

B. *Erica myricifolia* Ruprecht Smilis Cluf. h.

Erica myricifolia Ruprecht Baeh. p. n. 405

Erica vulgaris Ruprecht Ray Angl. 3. p. 471.

Habitat in Europa campioribus sterilibus, frequenti.

glaber florū opere cibis; palmarum vel pectalis. Rami sparsi et verti-
cillati downwarde patentēs rugati. Ramuli oppositi brevissimi
tecta foliis, erecte patentēs intexti breviora et folia ramulorum
et superiore quadrangularia imbreata, seplexa trigona obtusa
adnata tenuissime ciliata, glabra, supra et infra villosa. Flores rameo
fasciundi cornuti. Corolla campanulata, notata calyx ~~in~~ aplo-
congōr. Schola calycina fluctuosa solonum ~~calyx~~ duplex extenor
longior levata testacea convexa concolor petens
longior. Anthera cryptata inclusa. Stylus exsertus stigma capi-
tatum.

arborea *Erica* *foliis quaternis lanceolatis ciliatis floribus racemosis ramulorum sub
nisi laevis rami que subspinosi* *campanulatis* *ramulorum* *sub*
Erica cori folia prima Cluf. t. 11. 4

Erica materna alba *Bauh.* *part. 405.*

*Erica arborea: antho anstato, corollis campanulato, styllo exerto, foliis vernis
ramulis ineanis Lin. S. V. p. 3 63.*

Habitat in Europa australi

*Indice sepe tripodalis rectius ramosus fiamos ramuli ultimi terni verticillati
Estia puberulentio sub hispidissimis, cotyle nimofo. Sola terma, linearis glabra
sequentem, supra plana subtriangularis convexa, ^{tereta} ~~recta~~ eratata erecto-patens
flore et apice ramulorum ^{rectangulis} ^{angulis} pedicellatis parvioribantur. Pedicel-
lis longitudine lata folionum basi bracteatus. calyx foliolata orata glabra
acute bicuspidata ^{corolla} ^{albida} corolla campanulata glabra uti calyx. Antho anstato
~~anastato~~ exerto. Stylus exerto;*

*+ *Erica arborea: undata, foliis quaternis, lanceolatis ciliatis, floribus racemosis*
Thunb. Duf. p. 40. n. 63 +*

96 pululifera Enca foliis quadratis linearibus ciliatis, floribus umbellatis, calyx
naviculari apice ciliato-glabro Thunb. C. S. p. 40. n. 65
Enca pululifera: antheri aristati, corollis campanulatis, style inclusa,
foliis ternis floribus umbellatis Lin. I. V. p. 364.

Habitat in C. b. Specie

Folium glaber, pedalis exstans, purpureum, rami et rami, trichotomi
subfastigati, paniculatis. Solca obliqua reticulata
tria pila equalis quarto inferiore, obtusa, folio longitudi
nali profundo subtruncata, inferiora glabra, superius ciliata
in petiolis pallidioribus attenuata, imbricata, semivirginica
cana. Flores terminales quadranguli decolor cornu magne
tudine nisi. Pedunculi sanguinei foliis longioribus. Calyx folio
orata alternum apice sanguineo compresum, a canna
la ruscitaria, ac ut a pallide sanguinea, gita corolla
paucis breviora. Corolla campanulata, sanguinea glabra
anthero aristato stylusque inclusus.

multiflora Enca foliis quinque linearibus glabris, floribus racemosis pubescentia, calyce colorato integro Hunt. des. pag. 30 n. 42.

Enca juniperifolia dense fruticans naubonensis Lobel. bot. 520. Gard. aux 160
0.32.

Enca maxima purpurea, longioribus foliis. Baub. gen. 405

Enca foliis cerasi, multiflora Baub. bot. I. p. 356. Ray angl. 3. p. 471+

Enca multiflora: anthers multicellulari exsertis, corollis cylindricis style exerto,
foliis quinque floribus purpureis Lin. S. V. p. 370.

Habitat in Anglia, Europa australi, Barbana oriente.

Enca dorsali officinali & index fungalis, vetricillatum ramosus, glaber. Sola quinque cerasi foliis petiolis decurrentibus obtuso, curvatae. Racemi cerasi. Flores cernei, perianthum florae tubus maculatus. Pedunculi terminali gemma minuta. Calyx brevis. Bracteis minutis infra medium. Calyx
foliolo integrum glabrum corolla triplo breviora. Corolla alba sanguinea glabra

A longitudine malebit in raro et raro
les digitis que se in raro

Anthers multicellulari purpureo exerto. Stylus longitudine staminum difficit a mediterranea foliis minus patentibus, ramis flexuosis scabris floribus monobius cornutus. Anthers magis exsertis

Synonym. Baub. cum dubit. attulit Vaillant. Specimen dedit Gussau quod
gaudet.

Ramis cerasi. Sola petiolatis, quaternis glabri, apice vellosulis linearibus patens
floris marginae revoluti, pubescentia 2^o vellosulis: juniores marginae vellosules. Bracteis linearibus!
Pedunculus superne, plenus, sum bellatis: pedicelli vellosi. Calyx foliolo crata

ope lenti, margine ciliato. Corolla oblonga. Hypanthidium pubescentia. Anthers anstate
in for. cum umbellatis

australis Enca foliis linearibus ^{margine serrulatis} fuscis glabris, Gloribus terminali pubescentibus
94 bracteis umbellatis Thunb. des. p 51. n. 86.
Enca australis: anthro inflatis corollis cylindricis, style exerto foliis ferme
patentibus Linnae Mant. 23d. & S. V. p. 366.

Habitat in Hispania et cap. b. sp. lati, ramulis oppositis vel ternis
fructu glaber ^{rapido} rotundus ^{luteo} folia tereta ^{lutea} prope quadrangulares, patentia, obtusa, fimbriata,
culana ^{lutea} strobile terminalis bini tres vel quatuor, brevissime pedunculata.
Calyx folia inidia alba carinata, carna fusa, bracteas simillimas
^{# oculi armato modo} ^{anthonio} ^{ex parte alijs} Corolla cylindrica campanulata, olla purpurea
^{villosum} ^{lutea} lacinias duae pallide purpureo-culans glabra. Anthro bicarinato
constata velutino, bifido. Stylus corolla duplo longior. Stigma capitatum

an hinc pertinet. Enca maxima purpurea flos longior Baehni
securid. herb Vaillantii quadlin. ad multiflorum amandat