

Enca

mediterranea *Enic*a foliis lanceolatis glabris, floribus racemosis campanulatis, calyce
colorato integro lanceolato Thunb. Bot. p. 29. n. 41 +

*Enic*a cordifolia H. Bluff. h. 1. p. 42.

*Enic*a maxima purpurascens, longioribus foliis Bauh. Pin. 485.

~~*Enic*a maxima purpurascens, longioribus foliis Bauh. Pin. 485.~~
*Enic*a maxima purpurascens, longioribus foliis quaternis, flore purpura
scente Bauh. hist. 1. p. 356.

*Enic*a mediterranea antheris muticis exsertis, corollis ovatis, stylo exserto,
floribus spatis Lin. Mant. 229. * S. V. p. 370

Habitat in Austria alpibus

glaber erectus. Ramis rostratis. Folia quaternis raro quina, acuta glabra paten
tia, subunguiculata. ^{in cernuis} Nervis compositis. Pedunculis capitatis. Bractea
in medio minimis. Calycis foliola lanceolata, integra, concava, glabra
incarnata, corolla dimidio breviora. Corolla campanulata obtusa, san
guinea glabra. Antheris muticis, subsessile. Stylus longior stigma
vix exsertum. folia intermedia ternata Thunb.

50 purpurascens foliis quaternis quinisque glabris, floribus parvis campanula-
tis, caule decumbente Turb. Desf. p. 30. n. 44

Enea conis folio v. l. Clus. h. 1. p. 43.

Enea procumbens dilute purpurea Bauh. Pin. 486. May. h. 1715.

Enea foliis conis, flore purpureo adictioni colore coloris Bauh. h. 1. p. 358.

Enea purpurascens: antheris muticis exsertis, corollis campanulatis, stylo
exserto, foliis quaternis floribus parvis. Lin. S. V. p. 370 *

Habitat in Europa Australi &

Caulis decumbens. Folia ternia 4. summa quina. Flores dilute purpurei parvi
Corolla subcylindrica. Calycis foliola subulata. Antheris muticis
profunde bifido exsertis. Stylus exsertus Lin. S. V. l. c.

subcylindrica.

51
vayans Erida foliis quaternis quousque glabris floribus sparsis campanulatis,
caule erecto Thunb. in p. 31 n. 45

Erida vayans: antheris muticis exsertis, corollis campanulatis, stylo exserto, foliis
quaternis floribus solitariis Lin Mart. 230. V. pag. 370

Habitat in Africa et Toloza Hispania.

Caulis scabriusculus. Ramis ultimis albis divaricatis. Folia rarius quina
linearia obtusiuscula, ciliuscula, si scabriuscula, breviuscula
confersa. Flores ad latera ramorum ^{ulteriorum} sparsi, pedunculati solitarii. Calyx
cili foliolata erecta curva, lanceolata, brevissima. Corolla campanulata
obtusiuscula. Stylus exsertus uti anthera mutica bipartita. Seminis herbaceo
cui ramuli laterales. Folia acuta. Corolla ovata acuta. Calyx paten-
tes. Anthera duplo longior nec basi gibba.

Quibito non meher.

planifolia *Erica* foliis ovatis ^{patentibus} ciliatis; floribus axillaribus, caule decumbente
Thunb. disj. p. 30 n. 60

Erica asperiana Lessert, thymi folius Ternis Planch. Mant. 69. t. 347.

Fig. 1.
Erica planifolia: antheris aristatis, corollis campanulatis, stylo exserto,
foliis ternis patentibus Lin. S. V. p. 364. Berg Cap. 100

Habitat in Cap. b. Spreitz

et
Caulis ^{et} rami trichotomi ramuli terni verticillati, filiformes et
capillares decumbentes, glabri vel tenuissime scabri. Folia
terna, rarius quaterna, axillis aliis foliolis longioribus, ovata
miserata, tenuissime subciliata, margine revoluta, patentibus
internodiis breviora. Flores versus apicem racemosi, cernui. Calycis
lobi ovata scabra, breviora. Corolla campanulata purpurascens
Antheris aristatis in cluso. Stylus exsertus; stigma capitatum
Thunb. l.

p. propylifolia var. diversis videtur

Perpyllifolia Eria folii ovatis patentissimis, floribus ^{calycibusque antratis ~~bispidis~~ ^{ligis} ~~sepal~~} *racunculatis* laterebibus
Solitariis oppositi

Habitat in Cap. b. p. i. z

Caulis laxis filiformis, glabr. ^{terris, ~~supra~~} ^{perpylli ~~marginibus~~} ^{ramuli ~~verticillati~~} ^{antheris ~~capiteis~~} ^{corolla ~~campanulata~~} ^{stylus ~~exsertus~~} ^{affinis ~~planifolia~~} ^{an ~~o~~ ^{versis}}

sepe vix magnitudine
lenius, inaptes
supra nuda veli nonnulli
marginibus profertur vesper
marginem dispersa
mucrone albedo uti
foliola calycis ^{terminata}
marginem partem reflexa

termi. folia ^{subulata} ^{perpylli ~~marginibus~~} ^{calycis ~~foliola~~} ^{antheris ~~capiteis~~} ^{corolla ~~campanulata~~} ^{stylus ~~exsertus~~}
lanceolata, ^{antheris ~~capiteis~~} ^{corolla ~~campanulata~~} ^{stylus ~~exsertus~~}
antheris ^{capiteis} ^{corolla ~~campanulata~~} ^{stylus ~~exsertus~~}
affinis ^{planifolia} ^{an ~~o~~ ^{versis}}

an varietas *E. planifolia*

mimophyllo Erica foliis oblongis patentibus pubescentibus, floribus terminalibus ~~terminalibus~~

54

ternis corollis campanulatis, receptis antheris pubescentibus

Habitat in ~~Angl. Ma.~~ Bourbonnais

Frutex teres virgatus, ramis caulisque filiiformibus, erectis vix inellatis.

~~longatis~~ ^{per se} subfastigiatis pubescentibus ^{caulis} filiis. ~~Solia quaternaria~~ ^{prole} oblonga ^{quaternaria} partem

uno alterove

^{obtusiusculis} involuto filiata ^{subtus} subtus, ^{acuta} menuta. ^{obtusiusculis} lora pedunculati
^{obtusiusculis} nutantes, petalo longitudine corollae. calycis lobula ovata, corollae dimidio
breviora. corolla globosa campanulata laminis sinuatis parum major
antheris muticis longitudine corollae. stylus corollae duplo longior hy
nu obtusum hemisphaericum

Et Erica ramosa vixima La Martini. fide herb. H. B.

an varietas virgata

inflata *Enic* foliis quaternis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricosi, ca-
lyci subulato glabro Thunb. Disj. p. 41. no 67* Tab. 2.

Habitat in C. bono prety

Trutex nodulosus, erectus, pedalis. Brachi sub simplicibus, longi, verticillati.
Solia acuta, curvata, patenti erecta, glabra unguiculata.
Flores cernui. Pedunculi sanguinei, villosi, pollicares. Bractes
supra medium pedunculi lineares, sanguineae. Calycis foliola
patenti erecta, sanguinea corolla quadruplo breviora. Corolla
inflata, obtusa, pallide sanguinea, subpollicaris. Anthera anthera
to stylusque inclusus Thunb. l. c.

10 *virgata* Erica foliis oblongis scabris, floribus ternis globosis, calycibus integris
Stylo exserto Thunb. Desf. p. 10. no 10
Erica virgata Berg.

Erica abrotanoides: antheris nudis inclusis, corollis ovato-campanulatis,
Stylo exserto, stigma infundibuliformi Len. Max. 66. t. 5. v. pag
360.

Habitat in cap. b. Speitz

Caulis erectus hirsutus, pedalis. Rami virgati, hirsuti frequentes digitales
erecti. Ramuli suboppositi, frequentissimi, brevissimi. Folia alternata
pubesca patentia, lineam longa. Flores in ramulis terminales terni

Calycis foliola ovata, corolla duplo breviora. Corolla globosa
pallida. Antheris nudis inclusis. Stylos exsertus stigma peltato-

variat) caule virgato, ramis foliisque valde hirsutis et scabris. 2)
caule virgato ramisque hirsutis, foliis rugosis vel tosis patulis
3) caule paniculato, ramulis brevissimis, foliisque paucis
scabris et hirsutis 4) caule paniculato, ramulis longioribus
castriatis foliisque paucis scabris, glabris

calycina Enea foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ^{ovatis} glabris, calyce naviculari truncato cappidato Thunb. Desf. pag. 47. n. 70

Enea agnoscitur humilis, flore albo unicolori, coris foliis, calyce amplo
 Seb. mu. f. 2. p. 13. t. 11. fig. 7.

Enea graphalodes Berg. Cap.

Enea calycina: antheris cristatis, corollis ovatis stylo intus, calycibus patentibus rotatis, Enea grae foliis Ternis Lin. L. V. p. 366.

Habitat in C. b. p. 5

Caulis crassus nodulosus, cinereo-fuscus erectus pedalis. Rami cinereo tomentosi, erecto-patentes virgati ramulosi. Folia terna, acuta, integra, supra ~~conca~~ ^{conca} umbriata, lineam dimidiam longa. Flores terminaliter terni, cernui. Pedunculi brevissimi, hirti. Bractea calyciformis navicularis, calyci approximata, glabra, alba. Calycis ^{calo} ~~foliola~~ ^{foliola} ovata, obtusa cum acumine, intus concava, extus carinata in primis apice, integra, glabra exita, corolla duplo breviora. Corolla campanulata, glabra, alba. ~~Calycis foliola~~ Anthera cristata purpurea ad basin usque bifida stylusque intus. Germen tomentosum lobatum. Thunb. L. C.

bracteani la Manthia vel huc vel ad confoliam pertinet fide herb. Guss.
 non vidi

83
Spicata Erica foliis lanceolatis glabris, floribus verticillatis, calyce petiolato integro. Th. Desj
p. 43. Tab. 4. *

Habitat in Cap. b. p. montibus

Caulis crassus, rigidus, fusco-purpureus, scaber, flexuosus - erectus fere pedalis. Rami et ramuli alterni vel subverticillati, virgati apice subincurvi. Folia incurva et imbricata, subunguicularia. Flores in apicibus ramorum inter folia breviora, cornui, plurimi. Spica crassa, pollicaris usque digitalis. Bractea calycis approximata, basi attenuata subpetiolata, dein oblonga, acuta, tenuissimis, intar nato. Calycis foliola spatulata, concava margine scariosa, corolla multoties breviora. Corolla clavata, curvata, obtusa, glabra, alba, subpollucida anthera inclusis. Stigma exsertum, flavescens Thurb. l. c.

54
Sesiliflora Erica foliis lanceatis acutis, spica floribus sessilibus deflexis oblongis
Lin. Suppl. pag 222 & S-V. p. 365.

Habitat in C. bono spect.

Erica fusca, scaber, determinate ramosa, rigidulus, facie Pini sylvestris
minoris. Folium quadratum confertissima, saturate viridia. Spica terminalis
undique ambrens, oblonga. Flores sessiles, imbricati, latiusculi
Corolla foliis longior, clavata obtusa, semper cernua. Stamina
inclusa, stylus exsertus Lin. l. c.

denticulata Cnicus foliis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus serratis Thunb
 Guss. p. 20. n. 34.

Cnicus denticulatus: Antheris multius ntelusis, corollis ovato infundibuliformibus,
 stylo incluso calycibus denticulatis, foliis quaternis Men. Mart.
 229. x. l. v. p. 360

Habitat in C. b. p. 5

glaber, erectus, palmaris. Rami pauci in summitate caulis erecti
 folia quaternaria, imbricata. Flores in apice ramorum subterni
 bracteis navicularibus, ciliatis serratis, calyciformes, pallida carina
 rindi, longitudine calycis. Calycis foliola ovata, acuta, lacini cilia
 ra, inflato concava, pallida glabra, corolla duplo breviora
 corolla subcylindrica, purpurea, laciniis oblongis reflexis antheris
 mutis, styloque inclusis

92 Cubica Erica foliis quinis trigonis incurvis glabris, floribus umbellatis ^{campanulatis} glabris,
calyce colorato carinato Thunb. Prosp. pag. 31 n. 46.

Erica cubica: antheris mucicis inclusis, corollis campanulatis acutis, stylo inclusis
calycibus tetragonis foliis quaternis Lin. Mant. 233. * S.V. p. 362.

Habitat in Cap. b. sp. 7

Totus glaber ex his pedalis. Rami et ramuli erecti laxi ~~intraeantem~~ mucicati.
Folia quaterna saepe quina, ^{sempre quinquelobata} patentia incurvata congesta, glabra
internodiis longiora. Flores in apice ramorum plures, plus minores.
Pedunculi angulati, scabidi ^{longi calycis} pubescentes. medio bracteis setaceis. Calycis
foliola ovata, acuminata, ^{membranacea} carinata purpurea glabra, corolla paulo
breviora. Corolla purpurea Antheris mucicis bifidis inclusis. Stylus
exsertus foliis patentibus incurvis dignoscitur facile.

Conium Enic foliis acris subferis glabris, corollis cylindricis basi attenuatis
 Umbellis terminalibus Hort. Vien. 2. p. 23. *

Habitat in Cap. b. p. p. t.

Rami verticillati fastigiati, mucronati glabri, tenues. Folia glabra acicula
 ri patentia pinnatifida glabra, conferta. Flores terminales 4 et quin
 que subsessile erecti. Corolla semipollinari, recta pubescens pallide
 purpurea. Anthera mutuo inclusis filisque 3 bracteis 3 subulatis
 ciliatis, calyce depresso. Calycis foliolo alata basi subulata, ciliata

— pubescentibus

Trigonotis obtusa in specimine Sellow.

75

Conspicua Enea foliis glabris Corollis cylindricis curvis longissimis pediculis,
Limbo revoluto Hort. Kew. 2. p. 22.

Habitat in C. b. spec.

antheris muticis inclusis ^{in axillis superioribus} stylo ^{prolongato} exserto. foliis ^{quaternis} ^{in axillis superioribus} quaternis patentibus. Rami glabri pedunculi

Rami pubescentes
Ramuli filiformes
Insigni

Folia linearia ^{in axillis superioribus} quaternis patentibus. Rami glabri pedunculi
Calyxi orato oblongo obtuso, ^{base signata} Glabra, corolla multo ^{apice fructu} breviore ^{in axillis superioribus} longior

Corolla sesqui pollicari parum curvata. Stamina subsertita styli exserto.

Strophi pediculi, pedicelli pubescentes. Corolla flava.

Folia longitudine fere inter nodorum anthera mutica

20 *Erica folio-senis* ^{subulata} ~~linear lanceolata~~, ^{incurvata} floribus verticillatis cavae glabris Thunb.

Dis: pag. 23. *

Habitat in Cap. b. p. i. 5

glaber cinereo-fuscus erectus, plusquam pedalis. Rami verticillati; raro ramulesti, ^{supreme folis & floribus}

Folia glabra, supra plana, subtus convexa, erecto incurvata, unguiculata. Flores in medio ramis extra axillis, brevissime pedunculati erecti. Calycis foliola basi latiora, demum linear-subulata, glabra, corolla triplo breviora, Corolla curvata aequalis, obtusa pollicaris. Anthera ad Stylus subnatisse Th. l. c.

29

Coccinea Enea foliorum penis laevicolatis, ^{naledibus} floribus racemosis clavatis clavatis villosis
Thunb. diff. pag 23. n. 27.

Enea africana angustifolia, floribus oblongis tubulosis dependentibus
corocinis, cum longissimis filamentis concoloribus Raij den.
Dr. 90 Seb. mus. 1. p 32. t. 21. fig. 4

Enea coccinea: antheris muticis ^{pub} inclusis, corolla & clavatis grossis
Stylo incluso, calycibus hirsutis foliis quaternis lin. f. v.
pag 360. Spec. pl. pag 506*

Habitat in Q. bono pect

glaber pedalis ramis ramulisque verticillatis fastigiatis basi
divaricatis. ^{suprema pubescentibus} foliis ~~pena~~ ~~et~~ ~~trianis~~ ~~caulis~~ ~~suprema~~ ~~est~~
pubescentibus, margine scabra, incurvatis, semiunquiculatis
Flores versus apicem racemose subserticillati. Pedunculi
brevissimi. Calycis lobis ~~bracteis~~ ovatis acuminatis villosis
Calycis foliola ~~bracteis~~ ~~bracteis~~ ~~similes~~, corolla triplo
breviore. Corolla incurva. Antheris muticis subsertis.
Stylus exsertis variis foliis 6. 7. 0

— linearis — ^{cor} ~~sepenonibus~~ pubescentibus calycibusque coritis
acuminatis villosis

14 *Spumosa* *Erica* foliis trigonis glabris, floribus capitatis, bracteis imbricatis

Thunb. Sw. pag. 17. no 14*

Encusifruana, flos rubro plano Seb. mus. 2. p. 11. t. 9. fig. 10 mala

Erica spumosa: athenis bifidis inclusis, calycibus trifloris, foliis ternis lobatis

Lin Am. G. Afr. p. n. 14*

Erica scariosa Berg

Erica spumosa antheris muticis inclusis, corollis ternis calyce communi obtusis,
stipite exserto, foliis ternis hinc & V. pag 367.

Habitat in Q. terra pici

Caulis teres, pedalis vel ultra ^{fusus}, lineis trigonis post caput foliorum notatus
glaber ubi tota planta immo generis ramosis. ramuli sparsi. folia subtus
Erica alba, septimanam imbricata, lineam longa terga obtusa. Flores
terminalis ^{nubantur, pediculis sub magnitudine, imbricatis, capitulo} bini vel 3. albo purpurascens globosi. Bracteis ^{late} ovatis imbricatis
glabris ^{membranae eglo} magis corollam aequantibus subsaepe albico incarnatis carinatis
apice. Antheris muticis subinclusis. Stylus exsertus corolla duplo
longior

obtusis capitulis subtrifloris imbricatis

3 bracteata Enea foliis lanceolatis glabris, floribus umbellatis, bracteis petiolatis coloratis oval
latis Thunb. disp. pag 134

Habitat in Cap. bono spei ^{in f. us.}

Racemulis erectus glaber, pedalis. Rami inferne pauci alterni, superne aggregati.
subverticillati, fastigiati. ^{per se} folia integra supra concava, subtus convexa, sul
co longitudinali, adpressis internodiis paucis longiora. Umbellae terminales
nubi. Bracteis petiolatis, ovatis, acuminatis, canalicatis, glabris, exteriore mar
gine, interiore toto sanguineo. Stylus et anthera inclusae Th. l. c.

Subiflora Erica Luteis Ungonis ciliatis, floribus terminalibus solitariis curvatis

93

Clavatis herbis Thunb. d. s. p. 25. ne 31. *

Erica speciosa, floribus oblongis ex carneis-purpureis Pluk. mant 67. t. 346 fig 9.

Erica agrifolia Smith. Tab. mus. 2. p. 20. t. 20. fig. 4.

Erica subiflora: antheris muticis inclusis, cellulis clavatis grossis, stylo inclusis, foliis quaternis subciliatis Lin. l. v. p. 360. spec. pl. pag. 505 *

Habitat in Q. bono spetz

Caulis erectus, ^{bipedalis} alij, superne tomentosi. ^{Ramuli} ramis sparsi, filiformes, ^{inferiori} ^{prostratis} ^{secundarij} ^{ternarij}

ter erecti ~~vagati~~. ^{et filii} folia quaternaria, imbricata lineam longa. Flores in ^{omnibus} ramulis terminalibus ^{racemum} quae ^{quasi} ^{formantes}, secundi. Calycis ^{lobula} lobula ovata longe attenuata, acuta ciliata corollae triplo breviora Corolla pollicari laciniis reflexis ovatis. Antheris muticis subnitidis style ^{erectus}

Aeth. n. s. p.

11 "imbricata Enea ^{linguis ~~trigonis~~ pub} ^{campanulatis} foliis oblongis serratis, floribus umbellatis, bracteis imbricatis
antheris exsertis Thunb. Bot. pag. n.

Enea quinqueangularis Thunb.
Enea imbricata antheris mutuis exsertis corollis campanulatis, calycis
imbricatis, stylo exserto, foliis ternis Lin. S.V. p. 369

Habitat in C. bono sp.

Caulis glaber erectus sesquipedalis ramosisimus ramis ramulisque scissis
pubescentibus. Ramuli breves oppositi ^{et teres et oppositi} foliis ^{foliis}. Folia
subulata obtusa supra plana subtus ~~conversa~~ sulco exarata
margine tenui sine ~~vix~~ serrulata imbricata. Flores in ramulis termi-
nales, terni breves sine pedunculati, minuti albi. Calyx imbri-
catus bracteis ovatis carinatis albis. ^{corolla brevior} Corolla calycis parum longior.
Anthera mutua exserta purpurea. Stylus antheris duplo longior
Stigma capitatum

pubescens Enca foliis ternis quaternisque linearibus scabris, ^{pelosi} floribus umbellatis
72 villosis Thunb. ^{pub.} pag. 36 no 61*

Enca pubescens: antennis aristatis, corollis ovatis, stylo incluso foliis quaternis
scabris floribus simplicibus lateralibus Lin. S. V. pag. 365

β Enca parviflora: antheris bifidis inclusis, corollis subrotundis longitudine
calycis, foliis quaternis scabris Lin. Spec. pl. p. 506*

γ Enca villosa: foliis ternis quaternisque corollis oblongis villosis

Habitat in Cap. b. spici

Caulis bipedali ramosissimo virgatus, ramuli filiformibus villosis.

rami et ramuli ^{ut, etiam, pro, p. c. ali} foliis in ramulis ternis ^{quaternis} ⁱⁿ ramis ^{foe} obtusa, ⁱⁿ novis
plurimumque ^{prosp.} ^{habent} ⁱⁿ vertice ^{habent} ⁱⁿ vertice ^{habent}
lobis, villosis

Stemina brevissima pedunculata. Calycis foliola lanceolata reflexa
stigma pilosa brevissima. Corolla globosa vel parum oblonga. Anthera
num antea divaricata aculeo armato villosa ^{est} ^{per} ^{instans} ^{aperturam}
stylusque ⁱⁿ ^{tus}

γ differt foliis longioribus quaternis, caule ramisque verticillatis, magis
glabris, floribus conglomeratis cylindricis.

δ tenerior foliis minoribus corollis oblongis parvis

antheris