

Enca

12 Droseroides Andromeda racemis secundis, foliis lineariibus pilosis viscidis ^{terminalibus} Linn. Mant
239. * S. V. p. 406*

Chamaecistis roris folis Pet. mus. hb. 22. 4. 161.

Erica glutinosa Berg. Cap. 99.

Habitat in Cap. bono ^{Murderpiciens} fr.

Trunculus palmaris, ramosus, ^{sparsi} adpressus pilis apice glandulosis viscidis. Folia
alternis subsessile, in ramis cespitosa in remotiora ^{in racemosa} ^{per angulicula} ^{Periferis}, lineari
ria obtusa, subtus sulcis exarata. Pediculis terminalis. Pedicelli filii
formes. Flores nutantes. Calycis lacinis lanceolato scanope purpurea
scentes corolla ovata, roacea collo atropurpureo. Anthera et stylus
exserto, basiante duobus setaceis. Nomen natum Ericae ^{Ericae} ^{Andromeda}
vanat 4. J. D. Cum S. 10. Fructificatio Ericae habitus Andromeda

11 bryantha Andromeda floribus corymbosis, foliis ellipticis, caulibus prostratis Mart. 238.

* S. V. 406

Bryanthus Gmel. fl. 4. p. 133. t. 57. fig. 3.

Habitat in Camtschatica cum Empetro in rupibus &

Planta densis caespitibus uti Seryllum provenit. Antheris dorso filamentorum
perpendiculariter adhaerentes; cum charactere Gmel. Pediculi multiflori
Lx. m. l. c.

Unco spec: sci. Am. Thunberg
non ordi

17 Saboezia Andromeda racemis secundis, floribus quadrifidis ovatis, foliis ellipticis subtus
tomentoso incanis

Enica cantabrica, flore maximo, foliis myrti, subtus incanis.

Enica hibernica, foliis myrti pilosis subtus incanis Pet. gar. 42. t. 27. f. 4.

Enica Saboezia racemo terminali, foliis alternis, subtus tomentoso hinc.

Spec. pl. pag. 509*

Andromeda Saboezia racemis secundis, floribus quadrifidis ovatis, foliis
alternis lanceolatis revolutis L. V. p. 506*

Habitat in Hibernia, Pyrenaei Navarrae.

Caules procumbentes veretes ^{pauciflori} purpurescentes ramosi. rami elongati
nervi alii ^{et ultra} pilosi. folia brevia petiolata, ^{acuta} oblonga utrinque acuta magnitudine
utrisque integerrima supra viridia ^{sub} utrinque simpliciter pilosa
pilis remotissimis, subtus incana nec margine intus revoluta
fove plana. Pedunculus terminalis elongatus pilosus viscosus
flores secundis ^{remoti} nutantes. Bractea lanceolata. foliola calycina
lanceolata pubescenti viscosa. Stamina octo. Antherae multae

punica *Erica* foliis lanceari lanceolatis ciliatis ^{marginatis} sicibus floribus oblongis lateralibus ^{cernuis} spicatis

Habitat in Capite bonispei Schumacheri

Ramuli ^{floriferi} verticillati 4 or 5; palmatis pubescentes. ^{Varia} Folia petiolo brevi, semivirgata
culana, supra ~~plana~~ ^{concava} ~~subtus~~ ^{convexa} ~~subtus~~ ^{marginata}, parum incurva subtus
nervi elevati scabra, margine subtilissime denticulata ciliata. Pedicelli
axillares folio breviores lati, plures pubescentes medio bibracteati; bracteis setaceis
parvis. Calyx corollae dimidio brevior strictura foliorum ciliata. Corolla parva
glabra latitudine aequali, inter se punicea. Antheris multae corolla parum longiora
suffra. Stylus antheris vix longior stigma obtusum

25 *Cephalotes Erica foliis tenuis lanceolatis, floribus verticillato capitatis clavatis*
Thunb. Diss. p. 21. n. 23 *

Habitat in Cap. bono spretz

Stemex glaber, erectus, pedalis. Rami verticillati subsystyrati, raro
ramulosi; pubescentes. Folia tenuia in ramulis ~~in~~ quaternis,
glabra patentia apice incurva, supra plana subtus
convexa unguiculata. Flores in apicibus verticillato
capiti purpurei glabri. Corolla clavata cylindrica, obtusa
~~obtusata~~ ^{obtusata} unguiculata. Anthera mucosa inclusae. Stylus exsertus

calycis foliola lanceolata ^{ajuta} tubo ante adpresso. Corolla
~~pedicellata~~ laciniis rotundatis Anthera parum corolla ~~longe~~
exserta. Stylus longior Stigma obtusum in meo a Thunbergio
missa

Similis empetrifolia at Er. pulchella differt foliis simplicibus
laticoribus corollis glabris

— glabri

91
Cylindroea Cnida foliis Trigonis glabris, floribus terminalibus ^{subsolitariis} cylindricis glabris
Thunb. Diss. p. 24. no 29. 4

Habitat in Cap. bono spei

Frutex bipedalis glaber. Rami dichotomi et trichotomi. Folia ramu-
lorum quaternaria fusco longitudinali nitida imbricata, lineam lon-
ga. Flores in ultimis ramulis erecti. Foliola calycis subulata cari-
nata glabra corolla triplo breviora. Corolla angusta cylindrica
recta alba glabra, ore parum contracta semipollicaris. Anthera
mucosa stylusque inclusus Thunb.

156

verticillaris ^{na} Erica foliis linearibus ^{calycibusque ~~pubescentibus~~ ~~summatu~~} lanceolatis ramulorum ^{cyathis vellosi pubescenti} ~~pubescentibus~~ ~~calycibus~~ ~~intacti~~ ~~terminalibus~~ ~~ramulorum~~ floribus ~~verticillatis~~ ~~clavatis~~

Habitat in cap. b. sp. 5
convenit in omnibus cum interrupta nisi foliis planum latioribus-
corollis que villosi forte novo varietas

ambo maxime affines E. vestita. affines videntur scilicet Desimp.
E. vestita Thuas. foliis subsopulebris nec petiolis semperque ulantibus

anthera ^{propi} acuminatis ^{ti} foliis secundis sed haec ~~distat corollis glabris cum ram~~
in aliquis conueniant utraque specie differre credo doneque
antheris aristatis nisi mutis corollis mutis nec ac
vato

habitus singulari ramulorum per intervalles approximatus
Erica comicina Schneev. G. pl. rarior. p. 1. pag. 30. tab. 31

affinis vestita

abietina Enca foliis quaternis lanceolatis glabris, floribus racemosis ^{globosis} cylindricis, ^{pediculis} calyce
60 ovato ^{subulcato} Thunb. Disf. pag 42. n. 60. Vences. 4. pl. var. 1. pag. 23 tab. 23

Enca adriana abietis foliis longiore et tenuiore, floribus oblongis satura
te rubris Raj dens. 96. Seb. mus. 1. p. 31. t. 21. fig. 1.

Enca folio juniperi, floribus purpureis oblongis Thunb. cent. 4. p. 25.
t. 41. 42.

Enca abietina: antheris anfractis corollis grossis, stylo incluso foliis qua
ternis floribus sessilibus Lin. S. V. pag. 365. Spce. pl. pag. 506 + Berg
cap. 105.

Habitat in Cap. b. Spei?

Caulis erectus teres sesquipedalis. rami et ramuli verticillati
erecti. Corolla glabra imbricata, unguiculata subtus sulcata.
Flores laterales axillares subverticillati racemosi racemo
interrupto. Pedunculi sanguinei valloso verso basi bracteis
binis subulatis. Calycis foliola lato ovata acuta integerrima
glabra sanguinea. Corolla ^{sanguinea} infra apicem saepe subventricosa
cap. globosus ^{non} curvata obtusa glabra, semipollinaris. Antheris ^{binis}
fractis stylumque inclusus.

meu differt nonnihil a Thunbergii foliis in ramis ^{terribus} binis in ramulis ^{quaternis} ^{actibus}
floribus potius verticillatis, bracteis, calyce membranaceo albo.
non frato

interrupta E. foliis triquetris persistentibus ramulorum ciliatis, corollis cylindri-
cis glabris subgeminis terminalibus ramulorum calycibus acuminatis.
Habitat in Cap. b. p. 5

Rami elongati inferne perperascentes superne vellosuli subin-
nescentes, ramuli verticillata per intervalla ^{et longiora} approximata
depressi unguiculari et pollicares ^{superiores} superiores ^{et inferiores} inferiores
inferiores floriferi. Folia, sive triquetra ^{et unguiculari} unguiculari
dorso sulco excavata ramorum glabra longitudine interstitionum
adpressa ramulorum imbricata spatula ciliata Flores ex
apice ramulorum 1. 2. 3. subsessile. Calycis basi cincti foliis
atque bracteis. Calycis foliola basi dilatata ciliata margine membra-
nacea in acumen facie fere foliorum attenuata ^{recta} ^{et unguiculari} unguiculari
Corolla cylindrica ^{recta} glabra fere pollicaris laciniis obtusi
Anthera ^{basi acuminata} ~~trifida~~ ^{glabra} Stamina longitudine fere corollae
inserta. Stylus exsertus stigma truncatum.

anftata *E. foliis triquetris glabris, floribus ^{campanulatis} terminalibus umbellatis calycis foliolo
unico subulato corolla longior stigma pelt*
Habitat in cap. b. p. 5 D. D. Dr. Thouin

Trunc ramis ramulis verticillatis scabris post caput florum apice
pubescentibus - folia quae linearia triquetra nitida supra plana
marginibus serratis subtus folio exaratis, ramulorum imbricatis semunquiculatis
pedunculis terminalibus brevissimis cunctis 16. Corolla parva campanulata
glabra. Calycis foliola corolla dimidio breviora ovata tria acumine brevi
serrata 4ta in acumem corolla duplo longior quae nota ab omnibus
aliis dignoscitur, acumine facie foliorum anthera longitudine corol
la inclusae mutica, stylus subaequatus stigma peltatum

parviflora E. foliis ternis lanceolatis glabris, floribus axillaribus globosis oblongis superne
coarctatis subturbatis ore coarctatis

Habitat in Cap. b. p. 7

Fruticulus ramis primis ramulis foliis ferribus ore lenticis pulvrescens
in villosulis. Folia ternis glabra dorso folio exarata. flores omnium
lenticis: minimi infere angus frequentissimi axillares inferne angustati
superne amplexati ore coarctati. Calycis foliolo lineari antheris
natiso nutris

species dubia an potius B. lani

monadelph. ^{calycibusque ovatis aequalibus}
foliis linearibus oblongis glabris, floribus campanulatis hermaphroditis, filamentis dilatato membranaceis

Habitat in Cap. b. sp. 5

Fruticulus ramis spinosis ramulis exsertis filiformibus inaequalibus
foliis imbricatis - folia parva ad pressa glabra dorso filis exarata interno
duis longiora. floe. ^{Normi} 3-4 brevissime pedunculati parvi. Caly
cis foliola ovata nuda cinnamomum filis exarata vixia. ~~Stam.~~ fla
corolla glabra filamenta subcohaerentia utraque membrana dilatata
in aethere caetup multo &. stigma longitudine corollae pelta
tum

prope Scop. collocatur

videatur adhuc nunc *Stamina* ovata cohaerent alias nomen
triviale mutatur

~~Cassia~~
E. foliis linearibus caniscolatis calycibus ovatis glabris, floribus campanulatis
medicinis axillaribus racemosis. Stigma peltatum.

Habitat in Madaga

Rami et ramulique reticulati lani. foliis ternis. Puntis foliis
brevioribus medio praetentis. Calyx corolla duplo brevior. Anthera multae
50. in l. p. stylis subaequalibus stigma peltatum
facis seorsum corolla similes parum majores et stigma peltatum

nigrescens & foliis linear-lanceolatis calycibus ovatis glabris, floribus terminalibus
ramulorum racemosis, stylis longis stygma obtusum

habitat in C. b. p. e.

Ramis ^{ul.} parvis alternis vel oppositis filiformibus spica veluti sordide
cinereis ~~floribus~~ pollicari vel ultra floriferis iterum ramulosis ramulis
brevissimis confertis spica floriferis hinc floriferis hinc racemosis
muis - folia ^{ternis} breviter ^{subtus ut supra} ~~triquetra~~ ^{umbriata} ramulorum ultimorum
oblonga. Pedunculi terminalis plerumque ternis brevissimis. Calyx
corolla dimidio brevior ovata cuneata corolla 6. sigans antheris
longitudinis corolla stylis corolla duplo longior

septima
27

Enia foliis pinnis linearibus secundis, floribus axillaribus clavatis
Willd. Thunb. Diss. p. 22. n. 25*

Habitat in Cap. b. Freit.

Caulis erectus cinereo-fuscus pedalis. Rami verticillati, erecti. Folia
oblique attenuata in petiolo capillares, femurqueulases; acuta inde
gra, glabra absque felleo pubtus, basi imbricata, subsessida, apice patenti
recurva, subpollinaria. Flores in ramulis mediis, subverticillati bene
briter pedunculati, erecti. Calycis foaleola basi lata, dein linearibus
lata, viridia glabra, corolla triplo breviora. Corolla curvata, obtusa
alba pollicaris. Anthera mutico, subsexto. Stylus exsertus Thunb
l. c.

non vidi

Thymoides
floribunda Erica foliis triquetris glabris, floribus terminalibus campanulatis sessilibus
foliis

Habitat in Cap b. p. 5

Truncus erectus facie Ericae aboxo. Rami pedales striati pubescenti
peloso. Ramuli laterales frequentes oppositi vel terni inferiores
breviores pollicares superiores longiores floriferi. folia linearia
terna glabra internodia longiora. Flores terminales tres pedunculati
lati peduncululi brevis mediostrati. Calycis foliola ovata
acuta. Corolla obtusa. anthera mutica corolla parum longiora.
Stylus inclusus

cum definit. Ericae leucantherae sit convenit nisi quod anthera non
exserta ac eadem.

149 *nitida* *Enicæ* ^{ramulis trigonatis oblongis} *foliis oblongis nitidis, calyx floribus terminalibus se-
pulis campanulatis, caly-*
cibus ciliatis. Stigma ^{quadrilobis et fere} ~~plano~~ *corolla*

Habitat in Insula Bourbonia

Erubet *Pamposismus* *cinereus* *glaber* *ramis ramulisque verticillatis*
tonento tenuissimo tecti, serotigati. Folia *consistunt* *oblonga* *obtusiuscula*

folia superne albida *marginibus ciliatis* *imbricata adpressis* *linearibus* *calycis foliolo oblongo, carnato, obtuso* *longitudi-*
ne fere corolla viridia. Corolla ^{ramulis imbricatis} *alba* ^{ramo unico propano} *campulata glabra. Antheræ* *mutis*
obtusis. Stylus *corolla duplo longior* *stigma* *explanato* *quadrilobo*
facies fere imbricata, et calyx non imbricatus, ramulis trigonatis
~~apparet hinc terram lateriflora apparet~~

an variegata varietas

13 Leucanthera Erica foliis trigonis glabris, floribus umbellatis antheris exsertis
albis Thunb. dis. f. pag. 17. n. 13*

Erica leucanthera. antheris muticis exsertis, floribus ternis corolla campanulata, calycis albo stylo exserto, foliis ternis Lin. suppl. p. 223 L.V.
p. 360

Habitat in Q. b. specis

Caulis pedalis glaber rami et ramuli pubescentes ramuli sparsi frequentissimi
filiformes et capillares, erecti foliosi. folia ternis, opposita ad presens, flores
in ramulis terminalibus, binis et ternis brevissime pedunculatis, albi calycis
pallidiores. Anthera mutica exserta albo Thunb. dis. f. pag. 17. n. 13.

non vid. nisi hoc et leucantheram eadem

aciculari ^{fructu} E. foliis acerosi glabris floribus terminalibus caxa umbellati campanulatis
glabris ^{ovato lanceolatis}
glabris, calycibusque pubescentibus glabris

Habitat in C. b. p. Daldorph 5

Index virgatus ramulis parvis filiformibus glabris foliis sectis. Folia brevia
angusta triquetra glabra. Flores in apice ramulorum pedunculati 3, vel 4. vix
squamulati glabri bracteis tubis pubescentibus calycis lobis ovatis attenuatis
corolla duplo brevior basi oculo armato ciliata, lobata. Corolla campanulata
glabra calicini ovati E. Petal. duplo minor. Anthera ciliata inclusis. Stylus
exsertus. Stigma capitatum

Abelonea L. foliis linear lanceolatis, f. glabris, floribus umbellatis oblongis antheris

inclusis calycibus ^{grati}

Habitat in Tyrolia ⁱⁿ Schlangenbusch

affinis multiflora. Fruticulus ramis ramulique verticillatis cinereis glabris
super ne ore ^{latis} ^{pubescentia} ^{tomentosis}!! Folia pedicelata, ^{res} ^{semunquicula}

3-4-5.

Canis quaternis ^{obtusis} ^{supra} ^{plano} ^{lobis} ^{subtus} ^{marginibus} ^{leas}
fimbriis utraque linea tenuissima albida ^{super} ^{grata} ^o ^{ulo} ^{at} ^{ornato} ^{marginis}
nulli ^{miris} ^{spinis} ^{filatis}. Flores terminales pedunculati umbellati cincti

in nemis et nemu-
lis florentibus

6. pedunculi semunquiculares ^{argulati}. Bractea ^{duo} lanceolata colorata
alter in medio pedunculi ^{alter} ^{ad} ^{basin} ^{calycis} ^{opposita}. Calycis foliola ovata
acuta ^{colorata} ^{vel} ^{nigra} corolla ^{triplo} ^{breviora}. Corolla oblonga pallida ^{purpurea}
lacinae limbi ovatae acute. Stamina filamentis. Anthera aristata ^{inclusa}
Stylus corolla longior stigma obtusum

pyramidata E. foliis pubescentibus floribus racemosis infundibuliformibus stylo
pubescente

Enea pyramidata anthenis multioribus inulsi; corollis infundibuliformibus
quadernis; stylo pubescente, foliis quadrernis pubescentibus Hort. Vien

3. pag. 491.

Habitat in Q. b. spec. 5

Rami ^{et ramuli} filiformes ramuli alterni. filia acrota. floris in apice ra
morum solidari fere pedunculati. bractea sub calyce nulla
Calycis foliola ovata attenuata.

Rami villosi, sparsi, per intervalla conferti, elongati hab. la manth

Forsk. *Halimolobos* E. foliis linearibus glabris. Veris floribus verticillatis variegatis com-
punctatis calycibus ovatis antheris exsertis

Habitat ~~Compendium~~

Enicostema verticillatum verticillo ex ala folii prodeunte Forsk. Deserv

may 210
Habitat Compendium vol. 3

Rami verticillati ramuli canescentes. folia terrena patula
superiora ad presertim longitudo sine internodiis in dorso folii serrata
seorsim axillares pedunculati. pedunculi basi tritici minuti. Calyx
corolla duplo brevior. corolla glabra filamenta corolla longiora
anthera mutica ad basin usque partita laciniis variatis

affinis mediterranea

mammosa ^{patentibus} Encia foliis senis lanceolatis glabris, floribus umbellatis, calyce tubulato glabro
 Thunb. Diss. pag. 42. nobis. ^{ovato ciliato}

Encia mammosa. antheris anfractis cordatis grossis, stylo exserto squarrosus
 in Lin. Mont. 234* Lin. S. V. p. 365.

Habitat in Cap. b. p. 7

Caule ^{verticillat-} cuneo-fusco, erecto glabro. Ramis ~~subtrichotomis~~ ^{trichotomis} laxis flexuosis
 ita enim trichotomis ramulosis, subfastigiatis. Folia supra plana subtus
 convexa, integra patentia, curvata, ^{maxima} ab unguiculata. Flores termina-
 les, plures. Pedunculi villosi exserti foliis longiores. Calycis foedera
 corolla duplo breviora. Corolla obliqua ^{antheris} truncata, glabra, inar-
 nata unguiculari. Antheris anfractis ^{antheris} stylisque ^{antheris} inclusis

24 Plukenetii Enca foliis linearibus glabris, floribus racemosis cylindricis, bracteis remotis calycibus simplicibus Thunb. Diss. p. 21. n. 22.

Chamaepithys othiopica, foliis late ovatis, flore oblongo pinnato plusquam eleganti f. Plukenetii Pluk. mant. 45. t. 344. fig. 3.

Enca Plukenetii antheris multibus longissimis exsertis, corollis cylindricis stylo exserto, calycibus simplicibus, foliis ternis Lin. f. v. p. 369.

Spec. pl. p. 504.

Habitat in Q. bona spei.

Glaber erectus pedalis. Rami dichotomi et trichotomi, noduloso scabri e caesa foliorum, erecti; ramuli fastigati. Colea trigona, acuta incurva unguiculata. Flores in ramulis inter folia racemosi, cernui. Pedunculi recurvati, ~~bracteis remotis~~. Calycis foliola ovata acuta cernua, integra, vix patens glabra corollae quadruplo minor. Corolla purpurea glabra. Antheris multibus linearibus exsertis pollicaribus. Stylus exsertus longitudine filamentum parum incurvatus Thunb. l. c.

4) *fruticosa* Linné a foliis lanceolatis clypeatis, floribus racemosis secundis globosis, ramis
glabris Thunb. Desf. p. 15. n. 94

Habitat in Cap. bono p. 1/2 ^{et in Madaga}

Rami albescenti, glabri. Folia terrena, margine revoluta erecto patentia
internodiis duplo longiora, unguiculata. Flores albo viridescenti
varia ramis erectis et inflexis

2 melanthera Erica foliis ^{complanatis} trigonis glabris, floribus umbellatis, bracteis ovatis catis
antheris inclusis

Erica melanthera. antheris multae medicinis, corollis campanulatis calyce
colorato longioribus, stylo exserto, foliis ternis in Kant 232. & P.V. p

367.
Habitat in Cap. b. p. i. 5

Cauli erectus flexuosus pedalis ramosissimus ramulis ^{virgatis, ceteris} pubescentibus. Folia
linearia ^{obtusis} ~~obtusis~~ ^{longis} apice patulo, frequentissima ^{interstitiis longioribus}
Flores ^{numerose} ~~terminales~~ ^{goniis, p. m.} ~~terminales~~ ⁱⁿ ~~ramis~~ ^{ramis} Pediculi longi
rudine corolla ^{ovata} ~~late~~ ^{ovata} purpurei. Bractea ^{ovata} ~~lanceolata~~ ^{ovata} alternis colo
ratu. Palyx coloratus sanguineus ~~obovatus~~ ^{obovatus} folioli ovatis acutis
to apice carinatis corolla brevioribus. Corolla fere purpurea
lacinus ovatis. Anthera atro longitudine fere corolla inclusis. Stylus
exsertus

~~ant. of~~

Conifolia *Enea* foliis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis glabris, calyce naviculari inflato tuberculato Thunb. Desf. pag. 462 77.

Enea capensis, cordatis foliis, flore rubello Pet. gar. 7. t. 3. fig. 7.

Enea conifolia antheris cristatis corollis oratis, stylo incluso calyci
tus tuberculatis, foliis ternis floribus umbellatis Lin. h. v. p. 366.

Spec. pl. pag. 507 * Berg. Cap. 100.

Habitat in Cap. b. p. c.

Stemulus glaber fusco cinereus palmari vel pedalis minus ramosis
ramis que simplicioribus longioribus quam ^{nevis} in aliis subsistunt
folia interdum ciliata internodiis paucis longiora, imbricata
flores terminalis scopuli. Bractea lanceolata, albo purpurea
apice fusca. Calycis foliola naviculari: apice compresso fusco
inflata glabra pallide purpurea corolla fere longiora
Corolla inflata oblonga glabra pallide purpurea, ore contracto
acuto fusco. Anthera cristata stylusque inclusis

89 Squamosa Enca foliis trigonis oppositis, floribus umbellatis calycibus turbinatis novicula
tandem corolla brevioribus

Habitat in cap. b. sp.

Similis confolia at ramosis gemis; ramis foliis geminis; ^{Dichotomis multoties div.} floribus ^{fastigiatis} ~~umbellatis~~ minus.
Cognoscitur in umbella corolla calyce longior an tantum varietas
Anthera trispicata stylusque inclupis pedalis glaberrima
corolla E. conf.

73 *perfoliata* Erica foliis ternis quaternisque Vaginis glabris, floribus umbellatis Calyce
ciliato Herb. Desf. pag. 39. n. 62.

~~β Erica subvarianata B.~~

Erica *perfoliata*: antheris anstatis corollis campanulatis, stylo inclusis, caly-
cibus ciliatis foliis quaternis Lin. Mant. 230. * S.V. pag. 365

~~β Erica milleflora Berg~~

β Erica *tenuifolia* flosculis suave rubellis Pluh. alm. 136. t. 279. fig. 2.

Erica *africana* angustifolius foliis, flosculis in capitulum congestis herb.
mus. 2. p. 46. t. 44. fig. 4.

Erica *milleflora* Berg

Erica *paniculata*: antheris cristatis, corollis campanulatis, stylo exserto

V. floribus majori foliis ternis, floribus minutis Lin. S.V. pag. 366.

β Erica *pubescens* in ramis et ramulis, sputhamous vel ultra. Ramuli feli-
formes frequentes virgati. Solia raro ternia in nonnullis: laseo in plurimis
quaterna obtusa, rarius integra, fopius tenuissime ciliata, glabra, imbri-
cata, vix lineam longa. 8 locis terminalis, copiosi incarnati, minuti, cer-
nui. Bractea pallida, subciliata. Calycis foliola, ovata, acuta, subarista-
ta, ^{vigo amato} tenuissime ciliata, corolla duplo breviora. Corolla campanulata sinu
caicnicium petala. antheris anstatis inclusis, purpureo. Stylus fornus
inclusus

Habitat in Cap. b. p. c.

variat foliis ternis quaternis & ciliatis integris. 2) Corollis majoribus & minoribus
campanulatis vel magis globosis 3) Antheris stylisque unilapsis vel est fertis
varietas foliis glabris ternis quaternisque ramis glabris floribus racemosis, calycibus
tuberculatis, corollae tetragonae glabrae antheris longitudine germinis

Monsoniana *Encia* foliis ovatis glabris, floribus solitariis caule erecto Th. l. i. pag

59

Tab. 4. * *Lin. Suppl.*
Encia monsoniana foliis ovatis, stylo incluso, corolla oblonga, inflata, calyce
calyceato, floribus terminalibus, ramulorum obtusorum *Lin. Suppl. p. 223.*
Habitat in montibus C. bono pect,
rarsima *Enciana* et speciosissima floribus magnis albis

Caulis pubescens, aphyllus, bipedalis. Rami pendentes, frequentes, foliis tereti
brevissimis simplicibus. Stipulae imbricatae. Stipulae nutantes. Pedunculus
pubescens et flexuosus. Bractea ovata cernata, acuta alba, calyce
paulo brevior, in medio pedunculi. Calycis foliola, ovata, carina
ta, alba, glabra, corolla triplo brevior. Corolla ovata-oblonga
sensim parum attenuata, inflata, pollinaris, laciniis obtusis, brevibus
limbo. Anthera et stylus inclusus. ab *C. halimifolia* differit foliis
ovatis, corollis minus profunde partitis et minus inflatis, floribus
copiosissimis, caule erecto Th. l. c.

4 tetragona *lutea* foliis lanceolatis ciliatis, floribus racemosis secundis tetragonis *Lin. Thunb. & J.*
p 14 # Tab. 4. #

Enic. tetragona foliis ternis stylo inclusis, corolla tetragona oblonga, calyce lineari,
floribus racemosis. *Rich. Suppl. pag. 223. L. V. pag.*

Habitat in *C. bono* p. 17

Caulis glaber, bipedalis. Rami verticillati, inferiores longiores superiores breviores; raro ramulosi. Folia trigona, imbricata, unguiculata. Pedunculi brevissimi ~~bracteis~~ foliis similibus. Folia calycina foliis similia adpressis, corolla duplo breviora. Corolla laciniis reflexis.

Differt a *lutea* corolla tetragona, calyce lanceolato, ciliato, antheris mucicis, foliis ternis Th. L. C.

Bergiana *Enicæ foliis lanceolatis scabris, floribus subternis, calyce reflexo ciliato*
 Thunb. Desf. p. 48 n. 91.

Enicæ Bergiana: Antheris inflatis corollis campanulatis, stylo inclusis,
 calycibus reflexis, foliis ternis Lin. Mant. 235 t. L.V. p. 364.

Habitat in Cap. b. p. 179

Caulis rufescens, cinereo hirsutus, squipedali totus velut ramis et
 ramulis virgatis floribus. Folia ternis, petiolo imbricata lineam
 longa. Flores in ultimis ramulis umbellati, subterni. Calycis foliola
 ovata, acuminate, corolla duplo breviora. Pedunculus latus, bractei
 filiformibus, albis minutis. Corolla campanulata glabra, nec perispermica
 sine lacinearum excavata. Antheris inflatis styloque inclu-
 sis. Pulcherrima tota tectae floribus speciosa Thunb. l. c.

1050 E. ^{oblonga} foliis linear lanceolatis ciliatis, ramis hirsutis floribus lateralibus racemosis
calycibus sulcatis

Habitat in cap. b. perit

Rami termentosi subhirsuti. Folio terna subtus convexa a pulio exarata
super plana ciliata. peduncululi axillares solitarii capillares longitudi-
ne fere filorum. calycis floscula minuta lineari vix ciliata. Corolla
oblonga anthera exserta mutica. stylis antheris longior

calycibus corollam squam

herbacea *Erica foliis linearibus glabris, floribus racemosis secundis* Thunb. Diss. p. 30

44

tabul
n. 43

Erica conifolia VIII Claf. h. 1. p. 44.

Erica herbacea procumbens Bauh. pin. 486.

Erica herbacea: antheris mutis exsertis, corollis oblongis, stylo exserto, foliis quaternis, floribus secundis Lin. t. V. p. 370.

13 *Erica conifolia* IX Claf. h. 1. p. 44.

Erica procumbens, ternis foliis, carnea Bauh. Pin. 486.

Erica carnea antheris simplicibus exsertis, corollis ovatis sublongioribus foliis quaternis triangularibus patentibus glabris Lin. Spec. pl. p. 504

Habitat in Europa media, oriente 13. in Pannonia helvetia, Baldi Tridentini arenosis.

Erica papillosa, glaber: ramis erectis ramis laxis. Folia quaternis cannata, erecta pendente semiconvulsula. Flores carni albedi. 13. mitea prope calycem, minuto pallida. Calycis foliola lanceolata, concava, glabra, corollam squamata.

Th. L. C. antheris exsertis herb. Juss.

Erica lecta in Monte Moreay sub hoc nomine in herb. Guss. vidi ad ducem
16 ab herbaceo