

Erica

proelluceni *Encia* foliis ovatis margine ^{fiatis ciliatis} subtus incanis

Habitat in capite bono ^{peii} ^{Schumaker} ^{caule ramis hispida} foliis ovatis margine ^{revelatis} acutis

Similis *Encia* ^{pepida} ad ^{Dwopa} ^{tryplo} foliis majoribus ^{marginibus} ^{habernomis} pelopis
floribus terminalibus plures, majores antheris ^{subsex} fertis. Flores plerumque
s; globosus ^{compensati} oblongi. Calyx minutus foliis ovatis ^{subciliatis}
tus colore corollae. anthera mutica.

quadriflora E. foliis linear lanceolatis ^{subhidis} villosis, pedunculis lateralibus quater
nis corollis ovatis globosis congruibus, calyce reflexo
Habitat in C. b. p. in Holbel

Rami ramuli, pedunculi et folia ^{bracteati} ~~villosa~~ ramuli breves floriferi
oppositi, frequentes. folia ^{guatem.} ~~angusta~~ ^{patentia} linear lanceolata, subtus pilis
albido supra planiuscula, basi unguiculata acutiuscula
Pedunculi quatuor ex apice ramulorum colorati, filiformes
unguiculati: medio bracteis brevis parvis linearibus. Corolla
subglobosa glabra ventre hyalino pallid albido purpurascens
limbo purpureis ovatis. Calycis foliolo ovata acuta reflexa
anthera ~~et~~ villosa. Anthera inclusa instata; stylus caeli
fus. Stigma obtusum

affinis Erica formosa Thunb. differre videtur foliis
non ovatis glabris: bracteis calycis non approximatis. an me
no ^{mea} ~~certa~~ diversa

terrar E. floribus axillaribus ^{pubescenti} ~~valloso~~ viscosi foliis linearibus octonis superiori-
bus pubescentibus

Habitat in C. b. p. in Holbet. 5

Rami superne oculo armato pubescentes. Folia octona subulata,
ramulorum ^{vegentia} pollicina erecta conferta margine sicabra superiori
magis pubescentia subviscosa. Flores axillares verticillati, breviter
pedunculati folia duo semi unguem ulam viridia ^{pubescenti} ~~valloso~~ viscosa uti
calycis foliola. Foliola calycina fructifera bracteae nam corolla di-
midio breviora. Corolla pallida & limbo rufescente unguiculans
lacinae limbi rotundatae. Anthera inclusae mutuae. Stylus
inclusus.

taxifolia Erica anthems inclusa ^{ibid} mutis, corollis oblongis Terr umbellatis, calycis campanula
to colorato squamato, foliis cuspidatis glabris
Habitat in cap. b. p. in Holleb.

Rami et ramuli verticillati erecti, subsessili glabri. Folium
ternis ^{triquetra}, quatuor angulata, glabra, mucroni flavescente ter
minata. Pedunculi ~~intra et~~ axillis ultimis umbellatis purpurea
fentes glabri semurquiculares in medio foliola duo linearia
acuta per hinc carnata carnat calycis foliola magna ovata
palle albido purpurea circa apicem versus carnata, acumi
nata longitudine corolla reniava. Corolla ovata oblonga
superne purpurea limbi lacinis ovato acuto. Anthera
inclusa mutis. Stylus inclusus, stigma capitatum

margaritacea Enia flores terminales, corollis unicolorato-campanulatis Hort.

167

hew. 2. p. 204

Habitat in C. b. pruit, *Chamaether*

Flores terminales 4-8 & supremis axillis. Pedunculi filiformes, foliis breviores. Bractea tres lineares. Calycis foliola e basi lata subulata, carinata: canna Julio exarata, loria sesquilinearia. Corolla alba tubus unicoloratus calyce paulo longior. limbi laciniis obtusa. Anthera bipartita inflata, inclusis. Stylus longitudine corollae stigma capitatum Hort. hew. germen purpureum.

Rami glabri virgati ramuli tres verticillati filiformes escit; sesquipolli ^{in ramulis} cavis et ultra folia ternis linearia (acrostia) glabra patentia escito internodiis longiora conferta

61 nigra *Enca foliis oblongis glabris, floribus ternis, bracteis acutis imbricatis*
Thunb. Desf. pag. 35. n. 53.

Enca africana foliis coriis minore flore albo Seb. Mus. 2. p. 11. t. 9. fig. 7.

Enca lanifera Berg. Cap.

Enca nigra antheris anisatis, corollis campanulatis, stylo incluso, calycibus imbricatis trifloris sessilibus *Lin. Mant. 65. * S. V. p. 364. Burm. prodr.*

Habitat in Cap. b. p. 5

Caulis brunneus ^{in partibus} ~~erectis~~ sesquipedalis. Rami et ramuli verticillati et sparsi.
Cinereo tomentosi. Folia oblusa, margine tenuissime scabra, nitida, basi adpressa, a medio patentiter recurvata, lineam longa. Flores terminales pedunculati erecti. Bractea oblonga carinata, alba, calyci approximata, calyci ternis. Calycis foecula ovata, acuta, caninata, tenuissime margine scabida, alba, g. labro, corollam subsequens, corolla campanulata, albida. Antherae anisatae, purpureae, stylusque inclusus Thunb.

in Specimen herb. Mus. flores naturales. Bractea ovata, carinata, acuta. Corolla laciniis ovatis.

Desf. et C. Martius

Lin. a foliis C. Martii est secund. herb. Mus. *Enca* quam olim Gabronina
nigra habuit ~~non vidi~~

mucosa Eria foliis ovatis serratis glabris, floribus umbellatis viscosis, calyce
ovato colorato Thunb. Disf. p. 46. n. 76.

Eria ferrea Berg. (Thunb.)

Eria mucosa: antheris anfractis corollis subglobosis, mucosis stylo inclu-
so, foliis ternis Lin. Mant. 232 * S. V. p. 364.

Habitat in C. b. p. 1/2

Caulis glaber, erectus, tener, pedalis. Ramuli filiformes, erecti, sergati.

Folia ternata obtusa, margine serrata scabra, imbricata, lineam
medium longam adpressa: Flores terminales subterni purpu-
rei. ^{in p. 101. certum. plurimum} Pedunculis ^{longitudine} longitudine ^{florum} florum. ^{bracteae calycis appo} ^{bracteae} ~~bracteae calycis appo~~

~~Hamato, narsiculari purpureo, tenuissime ciliato minutis~~

~~capulis remotis puberulis ovato concava apice intus~~
fatis carnata remota Calycis foliola ~~narsiculari~~ ^{narsiculari} adpressa purpurea

~~longitudine~~ longitudine corollae, ^{narsiculari} ~~ovata~~ ^{narsiculari} ~~acuta~~. Corolla campanulata
globosa pallide purpurea. Anthera inflexa stylusque
inclusus Th. l. l.

facie obliquo foliola calycina apice callosa. folia potius
oblonga in specimine Lehmanni, loca

~~manu Lehmanni~~ ~~Thunb.~~ Thunb. quae convenit affertur in variis a Thunb

virescens *Enicæ* ^{*Enicantibus*} foliis lanceolatis glabris, floribus racemosis secundis Th. d. s. p. p. 37

Enicæ *conos* foliis 3. Clus. 1. p. 42.

Enicæ *viridis* *purpurea* *major*, floribus ex herbaceo purpureis Paub. Pin. 485.

Enicæ *viridis* *purpurea*, antheris cristatis, corollis campanulatis, stylo incluso foliis ternis, floribus spicatis Lin. l. v. p. 364.

Habitat in Lusitania &

~~Flores secundis, purpureæ. Ramosissimus, ^{ramis cinereis} virgatus ramulis 45. verticillatis folia glabra obtusa sulco exarata ^{extus convexa}. Flores ⁱⁿ apice ramulorum ^{calycibus imbricatis} ~~3-4~~ ³⁻⁴ ~~crustatis~~, ³⁻⁴ ~~cannatis~~ ^{acutis} ad basin calycis ^{appressis}. ~~Folia~~ foliola calycis ^{minor}. Calycis foliola ^{structuræ bractee} ~~anther~~ ^{anther} ~~Corolla~~ dimidio brevior ~~Corolla~~ ovata ^{stam} ~~na~~ ^{et} ~~stylis~~ ⁱⁿ ~~inclusis~~ ^{antheris} ~~cristatis~~.~~

Corolla campanulata purpurea, antheris inclusa uti stylis
mea planta cum a Dr. Holbel cum Clusio convenit modo quod
fereis ex supremis axillis ut fere umbellatis. Sci: Linne corolla multo
quod non in mea.

glabra. ramuli qui verticillati. Folia quæ linearia patetibus. Flores la-
terales pedicellati. Calyces simplices lanceolati. Antheris mutis. Stylis-
inclusis. hab. Mus. d. d. d. & Gussen

~~altera off~~ *Enicæ* *conos* foliis ~~43~~ ⁴³. d. d. d. & Gussen

polyantha E. corollis campanulatis lateralibus calycibus ^{canicollatis} ~~ovatis~~ brevibus.
 foliis ^{linguatis} ~~lanuginosis~~ in tenui glabris ramulis villosis
 Habitat in capite bono spec. Dr. Holbel.
 Ramuli terni pube villosuli. Ram. ultimi longitudine foliorum flori-
 feris. Folia ternia patentia subtus parum convexa, incurva glabra
 loria semunquiculana. Floris copiosi, in ramulis ^{foliorum} axillis ~~axillis~~ ^{axillis} Mamulorum
 ultimorum ~~rami~~ ^{ramuli} pedunculati ramulorum longitudine inferne versus
 bractea duo parva. Corolla mag. nitiditate. Ence vulgari purpurea po-
 limbi laciniis ovata. Anthera cristata. Stylis inclusa. Stylus lon-
 gitudine corollae. Calyx viridi purpureus foliis connatis glabris
 integerrimis adpressis

Lopana affinis

Panicum s. *culmo* *tereti*, *capitulo* *oblongo*, *involucro* *monophyllo*, *glumis* *margina*
~~*Panicum* *Thunb.* *prodr.* *pag.* *16*
Habitat *in* *C. b. pra.*~~

non vidi

fructu Ex. corollis terminali umbellatis cæcis oblongo-campanulatis, calycis
lanceolato brevi; foliis lineari lanceolatis patentissimis

Habitat in Europa australi

Rami et ramuli glabri et subquini verticillati filiformes. Folia qua-
terna glabra plana utraque viridia subtus margine parum craspedo
obtusiuscula. Flores terminales 4-5 nutantes purpurei laciniis bin-
ti erectis. Anthera enfiata uti stylus inclusus

glomeratus - S. culmo tergono folios, capituli paniculati, glumis ciliatis
~~Thunb. Flor. Ind. Cap. pag. 17~~
~~Habitat in Cap. b. p. i~~

non vidi

71
caffra Erica foliis linearifidulatis pubescentibus, corollis ovatis congestis.

Erica caffra-anthens aristatis, corollis ovatis, stylo exserto, foliis quaternis pubescentibus, floribus congestis Lin. t. IV. p. 365

Habitat in Cap. b. p. 7.

mea a Dr. Holbel videtur potius esse perfoliata

non videtur

~~responsum meum Erica foliis triquetris glabris corollis ovatis~~

divaricata *Daphne* floribus ^{resplendentibus} aggregatis terminalibus, foliis lanceatis
ramis subdichotomis divaricatis

Habitat $\frac{1}{2}$

a *Daphne* *Cneoroides* differt ramis flexuosis dichotomis, divaricatis
foliis quadruplo angustioribus acutis, floribus

var *Daphne*

pentaphylla E. flonibus lateralibus campanulatis. ~~se~~ calycibus ovatis imbricatis
subopaque foliis quinque lanceis imbricatis
Habitat in cap. b. p. in An. Holbel.

Ramuli ternato verticillati foliis imbricatis ovatis, glabri
folia sua oblonga dorso convexa sulcis exarata retida glabra. Pedin-
culi axillares albi longitudine foliorum Flores nudantes. Calyx
basi bractei bractei ovatis quaternis imbricatis. Pericarpium calycis
ovata uti bractea alba cinnamomea adnata breviter obtusa. Vermenata
Corolla parva rubescens calycis parum longior. Anthera inclusis
inclusis. Stylus inclusus

Sporantha E. corollis glabris umbellatis globosis viscosi calyce ovato adpresso, foliis
oblongis obtusis

Habitat in Cap. b. spec. in Holbel

caulis ramentaceo ramuli glabri & verticillati. Folcia ⁴ parva glabra
nitidiuscula dorso linea exarata, coria obtusa erecta subadpressa inter
nodis parum congrua Pedunculi terminales ramulorum plerumque
quatuor bractea inferior duo superne opposita. Calycis foliola ova
ta basi colorata, apice vix incurvata corolla dimidia breviora gla
bra. Corolla globosa ^{vix} magnitudine conarii incarnata glabris viscosa
anthera inclusis cristata. Stylus unicus

flavescens E. corollis ~~calicibus~~ ~~v. tubulosis~~ ~~v. viciis~~, calycis ^{ibusque} glab. lanceolatis viciis
foliis quaternis triquetris glabris #

Habitat in Cap. b. p. in Holbel

margine sabrosipuli

Affinis E. visfidia foliis pinnatis rami glabri. Pedunculis
longitudine foliorum. Flos nutantes flavi obtusi unguiculati
viciis villosi. Calycis lobula lanceolata, media non trilobata corolla
duplo brevior. Calicis limbo rotundato

38 grandiflora Erica foliis linearibus glabris, floribus racemosis glabris
Thunb. Desf. p. 24 n. 20

Erica grandiflora: foliis ^{quatuor}ternis, stylo inclusis corolla tetragona, calycis
linearibus, floribus racemosis secundis Lin. Suppl. p. 223. S.V. p. 370

Habitat in Cap. s. p. 4

Cauli pedalis, erectus fraxilis. Rami alterni vel verticillati simpliciter.

Folia quaternaria acuta glabra subtus convexa incurvata patentia
summa recta, erecta, unguiculata. Flores ^{erecti} ad apicem ramo-
rum erecti. Calycis foliola ovata ^{valde acuminata} acuminata, corolla multoties bre-
viora. Corolla curvata, pollicaris ^{glabra}. Antherae multae stylis
que inclusis. Thunb. l. c. a coarctata modo differt foliis quater-
nis corollaeque glabris

albent E. corollis ovatis acutis oblongis acuto axillaris lateralibus ternis
Secundis, foliis ternis

Enda albent antheris muticis inclusis, corollis ovatis oblongis acutis
Secundis, foliis ternis. Lin. Mat. pag. 291.

Habitat in C. b. spec. 4

Caulis frutescens, ramis determinatis, ^{glabris} vixatis. Folia ternis, patentia
venis ut lana, corvæ, glabra, linearia, acuta. Pedunculi axillares
foliariis e gemmula oblonga squamis lanceolatis pallidis. Bractea duo
membranacea versus apicem. Flore nudæ. Calyx sicnopus
folioli albi ovatis acuminatis, corolla dimidiis brevioribus. Corolla
albido flavescens ventre hyalino. Limbo infundibuliformi
brevi angustato laciniis acutis. Anthera inclusa mutica brevis
obtusæ. Stylus inclusus. Stigma obtusum

42
ventricosa Erica foliis ^{trigonis} ciliatis, floribus ^{umbellatis} ventricosi glabri Thunb. Disf.
p. 27. n. 36 * Tab. 1

Habitat in Cap-b. frei t

Caulis erectus ^{perithamou} panicum ramosis, glaber ^{superne} piloso
subherpidus. ^{insequialari} folia quaterna, subulata, ^{trino} acuta, ^{posteriora} ~~suprema~~ ciliata
^{inferiora} glabra ^{superiora} breviora ~~patentia~~. Flores terminales plures
erecti pedunculi villosi ~~pubescentes~~ unguiculares. Calycis foliola
subulata trigona glabra adpressa corolla dimidio breviora
Corolla inflata ovata. Longitudine pedunculi alba ^{purpurascens}
glabra subpellucida attenuata. ^{lobum versus interjectis purpureis} laciniis corollae reflectis acutis
Anthera mutica stylusque inclusus Thunb.

mirva E. ^{verticillataque pedicellati} floribus Capitato sessilibus, corollis oblongis stylo exserto foliis quinque
linearibus villosis incurvis

Habitat in capite b. p. in Dr. Holbel

Rami tenues. Folia copiosissima quina semiunciculana, lineana
planiuscula supra linea elevata glabra subtus sulc. con. v. u. scula
sulcis venisimo exarata villosa, obtusa patentia apice incurvo.
flores primum terminales in capitulo hemisphaerico foliis vert. d. am.
demum alternis exte. res. verticillati copiosi, pedicellati. foliola
nonnulla in pedunculo clavata apice e. conspicua villosa basi gem.
culata, calycis foliola angustissima lineana villosa corolla longitudine
corolla oblonga paperae purpurascens. Antheris muticis exsertis. Stylus
staminibus longior.

32 Curviflora Enea foliis trigonis glabris, floribus terminalibus solitariis curvatis clavatis glabris

Enea ^{aperta} capensis Seb. mus. 1. p. 32. t. 29. fig. 45

Enea curviflora: antheris muticis intus, corollis clavatis grossis, stylo intus, foliis quaternis glabris Lea. l. V. p. 368

Habitat in A. b. p. 17

Caulis bipedalis ^{vel} ~~per~~ ^{glaber} ~~vel~~ ^{velutulosus}, ramuli brevissimi frequentissimi, sparsi. Folia quaternis, imbricata lineam longa.

Floret in apice ramulorum cernui racemum quasi formans longum, subsessile vel sessile. Calycis foliola ovata acuminata glabra corolla quadruplo breviora. Corolla cylindrica obtusa sanguinea glabra pollicaris. Anthera mutica intus. Stylus subsexsertus Thunb. l. c.

~~an me Cannae quidet ramuli per intervalle conferta verticillate se distelli pluri appropinquat. folia ramulorum ciliata int. h. b. p. calyci~~

60
Centaurea Cnicoides foliis subulatis glabris axillaribus
Corollis cylindricis incurvis, stylo exserto, Calycibus subulatis basi
dilatis, bracteis remotis Hort. New. 2. p. 167

Habitat in cop. b. sp. 5
Rami glabri. Ramuli pubescentes. Folia terrena petiolata patentia glabra
Stemuntalia. Flores axillares. Pedunculi vix seminales. Si vel infidi
Bractea tres subulata inquetra. Calycis foliola e basi lata subula
ta carnata glabra, bilineare. Corolla intus purpurea, glabra sub
pellucida, superne parum ventricosa. Laciniis lato, acutiuscula
Antheris inclusis, anstata. Stylus corolla parum longior. Stigma
exsertum incurvatum Hort. New. 1. c.

~~Cent. Cnicoides~~
Cent. Cnicoides

45 *formosa* *Euclea* foliis ovatis integris glabris, floribus umbellatis sulcatis, calycis persistenti
integro Th: Desf. p. 497

habitat in Cap. b. pae 7

Rami sili formos sparsi, flexuosi circa villosi, fastigati. Folia supra
plana subtus convexa, persistentia. Flores terminaliter bini, terni, raro plures
cerui. Pedunculus folius longior, pallidus. Bractea ovata, pallida, calycis
approximata. Calycis foliola ovata, acuta, concava, pallida, corolla
triplo breviora. Corolla globosa, sulcata, glabra, albida, laciniis reflexis
Anthera et stylus inclusus Th. R. C.

nudiflora
pinnata

E. corollis ^{curvatis} ^{lateralibus} ^{concanibus} clavatis foliisque quaternis villosi, antheris
exsertis

Habitat in cap. b. pici ad Hölbel quicam sub nomine *E. nudiflora*
communicavit cui tenax folia venella tantum basi ciliata et
corolla longitudine foliorum, et pedicellorum. Deoque a nostra
diversa affinis *Eri. Thunb.* 23 - 31. diversa vero vel foliis vel
villositate corollae et foliorum

Rami villosi, ramuli prostrati, breves, frequentes apice flore unico
folia vix semiconvoluta, patentia linearia obtusiuscula
pateula subtus linea exarata, villosa juniora cineropientia. Pedun-
culi in apice ramulorum solitarii brevissimi. Calycis foliola linea-
ri lanceolata, cinnata villosa margine membranacea foliis parum
longiora et latiora. Corolla pollicinis sanguinea villosa. Cassi-
nis limbi ovata acuta. Stylus ^{superne} staminibus longior stigma obtusum
anthera exserta mucosa apice bifida
a *Subfl.* differt foliis latioribus

comosa Enea foliis ^{trigonis} glabris, floribus capitatis, calycibus ciliatis corollis
ovato cylindricis limbo plano Thunb. Diss. p. 20. n. 33 *

Enea transparens Berg. P.
Enea comosa: Antheris multius inclusis corollis ovato-oblongis, stylo inclusis, foliis
is quadernis floribus congestis Lin. Mant. 274 * S. V. p. 368

Habitat in P. b. ^{speci} ~~transparens~~
caulis glaber ^{erectus}, pedalis. Rami et ramuli dichotomi, trichotomi
et verticillati ^{superiores} filiformes, flexuosi ^{erecti} ^{ramuli frequentissimi} ^{virgati}. Folia
supra plana ^{subtus} sulcata, imbricata. Flores ^{et apice ramulorum per}
ramula ^{magis} quasi in spicam ^{vert.} ^{br.} ^{pedunculata} conosam ^{digitalem} formantis

Calyx ^{planus} ^{canaliculatus} ^{bractea} 3 ^{as} ^{linearis} ^{canaliculata} ad basin calycis
canaliculatus ^{bractea} 3 ^{as} ^{linearis} ^{canaliculata} ad basin calycis

caecino Cambi
ovata acuta

differt ab ^{er.} ^{partegato} ^{foliis} ^{subtus} ^{sulcatis}, flores in formam spica
in fra ^{apicem} ^{caulis} ^{ramulis} ^{terminalis}, calyce ^{stiliati}

ramulorum.

93
Popana Enca foliis linearibus ^{demissolatis} integris glabris, floribus umbellatis, calyce ovato ^{repleto} ^{facemops} corollis campanulatis

Enca pons foliis ^{glabris} Cluski. p. 40
Enca scoparia, flospulis herbaeis Lobel. 2. p. 215

Enca major scoparia, foliis deciduis Bauh. Pin. 405.

Enca scoparia athenis anfractis, corollis campanulatis stymate exserto
peltato foliis ternis

Habitat Boyonna & Hispania copiosissime ^{ramis mucicatis} ^{caulis foliosis}
Paulis erectis tripedalis ramosissimus mox genens tota glabra. ramuli

ultrami cortice cinereo. Folia patentia ^{inter nodos} ^{longiora supra} ^{et subtus}
3-4 ^{planis} ^{subtus} ^{concoloribus} ^{et oppositis}. Flores ^{conopsea} in ramulis bipollucianibus
Calyx ^{deco} foliolis ovatis integris corolla dimidio minoribus. Corolla viridis
stylus corolla duplo longior stigma peltatum anthera inclusae

crebre Er. arboream sub nomine scopariae describit Thunb. flores
nunquam umbellati sed longitudinaliter digesta per ramulos in
formam ^{cauli} ^{caulem} ^{hispidum} ^{inter} ^{millema} ⁱⁿ ^{loco}
natali observari

Enca arborescens, floribus luteolis vel herbaeis minimis Bauh.
hist. 2. p. 356.
Cluski descriptio et locus natalis cum nostra aegypti concordant

Cerinthoides Erica ^{Engelm. lanceolata} foliis oblongis ciliato-feratis, floribus cylindricis villosis, calyci
 bus ~~semita~~ ciliatis Thunb. Desf. pag. 25. n. 33. *

Erica africana flore purpureo Barth. ad r. p. 57.

Erica conis folio hispida, cerinthoides africana B. Rayn. Cent. 25. t. 33. Tab. mus. 2
 t. 22. fig. 4. & t. 34. fig. 6.

Erica cerinthoides: antheris muticis inclusis, corollis clavatis grossis, fymate
 inclusis ciliatis, foliis quaternis, Lin. L. V. p. 368. Spec. pl. pag. 506x

Habitat in cap. b. spec. 4

Caulis bipedalis. Rami de totomi & de totomi raro ramulosi caespitia
 penno columbina, ramis castagnati fimbriatis superne prostratis
 villosis, ^{subt. hispida} ~~pubes~~ foliis ^{muticis} inferna octona superno suprema quater
 na, feminae queculana, apice patula subtus folio exarato
 glabra. & lora magni pollicaris ad apicem latera versus
 apicem congesta in capitulum magnum, laterales nutant,
 terminales erecti. Pedunculi hispidi breves. Calycis foliola
 lanceolata ciliato-hispida adpressa corolla triplo brevior
 Corolla inflata truncata, pilosissima hispida semipollinari
 Anthera mutica tetragona inclusis. Stylus exsertus. vana
 corollis rubris pilosis, & corollis rubris fmgosis 3) corollis albis
 Crystallensis

57 Depressa ^{Ancari} Enea foliis oblongis glabris, floribus subracemosis, caule decumbente Th. d. p. 236. *

Enea Depressa antheris anfractis multibus corollis campanulatis, floribus raris, foliis ternis caule depresso his
m. p. d. f. n. s. 236 * f. v. p.

Habitat ad latera riparum cap. b. p. a. t.

in palmaribus, sicut in ^{linea obscura dorso} Diamis sparsi depressi. Folia supra ^{planis} concava subtus
trigono-concava, ^{linea obscura dorso} umbriata vix semiunguiculata. Flores racemosi vel termina-
lis albi. Bractea lineari, concava, pallida. Calyx planus foliolis oblongis
concoloratis acutis corollam aequantibus. Corolla campanulata, obtusa rubra glabra
Anthera et stylus inclusi stylus corollam aequans

103 *Physodes Eria* foliis linearibus, floribus umbellatis viscosis, calycis ovato brevi ^{Th. Da. p. 100}
Eria physodes: antheris conflatis, corollis ovatis inflatis, stylo inclusis, ^{2. n. 109*} foliis
 quaternis floribus subsolitaris ^{Lin S. V. p. 166. Spec. pl. p. 506*}
 Berg. Cap. 100

Habitata in Cap. b. p. ei.

Erectus glaber, ^{ramuli verticillati, foliis tertri} bipedalis. Rami terni, dichotomi, erecti, virgati
 ramuloti. Folia petiolata linearia, obtusa, supra plana ^{glabra} subtus
 convexa ^{apice ad medium} ~~ad medium~~ ^{in linea ciliata}, parum extus curva
 &c., imbricata-patentia, seminaque ^{in myopium 3-4} utraque inferiora pressa retro
 inflexa. Flores terminales ^{subterni} cernui, viscosi, pedo parum
 majores, ovati, albi, crystallini. Calycis foliola ovata, ad pressa
 pallida, brevissima. Anthera conflata stylusque inclusus. Thunb. l. c.

umbellati:
 corollis ovatis inflatis umbell. viscosi

22 hispida Erica foliis ovatis integris, floribus umbellatis globosis, calycibus inde
gnois Thunb. Desf. pag. 19. n. 207

Erica hispida Anthems muticus inclusis, corollis subrotundis, foliis peltatis
nisi ovatis acutis ciliatis, caule hispido Lin. Suppl. pag. 222 + S. V.

^{pag.}
Habitat in Cap. b. p. 5

Caulis erectus bipedalis uti rami et ramuli valde hispidi ultimi ramuli
brevissimi. ^{parvifloris floribus} folia ^{parva} ovata acuta integra, margine reflexa, ^{plena} ^{et} ^{non} ^{obscure}
et raro ciliata, patentia. Flores in ultimis ramulis pedicellati
raro solitarii plerumque tres vel plures pedicellis foliis longioribus
Calycis foliola ^{longa} ^{linearia} ^{longitudine} ^{sepe} ^{orbis} ^{glabra}
Corolla ^{minuta} ^{magnitudine} ^{Ericae} ^{prostratae} ^{albida} ^{glabra}. Anthem
muticus inclusis. Stylus corollae longior et fere stigma peltatum
a planifolia differt caule erecto. Anthems muticus foliis ovatis
ciliatis, revolutis, magis approximatis Thunb

glabris.

65
manifolia Enda foliis ovatis pubescentibus ^{subtus albidis} corollis ovato conicis Hort. kew. 2. p. 15

Habitat in C. bono ^{fricani}

~~Radice~~ pubescenti, caulis ternata patentia vix semunquialana
aucta. Flores terminalis pedunculati vel quini pedicelli brevibus.
Calycis foliola lineana corolla dimidio brevior pubescentia
ubi corolla. anthera aristata stylusque inclusus

corollis ovato-conicis pubescentibus

92 Inflor. Enea ^{temperalibus campanulatis} foliis subulatis glabris, floribus subternis, calyce ovato obovato, caule hispido
Do Thunb. def. p. 249. no. 79. tab. 5.

Antheris cristatis, corollis globofo campanulatis, stylo inebriso, foliis ternis
floribus terminalibus Lin. L. V. p. 366

Habitat in cap. b. p. 5

Caulis pedalis ^{hirsute} superne uti ramuli villosi hispidi cinerei, ramuli
frequentes ^{verticillati interstitiis longioribus spectantibus ariet.} virgati. Folia ternis glabra Inguetra caninato ^{acuta}
~~minuta~~ imbricata incurvata semiunguiculata. Flores terni
nates in ramulis solitarii binivi vel terni pedunculati cernui
pedunculati brevissimi. Bractea calyciformis, lanceolata
glabra alba. ^{attenuata acuminata fere} Calycis lobula late ovata acuminata, concava can-
nata, margine membranacea glabra alba a lumine fusco corollam
oquantia. Corolla glabra alba magnitudine Piperis. Anthera
aristata aristis pilis minutis cristata stylusque in densis.

56
lutea *Enea foliis* ^{oppositis} linearibus *Inyori glabris*

Enea lutea Berg.

Enea lutea: antheris ^{cinereis} corollis ovatis acuminatis, floribus congestis,
foliis oppositis ~~concoloratis~~ ^{cinereis} Lin. Mant. 234* S. V. p. 364.

Habitat in Cap. b-pai 7

Tridax glaber bipedalis erectus vixatus. Ramuli filiformes vixati.
brachia parva frequentissima vixati. Colica obtusa, sublus sulcata im-
bricata. Flores in ultimis ramulis solitarii, bini vel terni erecti.
Bractea linearis, obtusa concava, pallida. Calycis foliola
ovata acuminata, sub apice carinata sed prespa, concava corolla
duplo brevior. Corolla ovata attenuata semunquiculari, ore
ante flores in acuto, dem obtuso laciniis reflexis. Anthera
antherata stylisque in cupis.
variat corollis, calycibus et bracteis luteis et albis.