

Erigeron

4. caulis fruticosus.

1. neri folium E. arborescens, foliis lanceolatis integerrimis serratisque, floribus
corymbosis
2. ellipticum E. arborescens, foliis ellipticis integris dentatisque tenuibus glabris
3. ecceptoides E. foliis petiolatis ellipticis serratis velosis punctatis scabri, pe
dunculis ramosis
4. quadrifidus E. frutescens, ramis elatis articulatis,
5. tenax E. fruticosum superne glutinosum, foliis lanceolatis ovatis petiolatis
serratis, floribus corymbosis
6. salvifolium E. arborescens, foliis lanceolatis serratis, supra scabri subtus reticu
lato-nugosis, floribus corymbosis
7. molle E. fruticosum, foliis lanceolatis serratis supra retrosum scabri subtus
fenicis levibus, floribus corymbosis
8. glandulosum E. arborescens, foliis ovatis oblongis supra rugosis subtus to
mentosis, serratis glandulosis.

9. Dentex E. foliis ellipticis villosis tomentosis trinerviis superne dentatis integerrimis
 10. elongatum E. foliis oblongis serratis glabris, pedunculis terminalibus elongatis solitariis
 11. oppositifolium E. foliis ovatis acuminatis integerrimis trinerviis glabris, corymbis
 12. eupatorioides E.
 13. splendens E. foliis oblongis amplexicaulis tomento sericeo splendensibus floribus
 14. tenuifolium E. foliis linearibus pubescentibus, corymbis terminalibus
 15. parvifolium E. foliis linearibus margine serratis, floribus racemosis
 16. virgatum E. foliis linearibus lanceolatis glabris serratis, paniculis lateralibus
 17. cuneatum E. foliis cuneatis trilobis, floribus terminalibus sessilibus
 18. heterophyllum E. foliis cuneiformibus lanceolatis sub^{trilobis} dentatis, pedunculis subt^{trilobis}
 19. foetidum E. foliis lanceolatis linearibus, floribus corymbosis, caule piloso
 20. dichotomum E. caule suffruticoso dichotomo foliis linearibus villosis, floribus
 21. punctatum E. foliis oblongis sessilibus punctatis integerrimis coriis, calycibus
 lanosis discum superantibus

23. *Orthocentrus* L. foliis lineari-bus inferioribus viridibus superioribus integris
24. *pinnatifidum* L. foliis lineari-cuneiformibus pinnatifidis obtusis sesquipedibus, panicula
27. *incanum* L. ^{terminali} foliis lineari-bus som. entopis. pubescentibus, floribus corymbosis
 x x caule herbarico
24. *helianthifolium* L. foliis ovatis subquincunseriis, serratis glabris
25. *viscosum* L. foliis lanceolatis basi reflexis supra extropium denticulato serratis, pedunculis unifloris, calycibus squamis corollis radiatis
26. *glutinifolium* L. foliis lanceolatis - lineari-bus integerrimis pilosis viridibus, pedunculis unifloris
- ~~27. *spinosum* L.~~
28. *graveolens* L. foliis lineari-lanceolatis, floribus axillaribus ramosum, pedunculis subdiphyllis
29. *scandens* L. ^{supra} foliis lineari-lanceolatis scabri squamis inferioribus florem superantibus, pedunculis unifloris polyphyllis
30. *scandens* L. foliis ovatis serratis villosis, floribus axillaribus, caule scandente
31. *japonicum* L. foliis sessilibus obovatis serratis villosis, floribus paniculatis
32. *camphoratum* L. foliis lanceolato-ovatis villosis - serratis apice citharaceis
33. *bonariense* L. foliis inferioribus dentato-lacinatis, caulinis integris basi revolutis
34. *obliquum* L. foliis sessilibus oblongis denticulatis obliquis, caule piloso

35. purpurascens E. foliis petiolatis ellipticis inaequaliter serratis, paniculis axillaribus
calycibus coloratis
36. lidenflorum E. foliis cuneiformi oblongis basi angulatis dentato-sinuatis, floribus axilla-
ribus terminalibusque
37. trinerve E. foliis ovatis acuminatis glabris trinerviis, floribus corymbosis
38. purpureum E. foliis oblongis subdentatis amplexicaulibus, corollae radii capillares discolor
gombus, caule multi floro piloso.
39. gouani E. foliis dentato serratis margine scabri caulibus lanceolatis amplexicaulibus
floribus corymbosis
40. triplinerve E. foliis oblongis triplinerviis scabris, pedunculis unifloris
41. carolinianum E. foliis lineariibus integerrimis, caule paniculato piloso, floribus
subglabris terminalibus.
42. canadense E. foliis lanceolatis ciliatis subdentatis, caule ^{hirsuto scabro} floribusq; paniculatis
43. aegyptiacum E. foliis semiamplexicaulibus spatulato-lanceolatis, grosse subsen-
tatis, caule ramoso hirsuto, floribus paniculatis
44. rivulare E. foliis cuneatis acutis hirtis apice utriusque dentatis, margine ciliatis,
caulibus sesquibus, caule simplicibus exserto paucifloro
45. pauciflorum E. foliis semiamplexicaulibus lanceolatis basi dentato-lacinatis
apice integris dentatisque, pedunculis ^{cauliculis} subunifloris pilosis
46. inuloides foliis semiamplexicaulibus oblongis dentatis ^{cauliculis} basi subinifloris, peduncu-
lis unifloris

cuneatum Erigeron pilosum, foliis cuneiformibus dentatis, caulis diffusis, pedunculis
lo uni floris.

Habitat in India Orientali

Caules herbacei, plures, diffusi, teretes, palmares. Folia sessilia, semipollicaria,
inferiora cuneata, apice dentata, superiora magis lanceolata, costis utroque
late grossa serrata, semiamplexicaulia. Flores in apice, breviter pedunculati
lato, 1-2. Calycis foliola lineari

valde affine aegyptiacis, an diversum?

Cerasifolium Engerum foliis oblongis serratis glabris, corymbis compositis
alternis Tomentosis.

Habitat in India orientali König

Caulis herbaceus, erectus, angulatus. Folia brevissima petiolata
tri-pollicularia, utrinque, acuta, subtus pallidiora, supra viridis
aromato punctis albis et vellis oblitteratis, scabriuscula, juniora
villosa. Pedunculi ad apicem alterni, patentes iniani: foliolum
parvum ad basin ramorum corymbi. Corymbi fastigiatii, pedicellis
breves. Calycis foliola lanceolata. Flores parvi.

herb. hor.

agreste. Erigeron foliis inferioribus ovatis, superioribus ^{oblongis} ~~ovatis~~ sessilibus, pedunculis subbifloris.

Habitat in India Orientali

Caulis ascendens, spithamoi, herbacei, simpliciter, tenuis, sub
villosi. Folia inferiora, subpetiolata, unguiculata, inferiora sub
rotundo-ovata, superiora sessilia oblonga, suprema lanceolata
extrorsum obscure dentata, et pilis raris subhista. Pedunculi
superne, bi-triflori. Calyx villosus: foliolis lanceolatis.

herb. bot.

24 visiosum Eigeron pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis basi reflexis, calycibus squarosis, corollis radiatis L. S. V. p. 753. Mart. 468* Jacq. Hort. V. v. 2. tab. 165. Hort. Ups. 258*

Coryza magna Tur.

Coryza major Clus. h. r. p. 20. Dod. pempt. 51.

Coryza mas Theophrasti, major Dioscoridis Bauh. Pin. 265.

Virga aurea major, foliis glutinosis graveolentibus Tournef. F. R. H. 500. Vaill. 579.

Habitatio G. Narbonensi, Italia, Hispania &

Caulis erectus fructus, adpressus, pilis interjectis glandulis viscidis uti in foliis
5 Tolia amplexicaulia, basi deflexa, medio denticulato serrata, apice et basi integerrima, crassiuscula sequi-jollicana, rudimenta ramulorum in axillis
superne ramis floris Pedunculi axillares solitarii, uniflori, plerumque dichylli
ex superiore parte caulis, inferiores Congrossi, superi ores semper breves. Calyx
umbonatus supremis Corollae lineari oblongae. Corollula flavae, Pappus subpurpurascens

litum Engeron foliis spatulatis subrotundis inaequaliter dentatis, pubtus
pubescentibus, caule hirsuto.

Habitat in India Orientali König

Caulis herbaceus, erectus, teres. Folia bi-tripollicaria, supra punctis
albis callosis pubescentibus, hirsuta, & ciliata; subtus & vellis densis con-
tibus tomentosa, arenis, acutius nervosa, dentibus mucronatis
rigidiusculo, subpendente terminata. Pediculi ex axillis su-
premiis, foliosi. Flores sesqui parvi, incani. Calycis foliola linearis.

hab. hodi. quomodo infloresc.

pulchellum Engelm

Habitat in ^{Peru} ~~Peru~~ herb. Perh.

Caules erectus, herbaceus, simplex, striatus, villosus. Folia villosa, radicalia
pollicaria: caulium ovata

habes

Dioscorea Engason foliis lanceolatis inferioribus serratis superioribus integerrimis, ra-
misi caule altioribus

Habitat in montibus Carolina herb. Rich

Caulis herbaceus, erectus, pilis raris adpressis. Solia sessilia, remotis, peltatis,
superiora apice et basi integerrima, superiora undique ciliatissima, margine
pilis pubescentibus. Loxympha simplicis, late vales altioris Verminali. Pedunculi
conescentes. Calycis foliola lanceolata

lysopifolium Engelm

Habitat in Carolina herb. Ruth.

Caulis herbaceus, semipedalis, ramosus, tenuis, glaberrimus. Pedunculi terminales
ramosissimi, elongati, uniflori. Folia linearia, subpetiolata, integerrima, ope len-
tis margine pilis tana

habes

radicula Enyera

Habitat in Carolina herb. Ruhl.

Folia radicalia, petiolata, pollicaria, oblonga, acuta, basi attenuata, glabra
integerrima. Scapus erectus, pedalis, foliis uno alterove remotissimo, linearis,
superne in peduncululos 1. 2. 3. 4. Floris. Dwarfus. Peduncululi villosi. Calypsis
foliicola linearis.

Sicabidum Engson

Habitat in Cap. b. sprei herb. Royeni

Caule herbaceo, erecto, scabro & spinulis setosis oculo armato videnti, superne
divisus in ramos floriferos. Folia semiamplexicaulia, bipollicaria, lanceolata,
extrosus, supra attenuata pennatifida. Lacinis lanceolatis terminalis longior
marginis cinnamomeo setulis junctis scabra. Corymbi terminales, simplices, pauci
flori. Pappuli villosi. Flores Engsonii parum minores. Calycis foliola linearia, dorso
villosula. Pappus pallide ferrugineus.

primulifolium Engelm.

Habitat in monte video Composita herb. us.

Radix fibris crassis. Caulis herbaceus, simpliciter, erectus, striatus, villosus, scaberrimus, spithameus vel parum ultra, superne in pedunculatos diviso. Folio scaberrimo, infima et radicalia cuneata, sessilia, bipollicaria, obtusissima, obsolete venosa, remote dentata, in ferne versus integerrima: caulina remota, pauca, lanceolata, acuta, suprema integerrima. Pedunculi plerumque tres, uni-vel biflori, canini, saepe foliolo uno altero instructi. Flores Eng. alpini majores. Calycis foliola linear-lanceolata, villosa. Pappus niger, sericeus.

Ferulatum Engelm.

Habitat in montis vides Commeson herb. Guss.

Caulis herbaceus, semipedalis, erectus, basi ramoso uno vel altero: rami ascendentes,
simplices, striati, scabriusculi, oculo armato substriigosi. Folia sessilibus, pollicaria,
lineari-lanceolata, obtusiuscula, arena, enervia, margine tuberculis minutis
& allopsis, seta rigida terminatis, scaberrima. Pedunculi superne, laterales
frequentes, inferi uniflori, sursum versus sensim magis compositi. Calycis
lobula lanceolata

Spathulatum Engerm.

Habitatum monte video Commerf. herb. Tusf.

^{semis}
Caulis herbaceus, pedalis, erectus, simplex, villosus, scaber. Eodem paucis, inferiorem
semper amplectens caulis, remotis
bipollicaria, cuneata, villosa, mucronibus terminata, arenia, enervia, integra
rima, vel remote obscure denticulata, subcaescentia, scabra sicula: superior
in lanceolata, scabra, acuta. Pedunculi superiores, 3-4. Flores magnitudine
Eng. ~~alpinis~~ alpini. Calycis foliolo linear-lanceolata, villosa. Corollula radii
longi. Pappus purpurascens.

Unanofolium Engelm.

Habitat in Cantoni herb Surian apud Kuf.
Caulis erectus, sesquipedalis, teres, striatus, glaber. Folia sessilia, subtripollicia
nervi, linear-lanceolata, integerrima, margine scabra, utrinque attenuata
glabra, subvenosa. Ramuli axillares floriferi, foliosi, foliis pariter longioribus
Corymbi terminaliter, simpliciter. Calycis laxis: foliola linear-lanceolata

Heracleoides Engelm

Habitata monte video Commes. herb. Guss.

Raulis herbaceus, erectus, striatus, villosus, puber, superne in pedunculis diaph. d. d.
semiamplexicaulis, lanceolato-oblonga, inferna subuncata, obtusa, superne
ve acuta, dentato-subnata, suprema integerrima, acutiora, utraque e punctis
nili ferri scaberrima, basi ve super integerrima, margini subciliata. Pedunculi
superne, alterni, ^{10-12 pedo uno utrinque alterni} 4-5que, subnulli flori. Diversae magnitudinis Eng. alpini. Calycis
lobula linear-lanceolata, subulosa. Pappus purpuriferus

myosotoides Engelm

Habitat ad fretum majellanicum. Commes. herb. Turf.

Caulis herbaceus, spithameus, erectus, simplicissimus, biflorus, filiformis, ter-
tia sex polliciana, linear lanceolata, integerrima 6 in caule, remota, simplicia,
pelosa. Pedunculis ex axillis foliorum superiorum et apicis, solitariis, unifloris.
Composita foliorum, pelosissimi. Flor. E: alpina minor. Calyx hirsutus, folioli
lanceolatis. Corollula radii angustissimi, purpurei.
affinis alpina

Erpion

Habitat in monte vici rupibus.

Caulis lignosi, diffusus

pubes an. Despectum

Pharmitosifolium Engerm.

Habitata in monte video Comneson herb. huj.

Caulis herbaceus, erectus, sulcatus, angulatus, glaber, ramosis. Folia sesipila, tri-
polluciona, lanceolata, angustata, acuta, glabra, ovata, obtuse trinerviis, remote
serulata, basi versus integerrima, serraturae acuta; suprema integerrima. Corymbis
terminalis, compositis, pedicelli squamosi. Squama minuto. Calycis foliola lan-
ceolata, margine serrulata

an remotum meum

glabrum Egeron foliis lanceolatis semiamplexicaulis integerrimis subdentatis
que, ^{conspicuis} ^{hydropnificibus}
Habitat in Cap. 6. p. herb. Royani
Caulis herbaceus, erectus, teres, puerperascens, glaber, ut: tota planta, superne stri-
ctus et in ramis nonnullis floriferis divi fus. Folia lanceolata, basi versus sensim
attenuata, et 5 pollicaria, sensim sensim minor, remota, superiora basi subdentata
integerrima vel extrorsum dentibus nonnullis parvis subserata

2
Coubium Engenn. foliis lanceolatis scabris inaequaliter dentatis, corymbis com-
pitis

Habitat in Cap. b. spici. herb. Royeni

Caulis herbaceus, erectus, bipedalis, crassitie fere pennis cygnis, striatus, scabri-
sculus, superne in ramos floriferis diversus. Vicia remota, fistula, canna
per caulium decurrente, bipollicaria, inferiora extrosam sensim dilatata
suprema apicem versus attenuata, glabriscula, scabrida. Corymbi ter-
minaliter compositi. Flores parvi. Calyx non imbricatus, basi squamulis sub-
lobulatus. Corolla lineana
an Senecio potius? radix nullus

Ergerson

Habitat herb. La Mancha

Flores superne pedum cili: Pedunculi 2-3 flori

2

~~glutinosa~~
ellipticum
ellipticum

~~glutinosa~~
Enigeron ~~fruticosa~~ foliis ellipticis integris dentatisque trinerviis glabris
et lobis corymbosis

habitat in Brasilia Insula Francie in montibus altissimis
Rami teretes sulcati superne una eam petiolis pedunculis foliis pedun-
culis glutinosi

Folia alternis petiolatis elliptica cum acumine, basi angustiora
suprema integra, inferiora dantur uno altero remoto, acuta, ^{crassius, parum}

~~elliptica~~ ^{lobata} glabra bipollicaria, crassiuscula trinervia

petiolus brevis ^{longitudine fere folii} corymbis ^{multiflori} compositi
Corymbis in summitate pedunculis erectis elongatis fastigiatis

his hinc inde squamis lanceolatis, ^{minutis,} adspersis
Calyx hemisphaericus, squamis lanceolatis longitudine florum
Corolla radii ligulata bidentata

Stylus longitudine corollula
Pappus longitudine calycis albi ^{in festuca}

~~ca. melis Comina~~
varietatem ne fallor foliis minoribus omnibus integerrimis
florescens 2 hermaphroditi femine plurimum.

^{petiolatis}
Ecliptoides Engeron foliis ellipticis serratis pilosis punctato-scabris pedunculis ramosis
3 Habitat in Madagascaria 5

Primo intuitu Ecliptam asplenoides at receptaculum nudum, pappus pilosus.
Rami teretes villosi incani. Folia petiolata, ovata lanceolata ovata, utraque acuta
policiana, serrata basi subullosa punctis scaberrima pilis adpressis puncto
infidentibus adspersa. Pedunculi gemini ramulorum unius 3-4 flori filiformes
basi folio filiformi. Calyx squamis duplici serie aequalibus, exterioribus
linearibus pilosis.

6 molle Engeron fruticosa foliis lanceolatis serratis supra retrorsum scabriusculis
villoso tomentosis ^{nitidis} floribus corymbosis
habitat in Tapula Bourbonis
Caulis fruticosus ramis teretibus tomentosis
Folia petiolata, alterna superne ~~con~~ approximata, lanceolata
sesquipollicaria, serrata dentata basi integerrima supra villosa retrorsum
scabra subtus villosa tomentosa mollia subviridia
Corymbi terminales fastigati pedunculis villosis basi foliolis
linearibus
Calyx foliolis lanceolatis linearibus
Corollula radii caryopati ligula capillari
Pappus fulvo subferugineus longitudine calycis, hispidus

an varietas? Cotype angustatum la. Mart.

Uragia tomentosa

bahamense Er. foliis lanceolatis petiolatis integerrimis, corymbis terminalibus Scopoli Del. fl. et g. insubr. 3. pag 14. tab. 7

Habitat in Bahama;

Caulis fruticosus. flos culti radii trifidi

non radi.

7 glandulosum. ^{lespilobus} Erigeron arvensis foliis oblongis supra rugosis subtus tomentosis
senariis glandulosis
hab. in inf. Bourbonis 5

Rami teretes pilis longis tomentosis

Folia sessilia alterna, oblonga, supra rugosa subtus tomento-
sa nitida nervosa, serrata serraturis glandulosis, ciliata pilis
lucentibus, obtusa sesquipedaliana approximata

Corymbi terminales

flores magnit. Eng. acni

Calycis globosi squamis lanicollatis densopulosis

Corollula radii ligulati lineari

Pappus rubescens calycis longior

Coryza melastomoides fruticosa foliis sessilibus ovatis
dentatis trinerviis, supra nudis rugosis, subtus
tomentosis senariis La Mart. Encycl.

Lithospermifolium
Dentata Engeron, fruticosa foliis ellipticis villosis tomentosis trinerviis integris ^{& super} apice
que dentatis integris ve.

in montibus altis pennis Angula Francie. 5

Fruticosa ramis villosis nigris
Folia petiolata albena superne appressa imbricata elliptica, inter
gemina vel versus apicem dente utroque unico vel bido, villosa
tomentosa pilis distinctis acuta pollicaria.

Petiolus folio triplo brevior

Flores corymbosi terminales pauca

Calycis ~~foliola~~ lobula linearia pilosa.

Corollula radii tegula lineari

Pappus ut in reliquis

Coryza *Lithospermifolia* fruticosa humillima, foliis lanceo
latis apice dentatis utroque pilosis confertis, squamis
calycinis interioribus aridis La Martk Encycl.

11 Erigeron folus ovatis serratis attenuatis subtus villosis, corymbis
eupatorioides supra decomposito diffusis

flores radii lineares, feminei, Pappus pelopis. Habitus Eupatorii, foliola calycina disci
fo a reliquis part. Erigeron
Thunberg & madagascari

77 *truncatum* Engelm. *gracilifolium* foliis cuneatis trilobis L. Suppl. p. 360* S. V. 755.

Habitatio Mexico

Stem minor ramosissimus s. paniculatus foliosus. Folia alterna, pedicelata, cuneata, vix unguis longitudine nuda. Flores terminales, sessiles, aliquot congesti, longitudine folii. Calyx magnitudinis seminis lentis. Obovuli feminei apetalis, copiosi in ambitu. Pappus calyce vix longior, simplex L. Sup. l. c.

cy fat & cum Enigeron foliis lanceolato-linearibus, ^{subretusis} floribus corymbosis ^{Caryoph. perenn. piloso} L.S.V. p. 755
Conyza africana senecionis folis flava, retusis foliis Herm Lugd. 661. & 662.
Senecio foliosus africanus perennis, foliis confertim nascentibus Pluk alm 343.
4 223 f. 4.

Senecio africanus foliis retusis Mill. Dict. 4233.

Enigeron foliis lanceolato-linearibus retusis, floribus corymbosis L.S.V. pag. 755

Habitat in cap. b. spei 4

Caulis et rami lignosi idcirco suffrutex, teres sulcatus costae penna anseris
hirsutus. Folia sequi polliciana, amplexicaulia angusta (in mea uti
etiam in figura Pluk. et Herm aequalia) vix villosa in ramulis approxi-
ta in caule remotiora ^{foliosum} fasciculi et ^{conyzois} angulis axillis farni folia rudimenta
ramorum hinc folia copiosissima. Conyza terminalis, pedunculis vil-
loso tomentosis. foliolis subulatis ad basia pedunculorum. foliola calycina
subaequalia glabra linear lanceolata. ab Inula folida differt defecta
radix

20 Dichotomum Engeron. ^{pub}Caule fruticoso, Dichotomo foliis linearibus villosis
floribus terminalibus pedunculatis & terminalibus
solitariis
Caule ^{pub}fruticoso pedalis, Ramis dichotomis & setibus villosis
Folia linearia sessilia, integerrima approximata, integerrima
obtusae villosae semipollicaria
Peduncululus terminalis solitarius, uniflorus, brevis
Calyx foliolis linearibus villosis
Corolla magnit: cor. ac. us
Flores radii petalaei nudi
Pappus subferrugineus calyce longior
hab. in Gnj. Borb.

19-20 incanum Erigeron foliis linearibus tomentosis subdentatis, floribus corymbosis, caerule. frutic. qd
Habitat in Arabia felici Torrh. l.

Trides ramis tomentosis.

Solia sessilia, approximata, linearia, basi sensim angustata, acutiuscula, tomen-
tosa, marginem parum revoluta, interdum dente uno alterove.

Corymbi terminales, multiflori.

Calyx subvillosus, foliis ^{pedic.} linearibus.

Corollula radii nudi.

Pappus ferrugineus calyce longior

(Aliam inter Plantas Torrh. inveni foliis latioribus, obtusis, subtus rugosis,
specie tamen differre non videtur

21 *Cantharoides* Engeron pubescens foliis linearibus inferioribus trifidis superioribus integris
hab. in monte Video Brasilia

Caulis frutescens basi prostratus inferne ramifera rami teretes pubescentes
altitudine fere caulis ^{pa} sami pollicaria +

Folii linearia subpubescentia inferiora confecta, apice trifida, superiora pedicula

+ pubescentia

Columna interea acuta erecta.

us terminalis.

~~Pedunculata~~ Pedunculi ~~terminant~~ plerumque raris unicus sim
plex foliofus.

Flos solitarius Engeroni sacri foliis calycis foliola linearia pubescentia
radio parum brevior

Flosuli radii lineares. Pappi purpurascens

22. pennatifidum ^{lineari cuneiformibus} Enigeron foliis pennatifidis obtusis sessilibus; florum paniculis terminalibus

Habitat in Arabia ¹⁰¹⁷ Tossal

Rami villosi, nudimenta ramulorum ex omnibus axillis. ^{subinaesca crispascentia} Folia approximata
^{unquicuique} lineana extorsum dilatata, utrinque laciniis unica vel ~~gemino~~ ^{gemino} lineares-
obtusis. Flores in panicula terminali subcoarctata. ^{foliola} calycina subulata
+ ^{suprema} ~~suprema~~ ^{sub} ~~sub~~ villosa aequales. Flores nudi. Pappus purpurascens calyce parum longior

12
Helianthifolium
Lactifolium

sub quinque nervis

Engeron foliis ovatis ~~triplicinerviis~~ serratis glabris, caule herbaeae

Habitat in Brasilia ?

Caulis erectus simplex glaber striatus. Folia facie Helianthi, petiolata, ovata ^{remotiuscula} acuminata, glabra, lobis venosa acute serrata tripolliciana superiora ^{remotiuscula} ^{minor} ^{trinervia}, inferiora triplicinervia et a proterea duo alia ^{et} basi folii. Corymbus terminalis ^{diffusus} compositus Ramis patentibus foliolis petalaceum ad ramificationes. Calyxes hemisphaerici parvi foliolis lanceolatis. Strobili plerumque feminei petalacei nudi. Pappus purpurascens calyce longior

25 - glutinosum trigena foliis lanceolato linearibus integerrimis piloso-viscidis, pedunculis unifloris Ger.
prov. 205. L. Mart. 112.

Coryza montana myconi Dalech. Hist. 1200.

Coryza montana, foliis glutinosi pilosis Bauh. Pin. 265. Reich. 265.

Coryza montana saxatilis, hispani foliis villosis et glutinosi, hispanica Banel. ii. 158.

Habitat in Hispania, Gallia australi montosis maritimis &c.

Pedunculi alterni, uniflori, pauciores. Flores purpurei hem.

Quercifera
26 Engeron

lecta ad Balbastrum Hispania

Facies Inula Eng. siculi at magis ramosa, Cauli crassus rigidus; ramosus fere
pedalis pilosus viscosus, purpurascens. Folia sessilia lanceolato-acuminata
integerrima, glandulis viscosi adpressi, vix pilosa, rigida avenia, scabra
peltigera, ~~rudimenta ramulorum~~ ^{ramuli} folio breviori et ornatis
aliis ^{pediculis} ~~superioribus~~ longioribus specie floriferis, foliosi. Calycis uniflori Calycis
squama lineari lanceolata inaequalis, laxa fissa extensoribus subpyrami
di. Radius nullus. Corolla magnitudine viscosi. Perianthium purpurascens
an glutinosum Lin.; sed folia non pilosa

Engeron glutinosi varietas est.

27 graveolens *Erigeron* foliis linearibus lanceolatis, floribus ⁱⁿ ramis axillaribus ramorum, pedunculis subd-

Coryza ^{Phyllis} *famunia* Theophrasti minor altera Dod.

Coryza minor vera Lobel. Ic. 344

Coryza *famunia* Theophrasti minor Dioscoridis Bauh. Pin. 265

Singa aurea minor, foliis glabris et graveolentibus Tournef. F. R. II. 404

Erigeron graveolens foliis sublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris.

L. Am. acad. 4. p. 290. Mart. 468. x. V. pag. 754.

Habitat Mospelii, in Oriente ☉

Cauli erectus striatus, pubescens pallida purpurascens, a basi ad apicem ramifus. ^{alterne}

Rami simplices folio duplo longiori, ^{linea} per caulem decurrente. Folia ^{sespita}

linearibus lanceolatis, integerrima ^{dissertimilibus apice inflexis} sesquipollicaria, basi parum ^{et ex apice}

angustiora. Flores ~~in~~ axillares ⁱⁿ ramis solentur ramorum peduncula

ti solitarii. Pedunculi folio duplo breviores. Calycino squama lanceolata

+ versus apicem solista

duo calyce longiora subaequalis, eadem longitudine glaberrimum. Corolla lutea, radio minuto

longitudine calycis

20 scandens Eryem foliis ovatis serratis villosis, floribus axillaribus, caule scandente Thunb. fl. Jap.

1713. * N. pag. 754

Habitat in Japonia

Caulis filiformis, ramosus, purpurascens, glaber, scandens. Folia e singula gemma
tria vel quatuor, subsessilia, ovata, acuta, dentata, dentibus serratis, utrinque
villosa, linguiciliana. Flores inter folia axillares, solitarii Thunb. l. c.
Cubri huius refert Thunb.

30 japonicum Engeron foliis sessilibus obovatis serratis albois, floribus paniculatis Thunb fl. jap.
pag 312* L.V. p. 754

Habitat in Japonia O

Caulis simplex, filiformis, pilosus, erectus, pedalis. Folia alterna, attenuata in petiolo
semiamplexicaulia, obtusa, erecta, pollicaria. Flores terminales, paniculati.

Pappus pilosus, femigeneus Thunb. l. c.

non vidi

Japonicum *Erigeron foliis sessilibus lanceolatis denticulatis, pedunculis virgatis unifloris*

Thunb. Fl. jap. p. 318. t. 1. v. pag. 754

Sen-Saku, vulgo *Ogunuma* Kampp. Am. exot. Jap. s. p. 877.

Habitat in Japonia

Caulis herbaceus, teretifolius, villosus pedalis et ultra, erectus. Folia sessilia, elliptica, denticulata, denticulis minutis, remotis, villosa; subtus pallida reticulata; inferiora longiora, bis pollicaria; superiora minor. Pedunculi filiformes, et caulibus parte superioribus alterni, virgati, erecti, uniflori, tomentosi. Calyces ovati villosi, lineari subulati, patuli

31 Camphoratum Engeron foliis lanceolato-ovatis illois: serratis apice cartilagineis frond. Virg

122. S. V. p. 754.

Habitat in Virginia O

non vid.

33 obliquum *Eriogon ramosissimum*, foliis oblongis denticulatis obliquis ^{caule piloso} Lin. Mant. 573. *

Habitat in India Orientali O

Caulis erectus, palmatis et ultra, striatus pilosus ramosissimus. ^{angustularia} Folia sessilia pilosa
denticulato-serrata denticulis subcaespitibus. Pedunculi ex axillis supremis et apice ramo-
rum ramosi pedicellis unifloris filiformibus pilosissimis. Flores globosi. Squama
calycinis subulato-stacis aequali corollula longioris. Pappus crispus
Cultura ramosior evadit.