

Erigeron

47. jamaicense L. foliis radicalibus cuneiformi lanceolatis, caulinis linearibus serratis
nis utriusque subgeminis pedunculis subunifloris
48. philadelphicum L. foliis cuneiformi lanceolatis semianaplexis caulibus dentatis
scabris, floribus corymbosis
49. Foskalis L. foliis cuneiformibus petiolatis superne obtuse dentatis, paniculis
terminalibus
50. prostratum L. foliis petiolatis inferioribus spatulatis obtuse dentatis incisis, superioribus
linearibus serratis, corymbis terminalibus
51. sinuatum L. foliis ~~obovatis~~ ^{oblongis} ^{in superioribus} ^{oblongis} ^{sub horizontalibus} ^{et} ^{superum} ^{inequaliter} ^{denticulatis} ^{subsinuatis},
paniculis axillaribus terminalibusque
52. scabrum L. foliis lanceolato-linearibus strigosis scabris, pedunculis unifloris
53. tuberosum L. foliis linearibus lanceolatis margine obscure serratis scabris, caule ligno-
so piloso ramis unifloris
54. acris L. foliis lanceolatis integerrimis scabris, pedunculis unifloris alternis
55. alpinum L. foliis linearibus basi inferne attenuatis pilosis carinis, caule subfloro
56. germanicum L. foliis petalis, caule unifloro.
57. decurrens L. foliis linearibus tomentosis decurrentibus, floribus paniculatis

58. ^{Dusketum} pennatum & foliis pinnatis pennatis, pedunculis lateralibus terminalibusque elongatis ramosis.

59. pinnatifidum & foliis pinnatifidis dentatis, floribus terminalibus subsessilibus (pinnatis).

43 pauciflorum Eriogon foliis pinnatis lanceolatis basi dentato laciniatis; apice integro
dentatisque pedunculi subuni flori.

Habitat in Coomandel.

Caulis herbaceus pubes. Folia pollicaria extorsum parum dilatata inferiora basi
utrinque dentibus binis magnis lanceolatis acutis super medi et apice versus apicem
utrinque geminis unius. supremo basi tantum auriculo bidentato: ~~omni~~
omni apice obtuso mucronulo terminata. Pedunculi et alii supremi et apice solitarii
gemini uniflori vel biflori versus apicem foliolo linearis. Calyx subrotundus squamis
linearibus equalibus. Pappus crispus longitudine calycis.

Anuloides
~~Diffusa~~

Enj: ~~diffusa~~ *dichotomum* ^{vil} ~~palosum~~, foliis lanceolatis denticulatis basi
angustatis integerrimis, pedunculis terminalibus unifloris

Habitat in India orientali O Rottler

Caulis perthamensis *dichotomus* *diffusus* ramis divinis at
diffusi. Pappi ne profertur petis albis villosis. Solum semper
et una venis denticulata acuta basi angusta nec
integra. Pedunculi terminalis solitarii brevis villosissimi
Calycis villosi parvisperis. Pappus sordide albus

44 Inulaides Engeron foliis femiam plexis aulebris ^{pilofusculis} oblongis ~~dentatis~~ g labris basi subaequis, Pedunculis unisplis

Habitat in India orientali

Caulis herbaceus ramifus striatus vix pilosus. Folia angustulana remota ensualiter dentata
dentibus bases majoribus profundioribus. Pedunculi axillares ramorum vel ramulorum
lateralium solitarii feliiformes superne parum crassiores, foetido setaceo sesqui pollicari
Squamis calycinis setatis. Pappus gnepus
Habitus Inulae indiae.

Senecium Cr. foliis ovato-lanceolatis tomentoso seneciis integris serratis,
lobis appendiculatis, floribus paniculatis Retzius obj. bot. 5. p. 20
Habitat

non vidi

major B.

~~Tanacetum hortense foliis et odore menthae Tournef. F. R. 461.~~

Tanacetum balsamita foliis ovatis integris serratis Lin. S. V.

glandulifolium Ev. foliis ovato-lanceolatis integris cauleque pilosis, pedun-
culis ternis, calycibus hemisphaericis glanduloso-pilosis
Walt. fl. Car. pag 205
Habitat in Carolina

non vidi

34 purpurascens Eriogon foliis oblongis serratis denticulatis petiolatis, paniculis lateralibus terminalibus
que

Habitat in Insula Ducis in Thaurin

Caulis herbaceus teres, striatus pubescens, pro rostratum superne. Folia pollicaria, supra
nuda subtus pubescentia, serrata. Panicula foliis paucis longioribus ex apice et axillis
ferre omnibus. In pedunculis villosis foliolum oblongum ad primam ramificationem
foliis striatum et reliquis Calyx hemisphaericus squama linearis pubescente
purpurei. Pappus griseus

Contra axillaris foliis obovatis inaequaliter denticulatis petio-
latis, racemis axillaribus basi glabris: Terminali
paniculata La Marche En

3, purpurascens Engeron herbaceus foliis petiolatis ^{ellipticis} oblongis inaequaliter serratis ^{floribus paucis}
ciliatis axillaribus, calycibus coloratis

hab. in Inf. Tacaná

Caulis herbaceus ^{erectus} pilosus ^{elliptica} striatus sesquipedalis

Folia petiolata alterna, oblonga patentissima basi acuta serrata
serraturis inaequalibus acuta supra glabris subtus subvellosa pollicaria

Petiolus foliis ^{bracteis} Flores ex omnibus fere axillis panicula foliis longior

Pedunculo ^{vellosa} interdum in inferioribus foliis oblongo denticulato fere

file instructo. bracteis setaceis sub floribus

Tubula calycina lineari angusta purpurascens

Corollulae radii capillares

Pappus albus longitudine Calycis

36 *Cateniflorum* *Eriogon* foliis oblongis basi angustatis, ^{cuneiformia} dentato sinuatis fl. axillaribus terminalibusque

Caulis herbaceus, teres, erectus, villosus superne tomentosus.

Folia alterna, oblonga cuneiformia, apice rotunda basi attenuata superne dentata, medio et versus basin subsinuata, margine dentata dentibus glandulosis nigris supra villosa vincta subtus

supra arenis
supremo dentati

mollia subserrica pollicaria

Flori ex omnibus axillis et terminalibus Pedunculis foliis duplo brevioribus flori 3-4 alterni sessiles

globose calycina angusta linearia

Corollula radii capillares numerosi

Pappus albus calycis brevior

habitat in Java

Conyza lacera Burman fl. ind. pag. 100. Tab. 59. fig. 1. Ga.
Mart. Encycl.

an folia hispida

44
Inuati in Erigeron ^{subrhomboides} foliis obovatis oblongis ^{exterioribus} inaequaliter denticulatis subpinnatis, paniculis axil-
laribus terminalibusque.

Habitat in India Orientali.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, striatus, pubescens. Folia sessilia oblonga in basi
angustata, inferiora latiora superiora oblonga subpinnatifida prope basin serrata
a medio ad apicem inaequaliter denticulatis interjecto sinu parvo inaequalitudo
vna. Peduncululi ex aetate superioribus et apice, solitarii 3. vel 4 flori callosi
Calyx squamoso petaloides. Pappus calyce paruo brevior griseus.

purpureum L. caule multifloro piloso, foliis oblongis subdentatis amplexantibus, corollis
radii capillariis disco longioribus Hort. Kew. 3. p. 186 ♀
Habitat ad fretum Hudsoni &

Caulis ramosus. Folia acuta nunc integra, nunc dentibus paucis incisa. Flores
paniculati. Calycis foliola lanceolata, aequalia, glabra, subaristata: ca-
rina pilis raris adpressa. Corollula radii numerosissima purpurea; disci: florum
Hort. Kew. l. c.

Sumatrense Eng. Tomentosum, floribus racemoso-paniculatis, foliis lanceo-
latis pubescentibus Retz off. s. pag 20
Habitat in Sumatra

non vidi

~~agratifolia B.~~

~~Balsamita pinnosa Alpen. Ex. 227.~~

~~Belli major pinnosa, Petalis carenti seu nuda Morif. h. B. pag. 29
f. b. v. g. fig. 16.~~

~~Chrysanthemum flosculosum, flosculis omnibus unicoloribus herma
phroditi L. S. V.~~

40 Carolinianum. Eriogon caule paniculato piloso, floribus subsolitariis terminalibus, foliis lineari-
bus integerrimis L. S. V. p. 754.

Silya aurea carolinensis, Linnaeus inonsperulana foliis Dell. Elth. fig 412. t. 306
f. 304.

Habitat in Virginia

Ranai
spica piloso tomentosis
Caulis erectus fructus adpressus plus longis patentibus. Folia sesquipolluciana glabra
canina pilosa disto et margine vix pilosa. Pedunculi ex axillis supremis unis
foliis breviores filiformes versus apicem foliolum setaceum. Calyx subsolitariis
Squamis subulatis. Pappi crispus calyx vix longior

cinereum

^{integerrimo}
Eng. foliis inferioribus lanceolatis superioribus ^{lineari-} lanceolatis can-
le qua exuto scabri, corymbis terminali ^{br.} simplici subsistotomus
Habitat Tranquebaris Rottles ^{elongati}
Caulis erectus sesquipedalis striato subangulatus rami alter-
ni uti caulis a spinulis minutis scabri. Folia basi in petio-
lum attenuata apice obtusiuscula supra et subtus in venis
substrigosa-scabra Rami corymbi ^{trival.} dichotomi pedicelli ult-
mi uniflori Squama calycis apice purpurascens
Flores purpurei

parvi florum E ~~pubescens~~ foliis lanceolatis linearibus integerrimis
obtusis corymbis terminalibus compositis fastigiatis
Habitat in India Orientali. Rottler qui ^{sub aurocentris} proceram Bauhansidiam
caulis erectus sesquipedalis. Ram. frequentes alterni erecti
nervi striati, supremi fastigiati. Folia ~~caulis~~ basi angusta
in sessile cordata seminaequa. Cate: ramorum ^{ca} angustiorum
pedunculi capillares. Flores parvi, pappe femineae

rigidum

E. foliis lanceolato-cuneiformibus ^{pubescentibus} ramorum et axilla
rum tendentibus

Habitat in Maric's Schoubro

Caulis strictus herbaceus superne ramis simplicibus
bus pubescens scabra pilis. Folia petiolata
fasciculi foliorum minorum ex axillis foliorum
in caulis remotum foliatis corymbis ad apicem
simplicibus.

41 canadense Erigeron caule ^{floibusque paniculatis} floribus paniculatis hirs, scabra foliis lanceolatis ciliatis subden-
tatis, ^{altis} floribus paniculatis

Conyza annua aëris elatior, Linario foliis Monf. h. 3. p. 115. f. 7. t. 20. f. 29. 29.

Bozzon fig. 85. t. 46.

Erigeron canadense caule floribus paniculatis hirs, foliis lanceolatis cilia-
tis L. S. V. p. 754.

Habitat in Virginia, Canada, nunc copiose in Europa Australi O.

Caulis erectus, paniculatus, crassitie pennis cygneo stratus, ^{hirs puberula} peltis hirs, peltis sparsis
tuberulis infidentibus, ^{hirs} folia lanceolata petiolata, peltosa propositum canna et
margine scabra, fereque peltis anibus, medio dentibus ^{tubis} 2-3. remotis.
Folia ramorum integerrima ciliata. Pedunculi secundum longitudinem
ramorum, ramosi filiformes pedicelli basi et medio foliolo setaceis. Folia
calycinae foliis linearibus subulata ~~passa~~.

42 *Oxytheca* Engeron foliis semiamplexicaulibus spatulatis - lanceolatis, grosse ^{pub}dentatis, caule
ramoso ~~hirsuto~~ ^{pubescente} piloso ~~pubescente~~ floribus paniculatis
Conyza capitata fide globoza Boic. Fe. 13. t. 7. f. B. Mon. h. 3. p. 114 f. 7. tab 20
f. 14.

Gaioboa oxytheca, foliis glaucis coronopii

Engeron oxythecum foliis semiamplexicaulibus spatulatis dentatis, floribus
globosis Lin. mant. 112 * p. 517. * S. V. p. 754. Gaerth. hort. V. 3. t. 19.

Engeron serratum caule ramoso erecto diffusis, cæpitati. foliis cuneiformi
lanceolatis, serrato-dentatis, sessilibus, villosis. Forsk. descr. p. 140

Habitat in Aegypto, Scythia &c.

Caulis ^{erectus} cæpitatis, pilis longis hirsutus. Folia spatulata angustiora vel latiora,
dentibus utraque 2-3 remotis grossi in medio folii, summa in
terremima lanceolata. Flores 4-6. in panicula pedunculata plurimiflora
squamo calycinis ~~setosis~~ ^{apertis} subulatis villosis. Olos globosis. corollula lactea
femineæ copiosi absque ligula. Pappus griseus longitudo calycis

renulare E. Folis cuneatis acutis hirsutis apice utraque dentatis, margine ciliatis, cau-
lino sessilibus; caule simpliciterculo erecto paucifloro Sw. prodr. p. 113.

Habitat in Jamaica, Hispaniola &

Caulis erectus ramis paucis alternis pilosis pedunculi
ex axillis superioribus alternis unifloris.

75. jamaicense Enjeron Caule paucifloro ^{sub} villosa, ^{apertis} foliis cuneiformi lanceolatis: serratis utrinque
sublimis geminis
Senecio minor, bellidis majoris foliis Sloan jam. 125. h. 1. p. 260. t. 152. fig. 3.

Senecio Tomentosus, foliis oblongo-ovatis levissime denticulatis, petiolis brevibus
Brown jam. 320.

Enjeron jamaicense caule paucifloro subvillosa, foliis cuneiformi lanceolatis
serratis utrinque duabus Kun. Am. Ai. 5. p. 406* s. 18. p. 754.

Habitat in Jamaica 4

et infera
radice alio ^{longo} ^{petiolo} ^{amplexicaute}
petiolata
Caulis a digiti altitudine ad sesipedalem, subvillosis basi ramos uno vel
alternis ^{apertis} simplicibus ^{femina}. ^{naica} ^{amplexicaute} ^{remotiuscula}
altitudo caulina ^{an} ^{subvillosa}, caulina ^{naica} ^{si} ^{ut} ^{oria}, ^{omn.} ^{denticibus} ^{utrinque}
^{1-3.} ^{suprema} ^{integrima}. ^{pedunculi} ^{et} ^{apices} ^{ramorum} ^{et} ^{caulis}
^{1-2.} ^{uniflori} ^{filiformes}. ^{ligamo} ^{calycis} ^{setaceo} ^{disco} ^{longiore}
Radix capillans conflata disci flavis

46 Philadelphia Engeron foliis cuneiformi lanceolatis semiamplexicaulis dentatis scabris, flori-
bus panicis subcorymbosis
Engeron Philadelphia caule multifloro, foliis lanceolatis subserratis: caulinis
semiamplexicaulis, flosculis radii capillares longitudine disti. L. S. V. Gray
754.

Habitat in Canada, Inf. fl. Luis Americae

Caulis erectus simplex, hirsutus, striatus verticillatus. Folia caulina amplexicaulis
lanceolata, basi sensim angustiora dentibus utrinque 1-2. pilosa prope ~~termina~~ ~~na~~ ~~vea~~
Et margine sensimque pilosa, acutiuscula. Flores terminales ~~scabris~~ pedunculatis
filiformibus. Squama calycinis setacea longitudine flosculorum. Pappus griseus.

47 *Coriaria* Engeron foliis cuneiformibus petiolatis superne obtuse serratis, ^{dentatis paniculis} ~~compositis~~ ^{terminalibus} ~~hemisphaericis~~
Habitat in Arabia. Forstnial.

Caulis basi lignosus, teres striatus pubescens ramosus. Rami erecti. Folia oblonga, basi
in peltidum attenuata pubescentia extorsum dentibus aliquot obtusis mucrona
terminatis. ~~Corymbus terminalis parvis~~ ^{simplicibus pedicellatis} Panicula parva terminalis. Flores
minuti. Calyx hemisphaericus ~~caer~~ ^{sq} ~~sepalis~~ ^{sepalis} ~~calycinis~~ ^{calycinis} ~~setaceis~~ ^{setaceis}. Pappus subperispermicus.
calyce parum longior

Spithulatum Engeron ^{petiolatis} foliis inferioribus ^{spathulatis} lanceiformibus obtuse dentato-incisive superioribus lanceolatis
 ferratis, cymbeis terminalibus.

Habitat in Arabia Torst.

Caulis herbacæus simplex pilosus. Folium in petiolum planum ~~oblongum~~ attenuatum
 inferius obovatum dentibus aliquot obtusis mucronatis ~~ve~~ ^{ve} superne incisive
 superioribus ~~rem angustioribus~~ utrinque angustioribus ^{acuta} dentato ferratis basi
 utrinque laciniis linearibus: omnia pilosa, prosterius subtus in venis. Peduncul.
 aliquot subsessile. Calyx subrotundus, squama subulato. ^{radice} Flores nudi
 Pappus griseus longitudine calycis
 Flores duplo majore quam in E. Torst.

palmatum Eng. foliis palmato quinquepartiti laciniis obtusis
intermediis dentatis.

Sichabo Habitat in Maricao S. Ousbo.

Caules herbacei basi ramosi. Rami erecti ^{pedales}
simplicissimi pubescentes striati. ^{et in pediculis} folia ^{pediculis}
alterna, per petiolum decurrentia sive partita
laciniis ² brevibus: laciniis obtusis laterales
breviores patentissimi integerrimi, reliqui ^{et} erecti
interdente ² duobus ^{et} dente uno altero ^{et} interne
duo longiore ^{et} ^{et} infida Corymbi terminales.

19-20. decurrens Erigeron foliis decurrentibus linearibus tomentosis, floribus paniculatis.

Habitat in Arabia Torthal

Caulis erectus, striatus, pubescens, superne tomentosus; rami lignosi

Folia basi decurrentia, linearia, integerrima, tomentosa, ~~brevia~~ semunquiculata

Floras paniculati; pedicelli capillares, foliolis binis minutis versus apicem

Palis villosi; lobula fetida, pappo breviora.

Corolla radii radi.