

Erigeron

rudicula) J. J. Richard

Contra candida inter Erigeron invariebat in herb. Hus.

tuberis inula succo

Descriptum
pennatum

Engeron foliis pennatis linearibus; pedunculis lateralibus terminalibusque elongatis ramo

44

Habitat in Cap. b. p. p.

Caulis herbaceus teretes pubescens ramosus. Folia pennata, pennis 5-7. linearibus
subvillosi. Pedunculi in aliquot ramulis divisi foliolum lineare ad ramificationes
Calycis pedicelli uniflori medio foliolo sitae. Calycis squamae lineares subaequales
Pappus calycis longior purpureus flosculi nudi

~~Engem~~
-c pinnatum Engem foliis pinnatifidis dentatis L. Suppl. p. 360 * S. V. p. 755.

Habitat in C. b. spici

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, subhirsutus, simplex. Folia alterna, longitudine digiti pinnatifida, subdentata, lobis 3-4. Flores terminales subglomerati, lutei magnitudine C. acni. Pappus albus L. Suppl. l. c.

cymosum Engem folio dentato-lacinato, calycibus lobatis. Wal
fl. Car. pag 206.
-Habitata Carol.

non vidi

32
bonariense Erigeron foliis inferioribus dentato laciniatis, caulibus integri basi revolutis. C. Hort. Cliff.

407.

Senecio bonariensis purpureo-flores, foliis imis coronati Dill. Eth. p. 344. t. 257. f. 334.

Erigeron bonariense foliis basi revolutis L. L. V. p. 754.

Habitat in America Australi. D.

Caulis erectus, pilosus, simplex. Folia lanceolata sessilia ciliata. Peduncululi versus summitatem, breves, erecti, uniflori. Flores oblongi

veteris describenda

non vidi

Corygatum Engeron caule debili anguloso - piloso ramis pani-
culatis, pedunculis unifloris foliis subpeltatis - lineari-
bus integris, Corygati subpilosis ciliatis Ai fci. h. n.
Panf. 1. p. 112
Habitat in Amer. merid.

non n.

remotum Eng. foliis lanceolatis sessilibus inferioribus et trifloris
seratis superioribus integerrimis corymbis compositis
Habitat in Maribus Schouboe.

Caulis erectus bipedalis striatus inferne glaber super
ne pilis parvis ^{glandulosis} sparsis simpliciter superioribus
in ramis floriferis alternatim diffusis. folia
lanceolata 2-3 pollicina acuta, glabra excepto
to manente, ramuli foliosi axillares

30 Gouani Engeron floribus congestis, foliis serratis dentato-serratis margine scabri: radicalibus caulinis
lanceolatis amplexicaulibus.

Engeron Gouani floribus congestis, calycibus scariosis, foliis lanceolatis subserratis margine
scabris L.S. V. p. 756. Mart. p. 469 * *Fl. Belgic. hort. V. 3. t. 79.*

Habitat.

Caulis erectus perthamnosus vel pedalis erectus, simplicissimus, vix pilosus. Folia radicalia
pet et infima petiolo, basi attenuata. Caulis usque pollicaria a medio ad apicem
dentata, basi parum angustiora omnia glabra. Flores subpaniculati congesti
globosi. Calyx foliolis subaequalibus lato lanceolatis margine scariosis. Corollula
feminea stam. et apertale copiosius quam hermaphrodita. Nympha oblonga.

34 *triplex* Engson foliis oblongis triplinerviis scabris, pedunculatis unifloris
habitat in Brasilia monte video.

Caulis erectus herbaceus teres, striatus, simplex villosus subcanescens
pedalis.

marginem subvelosa

amplexicaulia 5-6 triplinervia ^{dentata} scabra ^{elliptica} versus
folia oblonga utrinque acuta inferiora oblonga utrinque an-

superiora lanceolata obtusa. Nervis apicem vix attingentia
pedunculi ^{ad} summitatem, bifidi, villosi pollicares, foliolo
ad basin et in medio pedicelli subulato.

florae solitarii magnitudine aenis

calyces lineares villosi.

corollulae variae ligulati lineares calyce longiores

pappus purpurascens longitudine calycis eisdem fructibus
ut in scabro

28 *ficulum* Engeron squamis calycinis inferioribus latis florem superantibus; pedunculis unifloris foliosis
L. Sp. pl. p. 1240 x s. v.

Coryza ficoides foliis viridis auro Bauh. h. 2. p. 1049.

Coryza ficula annua, foliis atro viridibus, caule rubente Boerh. ju. 62. t. 31. fig. 4. Monj.
h. 3. p. 115. f. 7. t. 20. fig. 20. Pluk. phyt. 168. fig. 2.

Coryza caulibus rubentibus tenuioribus, flore lutescens Magn: Monj. 77. t. 76.

Habitat in Sicilia, Montpellier paludosis O.

Caules erectus rigidus glaberrimus. Folia simplicia lineari lanceolata, subpeltata, scabra
integerrima obtusa apicula, pollicaria, Pedunculi axillares, ramiformes
simpliciter asini, foliis lineariibus ^{receptivis} adpressis, unifloris. Squama calycina squa-
larum longitudine flosculorum lato, pedaceo. Radix nullus pappus purpurascens

fructum Engeron calycinis squamis inferioribus laxis florem superantibus foliis lanceolato lineari-
integerrimis, floribus flosculosis.

70 Scabrum *Erigeron herbaceus* foliis lanceolato-linearibus ^{strigosis} scabris pedunculis uni-
floris
hab. in Brasilia monte video

Caulis herbaceus erectus, ^{simplex} teres, strigosus, inferne scaber, pedalis

Folia inferiora approximata lanceolato-linearibus basi attenuata
strigosa scabra, pollicaria; Caulina pauca, ⁴⁻⁵ remota subulata
superficies inferiorum.

Pedunculi sedes apicem ^{des} alterni, infera ⁱⁿ pollicares
squamis nonnullis lanceolatis, inferiores laterales caulis alte-
rnis uniflori

Flores *Erigerontis* acutae

Calycina foliola linearia strigosa

filiculi radii capillares

Pappus oblonga pilosa ^{vel} pilosa

Pappus fernigenus calis longitudine calycis
affinis bonariensis

Pappus misopis ^{hispidus} visus alternatim ^{pilis} dentatus, dentibus minutis hinc facies singularis ^{rigida}

51 tuberosum Engeron foliis lanceolatis ^{lanicollatis} margine obscure serrulatis scabri, cauli ^{agnato} suffruticoso piloso, ramis unifloris

Engeron caule subunifloro, foliis lanceolato-linearibus rigidis, radice tuberosa Sauv. Monsp.

Engeron ⁵⁵ foliis rigidis, caule subignoso paucifloro Ges. prov. 205

Engeron tuberosum foliis lanceolatis, ramis unifloris caule suffruticoso L. Spui. pl. 1212.
Gron. Onest. 266. L.V. pag. 754.

Chondrilla altern. Diophrontidis purtata Clus. h. 2. p. 145.

Chondrilla bulbosa synaca, foliis angustioribus Baud. pen. 130.

Conyza marina Monf. h. 3. p. 114. f. 7. b. 19 f. 20. bona.

13. Chondrilla synaca, foliis latioribus Baud. Pen. 130

Conyza tuberosa lutea foliis angustis rigidis Monf. h. 3. p. 114. f. 7. b. 20. f. 15. Magn.
Monsp. 77.

V. Aster Conyzoides Gesneri Monf. h. 3. p. 110. f. 7. d. 22 f. 7.

Habitat in G. provincia, G. Narbona f. Hispania, Syria &

Caulis lignosus, pedalis tunc pilosus, ramis paucis simplicibus, folia linearia lanceolata utrinque acuta saepe pollicaria sessilia, raris pilosa, margine serratis remotis minutissimis scabra. Flores ramos terminant inaequalitate & alpini facie caulis alitane pedunculati caulem terminant subramosi uniflori. Calyx glaber foliolis lanceolatis. Pappus parvus pappi calyce longior. Corollula lutea

Planta culta laevior

92 *aere* *Engeron* pedunculis unifloris alternis, foliis lanceolatis integerrimis scabris
Tinctorius flor. alter Tray.

Engeron Vedum Dod.

+ *Congra condlea aenis* Bauh. Pin. 269

+ *amellus montanus equicolum* Col. Ephr. 2. p. 25. f. 26.

Engeron aere pedunculis alternis unifloris L. l. v. pag. 254.

Habitat in Europa sicca aprica &.

Caulis eructus purpurascens, simplex, pelosus. Folia sessilia, lineari lanceolata, paucis, pelosa
profertim ad marginem. Pedunculi axillares saepe in caule foliis duplo longiori ad apicem
paucum crassius foliolo lineari; Calyx pelosus squamis subulatis. Pappi calycis longior pallide
purpurascens. flos purpurascens Radix capillaris

En. *Drobachense* Mull. vix nisi huius varietas

Villarsii Eng. foliis radicalibus oblongis subdentatis caulibus lanceo-
latis ^{pub.} ~~sq.~~ nervis integerrimis, pedunculis unifloris

Cinnyron atrium caule erecto, foliis oblongo lanceolatis
trinerviis, floribus corymbosis Vill. Delph 3. p. 237

Erigeron Villarsii Bellard. Append. ad fl. Pedem. pug 30 tab

^{vii.}
Habitat Carthusia Vallis P. su B

Caulis pedalis, striatus fistulosus leviter viscosus. supremum
fulcato angulatus. Folium radicalia petiolata oblonga
per petiolum decurrentia. ^{obiter dentata} caulina lanceolata inferne
attenuata, nervi 3. sive integerrima. Pedunculi axilla-
res foliosi terminales brevissimi 1. 2 triflori. Floi Eng.
alpini

573 alpinum *Erigeron* caule ^{ubi} subunifloro foliis ^{pelosis} ~~gemma~~ ^{levis} ~~br~~ pilosa
alpin. & *Conyza concha alpina major* Bauh. Prodr. 124. Pin. 269.
Aster montano purpureo similis sive *globularis* Bauh. h. 2. p. 107

Erigeron caule subbifloro, calyce subhirsuto L. S. V. pag. 754
uniflorum. *Conyza concha alpina minor* Bauh. prodr. 124. Pin. 269.
Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce albo subrotundo L. H. Lapp. 307.
t. 9. fig. 3.

Erigeron uniflorum caule unifloro, calyce peloso Cl. Suec. 742. * L. S. V. p. 754
Habitat in alpebus Helvetiae et Lapponiae. 4 abique asperitate
Caulis erectus simplex pelosus. Folia radicealia petiolata oblonga basi in petiolum
attenuata, caulina sessilia paucis semiamplexici caulis
variat caule digitali unifloro, floribus unifloro in magis pelosa in summi-
tate alpinum in humilibus magis glabrior, caule bis: trifloro.

54 Gramineum *Erigeron foliis setaceis ciliatis, caule unifloro*

² *Aster caule unifloro, longitudine foliorum linearium Gmel. Sib. 2. p. 174. t. 76. fig. 2.*

¹ *Aster acaulis albus, foliis gramineis Ann. neth. 214.*

Erigeron gramineum caule unifloro, foliis linearibus ciliatis. L. S. V. p. 854.

Habitat in Sibiria &

*Radix ratione plantae valida lignosa. Folio capitato, setacea ciliata pollicaria et ultra
erecta, anida persistens. Caulis, potius scapus, vix dignus foliis altior simplicis formis, hirsutus
subtomentosus, uniflorus. Florae magnitudine *Er. alpini*. Calyx vix villosus foliolis linearibus
laevissimis latius marginibus membranaceis.*

pelopium Er. calycibus pelopis squamis laxis Walt. fl. Car. pag. 206
Habitat in Carolina.

non vidi

Squarropum Er. calycibus tomentosis squamis patentibus. Wacx.
fl. Car. pag 206.
Habitat in Carolina.

non vid.

egyptiacum Erigeron ^{Erigeron} foliis semiamplexicaulis spatulatis dentatis
floribus globosis L. S. V. 754.

Erigeron Vomentopum; caule ramoso, erecto - diffusis, subitali;
foliis cuneiformi-lanceolatis, serrato-dentatis, sessilibus villosis
Hort. Depic. pag. 140. no. 76

Erigeron

Caulis fruticoso

1. tenaxopunctoides
2. tenax
3. foliosum
4. molle
5. glandulosum
6. dentex
7. nereifolium
8. splendens
9. subrotundum
10. heterophyllum
11. pinifolium
- ? 12. foliosum
- ? 13. virgatum

Caulis herbaceo

14. visiosum
15. graveolens
16. ficulium
17. carolinianum
18. canadense
19. jamaicense
20. philadelphicum sycphoricum
21. obliquum
22. lateriflorum
23. purpurascens
24. gouani
- + 25. triplinerve 24-25. comphoratum
26. elongatum
27. philadelphicum
28. bonariense
29. alpe
30. alpinum
31. uniflorum

32. tuberosum[?]
33. gramineum

31. 32. scabrum
1-2 truncatum Lin. suppl.
20-21. pinnatum L.
13-14. glutinosum L. Mant.
11-12. anthmoides

Engelmannia (fennecum) Rich.
gemmatensis
collasii All