

Eriocarpus

Cnicus arvensis

Habitat in Madagascaria Commerçon herb. Fusf.

Rami alterni teretes, cortice cinereo, punctis fuscis, glabri. Folia petiolata, alterna, bi pollicaria vel parum ultra, oblanceolata, obtusissima, emarginata, integerrima, supra avenia glabra, nitida, subtus venis sine tomentosa et venosa. Petioli inaequali, sessili angustulati. Pedunculi ex axillis supremis, breves, velles, bifidi, rami biflori.

Calyx 1 phyllis, utriusque hirsutus, quinque dentatus, bifidus bracteatus. Petala 5. basi angustata, subcarinata, pennata? Squamulae 3. 5. ^{inaequales} ~~inaequales~~, minime, petalis ex tenori est eodem puncto. Stamina numerosa, monadelphia basi. Germen in ^{enem} flexum. Stylus 1. Stigma capitatum. Fructus hiloculari? polypermus? Fusf.

lineata *Enosperma* *Lus*

metropideris *la* *mark* *Muffr.* *tab.* *fig.*

Habitat in Madagascari Commes. herb. Paris font.

Rami teretes, glabri, punctati. Folia petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, oblanceolata, basi subcordata, acuta, integerrima, coriaceae, utrinque glabra, lines 3, obscure longitudinaliter subtus glauca venisque venosa. Petioli unguiculati, villosi. Panicula terminalis: pedunculi alterni, angulati, ferruginei, uti calycis, dicto tunc discis. Calycis lacini ovata

Eriocarpus.

Metrophides La. Mart. *Illustr. v. Tab. 421. fig. 1.*

Habitat: herb. Guss.

Folia petiolata, ovato-oblonga, coriacea, arena, obsolete trinervis, 4-5 pol
licina. Flores in panicula dichotoma.

Cineatus Enocarpus

Habitat in Madagascaris herb. frus.

Rami superne cinereo villosi, uti folia, annulata. Sola petiolata, quadrupolliciana, ovato-lanceolata, integerrima, supra subarenia, obsolete trinervia, glabra, subtus rufa tomentosa. Pedunculi terminales, subtriflori: pedicelli remoti. Calyx rufo tomentosus: dentibus ovatis. Germen longitudinaliter nyopum.