

Enicaulon

Enicaulon. Cal. communis polyphyllus. Pet. 3. Sem. 1. corolla
nectario coronatum.

Obi. Totum genus ad monocliam amandandum
^{scopi}
Nepes. Culmus ~~incolis~~ ~~folia~~ ~~truncata~~ ~~strata~~

villosum

Eriocaulon

~~Eriocaulon anceps; culms compresso, calicis duobus, foliis et culmo
pileis. Walt. fl. car. 83~~

~~Eriocaulon compressum; culms compresso tenuiter striato,
calycis argenteo~~

Perkenon vel Passiflora egyptiaca specim. a - Steyerhagen

villosum. ~~Eriocaulon.~~

~~Eriocaulon villosum; foliis breviusculis, subulato linearibus, petosis.
Stipulis subquadripulvatis villosis: capitula sphaeroides; flosculis sub
fuliginosis~~

~~Eriocaulon villosum, foliis breviusculis, subulato linearibus, petosis; stipulis subquadripulvatis villosis; capitula sphaeroides; flosculis subfuliginosis.~~
Habitat in America boreali, Richard

Praducum Enoi culmo Tenusimo Longissimo substrato, foliis setosis
capitulo ovato praducis lavi La Mart. J. Eno. pag 214.
Habitat ad fennam Leonam

minime Enoaulon potius setoeri species vel proprii generi
~~na ad~~

* Culm nudo Decem

Decangulare 1. Enicaulon culmo striato, decangulari orbis indivisis, foliis ensi-
formibus erectis, capitulis hemisphaericis tomentosis
Randallia americana proenior Pat. gaz. T. 6. f. 2.

Enicaulon novaeboracense, capitulo albo globoso s. globulana ameri-
cana striatis haud absimilis, cauliculis lana dno-nitente refer-
tis. Plukn. Amalth. opp. t. 409. f. 5.

Globulana affinis aequatica, paulo tenui aphylla graminea, capitulis
albicantibus parvis globosis, foliis paucis humistratis gramineis
Gmel. Gronov. viny. 13. ?

Enicaulon decangulare; culmo decangulari, foliis ensiformi-
bus Lin. Syt. veg. 132.

Enicaulon perotianum; culmo decangulari, foliis longis levibus erectis
Walt. Car. 83.

Enicaulon decangulare; maximum, glabrum. foliis gramineis
ensiformibus: & caelo decemstriato: capitulo pennisiformi, floribus
vete

numerosis primis: squamis involucri vix distinctis ovalibus, subacutis; paleis receptaculi mucronatis Michaux fl. bor. amer. 2. p. 165.

Habitat in America septentrionalis paludibus. Boer, Richard.

Radix pollicaris et ultra, et siccata transversim lineis transversis plurimis articulata. Folia radicalia, quadri-quinque pollicaria, convoluta, ac-

Capitula ter, basi lanata, coetanea glabra. Culmi erecti, pedales vel bipedales, ^{piso duplo} potius decem striati quam decem a striis decem subangulati, torti, glabri, ^{vel triplo} ^{mayora.} Calyx sub capitulo parum crassior. Ochrea longitudine foliorum, apice obliquo communiq; hinc membranae, oblique hinc obtusae, integratae. Petala a base petalobata ovata, la apice fusca. Flores masculi in distico. ^{glabra, nitida.}

Flores foeminei quadruplici serie ad ambitum receptaculi. Calyx exterior profunde bipartitus; laciniis compresso, macula nigricante notato: interior ventriosus, tubulosus; laciniis apice bilobis. Pistillum longitudine calycis German stipitatum, cordatum. Stylus unicus. Stigmata duo, longitudine styli. Capsula cordata, stipitata, subcompressa, biculicula, biloculans, lateribus dehiscentis. Flores masculini. Calyx ut in foemineis. Stamina subdidynama. Pistillum nullum. Richard

quadrangulare 2. Eriocaulon culmo quadrangulo, foliis ensiformibus, capitulo
globoso, basi truncato Car. fl. cochinch. 60. t.

Habitat in Agri & hortis Cochinchinae 0

Ad aliud genus pertinere videtur.

pubescens 3. ^{Culmo} Eriocaulon scapo striato villosa, foliis ensiformibus canescentibus basi
lanatis, capitulo hemisphaerico tomentoso
Eriocaulon pubescens; scapo subvillosa, foliis ensiformibus pubescentibus
maximis, capitulo plano tomentoso Lamour. Illustr. 1. p. 213.

Dict. bot. 3. Habitat in Madagascar. Ex herbario Gussonei Comerson. Ex her-
bario Gussonei
p. 276

Folia spithamea et ultra, vaguam semipollicem lanata lato, lan-
atissima villosa. ^{Culmo} scapo foliis parum longior, striat teres. Ochrea
brevis. Calyx communis imbricatus: foliola ovata, acuta villosa.
Flores apice pilis ^{albidis} copiosis siccis tomentosi.

fasciculata E. foliis linearibus ^{bus attenuatis} canaliculatis cauleque folioso pilosis; pedunculis terminalibus umbellatis

Enocaulon fasciculatum caule simpliciter sumo; foliis confertis ciliatis; pedunculis fasciculatis terminalibus Roth. Diss. pl. Her. pag. 3. tab. 2. fig. 1.

Habitat Curoniam

Radix fibrosa. Caulis simpliciter sumo ^{futis} erectus perispermifera pilis longis distantibus puberulus. Folia fasciata frequentis sumo unguiculari superiora longiora lineari attenuata striata acuta patentissima utrinque pilis longis distantibus adpersa. Pedunculis terminalibus Scapi caulini terminalibus saepe usque ad 1000. capillares tripollicares erecti patentis, pilis raris longe pilosis striatis. vagina prothecae unguiculari attenuato pilosa apice mutulo. capitula magnitudine feminis Conandri oblonga torulosa

foliis basi pilosa. othred pedunculis multo dieb. brevioribus apice altero latere hians, extus tuberculata tuberculis apice piliferis capitula oblonga pedunculis angulatis anrescens

Striatum 4 *Eriocaulon* ^{culmo} ~~capa~~ hexangulari glabro, foliis que ensiformibus parastichis
mis glabris, ochreis foliis longioribus trifidis foliis longioribus, capitulo hemispha-
rico
Eriocaulon striatum; culmo nudo striato, foliis ensiformibus erectis
glabris, capitulo convexo. Lamark. Dict. bot. 3. p. 275.

Habitat in insula Bourbonis Commerson. Ex herbario Fussii et
Lamarckii

Folia radicalia, ^{basi} cespitosa, lana sordida densa intertexta, pollicaria, saepe
parum recurvata, laevi, subtilissime striata, nitida. Culmi saepe
plures, quadranguli, sex pollicares, toti, glabri. Ochreae saepe pollicia-
res, striatae. Capitulum novo videt major, hemisphaericum. Calycis
communis foliola ovalia, longitudine fereculorum, glabra, nitida, rigidula
secula. Calyx triphyllus: foliola linearilanceolata, nigrescentia, api-
ce villosa - canescentia. Petala tria linearia, flavescentia, basi attenua-
ta, longitudine calycis, villosa, praesertim margine et apice, unicum parum
longius, punctum fuscum latere interiori versus apicem. Stamina non
vide. Pistillum: germen superum, ovatum: stylus inaequalis, corolla ten-

quatuor

quis, capillans, trifidus: Stigmata simplicia, acuta. Paleae receptaculi Lunaeiformes
 concavae, longitudine florum, superne fusca, extus illis griseis virens santes.
 Synon: a Plukenetio a Lamarchio allatum minima huc pertinet. ^{Tringite} Nomen Lamarchii
 retineo cum de Linneo incedit sum, ~~si autem de~~ ex omnibus speciebus duplex
 generis Linnei ^{Er.} hexangulare hinc ^{supra} ~~maxime~~ ^{maxime} accidit solummodo accidit

umbellatum Enri caula nuda umbellata, involucrio polyphylo, radiis
 mesophyllis longissimis. Fr. Mark. D. Enc: pag 214. Tab 52. fig 4
 Habitat in quercu

repens 5 Eriocaulon culmis triangulatis, ^{lateralibus terminalibusque} paniculis foliosis repentibus, foliis ensiformibus falcatis, capitulo globoso.

Eriocaulon repens; ^{virgamae gutromosis} paniculis foliosis repentibus, & capis nudis, foliis confertis ensiformibus recurvis Lamarch. Dict. bot. 3. p. 275. illustr. 1. p. 213. t. 50. f. 2.

Habitat in insula Bourbonis. Com. merson. Ex herbario Thonisi et Lamarchi;
utroque fructificatione facies Hyperi. Radices capellares, longi. Paniculae cespitosae, pollicares vel bipollicares, adscendentes, inferne basi vaginis foliorum relictis tecti, superne foliosae. Folia copiosa, confertissima, sordide unguiculata, interdum parum longiora, patentia, recurvata, acuta, glabra, striata. ^{Culmi} scopi ex latere et apice paniculorum, solitarii, septem pollicares, glabri. Ocrea semipollicaris, acuta, obliqua truncata, acuta, striata integra, striata, glabra. Capitulum puso parum minus. Calycis communis foliola ovata, obtusa, fuscescentia. Petala hirpata stylus unicus, sexfidus. Semina globosa. membranae tres post casum femininum casum inter paleas cuneiformes, nigricantes

~~Hydrocotyle~~ *Hydrocotyle* foliis gramineis lateribus subparallelis obtusis, scapo ad apicem dilatato, squamis rotundato obtusis Act. bot. hort. nat. Par. 1. pag. 106
Habitat in amer. merid.

Ed. R. Hooker

a ~~Hydrocotyle~~ Amer. merid. diversa

Quinquangulare 6. Enicaulon Culmo ^{setaceo} quinquangulati, ochreis integris foliis
ensiformibus ^{erectis} brevioribus, capitulo globo. Tomentoso.

Scabiosa graminea radiceaulis, capitulis argenteis s. stratiis minima
maderopatana Plukn. alm. 366. t. 221. f. 7.

Enicaulon quinquangulare; Culmo quinquangulati, foliis ensi-
formibus Lin. fl. Rayl. n. 48. Syst. veg. 132.

Enicaulon hexangulare Burm. ind. 31. t. 9. f. 4.

Enicaulon minimum; Culmis setaceis, foliis ensiformibus, capi-
tulo minimo subgloboso. Lamant. dict. bot. 3. p. 275. Illustr. 1. p. 213

Habitat in India orientali. König 4

Copulosa. Folia radicalia, plurima, sesquipolliciana vel minora, linearisensi-
formia, acuta, glaberrima, striata, tenera, & ope perparascensia.

Culmi plures, interdum vix longitudine digiti minimi, plerumque pal-
mares vel spithamei, torti, glabri, flarescentes. Ochreis oblique,
truncatis, apice lanceolato, parum membranaceo, obtusiusculo, colo-
re foliorum. Capitula piso deplominora. Calycis communis foliola ob-
longa, glabra nitida, cinerea, capitulo florente fere evanescentia; Lobi pro

indigo

perni et petala linearia, basi attenuata, apice barbata. Stamina in corpus tubo su-
perne dilatato connata videntur, apice anthera tres gerens nigricantes gerens.
Stylum non vidi. Palea obovata, acuminata, concava, extus villosa.

Quinquangulare
Eriocaulon
Culmo quinquangulato, foliis lanceolatis acutis
orbis integris
bracteolis, capitulis globosis demum
lanceolatis acutis

flavidulum 7 Eriocaulon. Culmo quinqueangulari superne pubescentibus, foliis subu-
latis glabris ciliatis indivisis longioribus; calycibus argenteis
Eriocaulon flavidulum; minutissima puberulum: Culmis aggregatis, quinque-
striatis, foliis brevissimis pubulato-ensiformibus: capitulo convexo: flos-
culis vix pappulosis Mitchum fl. bor. amer. 2. p. 166

Habitat in Carolina. Richard.

Folia radicalia, plurima, pollicaria vel parum ultra, erecta, striata,
acuta. Culmi plures, semipetales, filiformes, striati, inferne glabri,
superne pubescenti subcanescentes. Capitula octres, acuta, striata, in-

ligulam acutam desinentes. Capitulum pido parum minus. Calycis
hemisphaericum
communis foliola ovalia, & cariosa, nitida. Pales calyceae concolorae.
Varia foliis angustissimis subsetaceis.

~~multum~~
Linnæus

nubiperso Cnicus scapo subullos foliis eniformibus pubescentibus maxi-
mis, capitula plano tomentosa Le Mark J. Ens: pag 213.
Habitat in Madagascar.
folia semipollicem cat

non vid.

articulatum
Septem-angulare

Eriocaulon culmo subtem angulati folisque ensiformi-
bus pellucidis, calycibus ciliatis foliis calycis communis
Eriocaulon decangulare Hope in act. Angl. vol. 59. p. 241.
lin. mant. 327. Lightf. fl. Scot. 569.

Nasmythia articulata Hudb. fl. angl. 415.

Eriocaulon septangulare. Wither. array. 2. p. 104.

Habitat in insula Skye Scitiae. mediam communem
in Horne man.

Radices, ^{albidis} foliis et culmi pellucida, isthmis intercepta. Folia radica-
lia plurima, bipollicaria, uti culmi glabri. Culmi semipeda-
les, vix 10ll. Ochrea folio brevior, ^{ampla} ~~laeta~~, apice ferruginea.

Significatura reliquis, quod non modo radices et ochreae isthmis
intercepta, ~~puncta~~ ut in variis aliis speciebus sed et folia et culmi

Hexangularis Culmo sexangulari foliis ensiformibus Lin. fl. roy. 149.
 Gramen panicum indiae orientalis minus, capitulo rotundo ex paleis
 spiculis in caecum caulis glomerato Plukn. max. 40.

Culmo hexagono
 glabro, foliis
 ensiformibus patentibus
 hinc & inde glabris basi
 leaethi glabris
 natis circa trifida
 brevibus

Habitat in India ^{concolora} &
 India radicalis, pluviosa basi lana ^{densa} sericea intertexta, ensiformi
 mica patentissima, pollicaria glabra nitida subtidescente ^{flava}
 fo, levia. Scapi saepe plures 4-5-6 pollicares erecti sim-
 pliis ^{spadiceis} ^{laciniis lanceolatis} ^{trifida} ^{capiti}
 vagina ^{sa} ^{pollicaris} ^{bracte} ^{glabra}, trifida. Capiti-
 lum terminale pro parte majoris hemisphaericum. Squama
 oblonga glabra nitida longitudine florum rigidiuscula. Calyce
 triphyllus foliis ^{trian} lanceolatis ^{apice} villosis canescenti-
 bus Petala tria linearia pallida flavescentia basi attenuata longitudine
 calycis villosa pro parte margini ^{antherarum} ^{uniuscuiusque} ^{longius} ^{congruis} ^{latere}
 idem areolae apicem ^{antherarum} ^{congruis} ^{latere}
 Petalum geminum superum ovatum. Stylus unicus corolla longior capillares
 trifidus stigma simpliciter acutum. Receptaculum paleis
 cuneiformis concavo longitudine florum superiore fusco villosis
 ex duo ^{seae} ^{erectis}

Enopthalodes ? *Eriocaulon* culmo decem striato, ^{compresso} foliisque ^{retundis} subulatis, ochreis tri-
fidis, ^{primis} foliis calycis ^{glabris} communis argenteis.

Eriocaulon decangulare; culmo decangulari, foliis brevibus humi
stratis Walt. fl. car. 83.

~~*Eriocaulon*~~ *Eriocaulon* ^{com.} compressum; culmo compresso teniter, capitulo
superne ~~et~~ calyce argenteo, capitulo superne plano vomeroso
Lamant. dict. bot. 3. p. 276. illustr. 1. p. 213.

Eriocaulon gnaphalodes; glabrum: foliis brevibus subulato en-
giformibus; vagina ⁱⁿ duplo triplove longiore: ligula elata,
decemstriata: capitulo subhemispherice convexo: involucri
squamis ovalibus, rotundato-obtusis, laniosis, argenteo-lubi-
dis Michx. fl. bor. amer. 2. p. 165.

Habitat in Carolina. Lamant, Rose.

Radicis simplices, articulate, albide. Colla resquipollicaria,
basin versus genum dilatata extropum valde attenuata, uti
culmi ochreas glabra. Culmi pedales vel ultra, compressi
panem tota, flavescentes. Ochreas culmo ampliores, bi- tripolli-
cares, hyaline, transversim remota fusco-striata, ore tripido laciniis
aequalibus. Capitulum nisi o panem major, subglobosum. Calycis

subglobosa
H. hemisphaericum

1794

Com munis foliola ovalia, & canosa, nitida, glabra.

An gronovii Synonymum huc referendum?

~~compositum - Linnæo compositum Nonnulli Knuthi, calyx & organæ, capitulum
fugere plano demontro. de herb. f. cur. pag. 213.
Grated in Caroline~~

villosum #0 Eriocaulon Culmo triangulari foliis ^{linearibus} que ensiformibus pilosis, ochrea
Eriocaulon ^{integrifolium} ancaps; culmo compresso, sulcis duobus, foliis et Culmo pi-
 losis Walt. fl. car. p. 3.

#1
Eriocaulon
 Compressum;
 Culmo compresso
 tenuiter striato,
 Calycis argenteo,
 Capitula superne
 plano ~~compresso~~
 Lamark. Dict.
 vol. 3. p. illustr.
 p. 213.

#1 Eriocaulon villosum; foliis breviusculis, subulato-linearibus, pilosis:
 prope subquadrisulcis villosis: capitulo sphaeroides; foliis et sulci
 gonsis Michaux. fl. bor. am. 2. p. 166.

Habitat in Carolina. Bosc, Richard, Lamark.

Folia radicalia, plurima, saepe bipollicaria patentia. Culmi plures
 saepe pedales, tereti, saepe inferne et superne planiusque compressi, foli-
 florescentes, ut folia ochrea et calyx communis pilis albidis distan-
 tibus adspersi. Capitula magnitudine lip. nigri, villosa, ^{villositate} ~~glabra~~ ^{nigri}
 Differt ab Er. graphaloculm radice subbulbosa, radiculi non articu-
 latis: foliis parvis ellipticis, basi vix dilatatis: Culmi striatis; #

+ Ochrea vix longitate Capitulis minoribus: foliis calycis communis foliolis subrotundis, fuscis,
 vix foliorum indivisi nec nitidis

pubescent *Enocaulon*

Habitat in Madagascaria herb. Lusp.

Quatro

Folia radicalia, basi lanata, villosa, canescentia, pithamosa, lanceolata, unguem lata. Scapus teres, striatus, villosus, foliis parum altior. Capitulum umbellatum: foliolo ovata, acuta. Color apice pulis copiosissimi albidus.

hispidulum 11. Enicaulon ^{ulmo} trigonum superne villoso, ochrea hispidis, foliis ensi
formibus basi lanatis, capitulo globoso glabro.

Habitat in Guiana. Ex herbario Fussiae

Folia et radicalia, vix peni pollicaria, acuta, striata. Ochrea polli-
cari, in ligulam brevem lancedatam divinens. Capitulum magnitu-
dine seminis Coriandri.

conf. adhuc cum umbellat.

Filiiformis Hymn Culmo filiiformi compresso, capitulo ovato minimo La Mart.

T. Eni: pag. 132.

Habitat in Serra Leona

Folia linearia angustissima vix semipollicaria Sapi Bpithamosi

Filiiformes arcuatis. capitulum oblongum magnit. Semen. Holo.
Borghii. Squama oblonga fusca ferruginea

non red.

Getaceum 12
13

^{glabris}
Eriocaulon culmo ^{per} angulans, foliis ^{glabris} petalaeis basi lanatis, capitulis glo-
bosis.

Randallia malabarica, capillares foliis Petiv. gar. t. 53. f. 10. 344.

Trien - Kotsijellati pullu. Reed. mal. 12. p. 129. t. 68.
Eriocaulon getaceum; culmo ^{per} angulans, foliis petalaeis Lin. fl. Zeyl. n. 50. 898.
Habitat in India orientali veg.

raro digitales

Folia radicata, plurima, unguiculata vel parum ultra, basi di-
midio breviora vel duplo breviora, basi lana intertexta, costarum
glabra. ^{scapi} ~~scapi~~ ^{plures} # erecti, filiformes, striis ~~per~~ et areis,
glabri, saepe torti. Culmuli foliis parum breviores, apice membrana
ces-hyalino, integro vel subtri-quadrifido. Capitula juniora oblonga,
magnitudine capituli aciculi, subimbricata, florentia magnitudine
seminis Coriandi. Calycis ~~com~~ ^{com} ~~manis~~ foliola, oblonga, glabra
ra latera, margine tenui membranaceo cincta, glabra.

Trichophyllum:

Calyx ~~in~~ [#] foliola ~~tri~~ glabra. Corolla Trichopetalae: petala apice
fusca. Stylus Trichosperus. ~~Palea~~ Palea In alio flore vidi corpus-
culum filiforme, trifidum, apice farinosum, an filamentum
cum antheris. Palea linearis, glabra.

Canatum E. foliis ^{linearibus} lanceolatis glaberrimis, caule foliis lanato
 flori pedunculis terminalibus umbellatis
 Habitat in America dedit Dr Ortega

Caules simplicissimi erecti palmari vel parum ultra, lana
 alba densa vestiti. folia frequentia pollicaria basi subvaginan-
 tria approximata lanceolata acuta nervis tenuissime striata
 sculo armato ^{setis} vili minuti adpressi subinaerata etate glaberrima
 Scapi caulium terminalis umbellati distiter vixit 2 polli-
 cares et ultra triangulari vili minuti adpressi subinaer-
 rapientes prope sub capitulo spatia pollicaria apice
 plana ^{to} patula lanceolata capitula ^{velata} parva oblonga ^{quorundam}
 oblonga pallide flarescentes nitida basi velopulo

gramen poliflorum Amph. orb. 6. p. 1. 7. p. 1. a Linnæo hinc collectum ad
 coliam plantam (abique habet) nec deest in phlo capitula dunt cum Lin
 næo convenit.

13
triangulare H. Eriocaulon culmo triangulari, foliis ensiformibus, ^{glabris} capitulo ovato.
Lin syst. Veg. 132.

Plantaginella aurea alopecuroides brasiliana, foliis gramineis Breyn.

Cent. 10 p. t. 150.

Eriocaulon triangulare; culmo triangulari, foliis ensiformibus, capitulo ovato. Lin 848 v. 4

Habitat in Brasilia. Ex herbario Pisonis

l. veg. 132

Cespitosa: Culm. Culmi vix longitudine digiti, uti folia glabri. Ochreae

Culmo triplo brevior, apice subulato. Capitulum Conradus Duplo majus

ses. 8. Cusculi villosi

Simile sequenti, diversum foliis triplo latioribus, capitulis ovatis.

capensis Hyris capitulo ovato, foliis linearibus brevissimis Thunb. florido fl.

Cop. pag 12

Habitat in Cap. b. spec

non vidi

pellucidum 14 Enicocaulon Culmo quinqueangulari, foliis subulatis quinque nervis,
capitulo globoso.

Enicocaulon pellucidum; pusillum, glabrum: foliis brevibus, subulatis,
canaliculatis, pellucidis, quinque nervis: caulibus solitariis: capi-
tulo parvulo, subpomeiformi: squamis involucri vix distinctis, ora-
libus, obtusis Michaux. fl. bor. amer. 2. p. 166.

Habitat in septentrionalibus Canada. Richard in Pennsylvania Bartram

Radices simplices, pollicares, trans-
versim lineato-
articulati. Folia radicalia, plura, unguiculata, tenera. Culmi digito mini-
mo parum longiores, subulati glabri. Octavo folio parum longiores,
bifido, sicca lineis transversis distantibus interruptis fusis puncto.

Capitulum semine Coniadi duplo major, intanum.

Valde affinis Er: setaceo, diversum magnitudine: culmo solitario,
utroque apice non hyalino: paleis villosis.

Hyalo hyalino. la-
eyis communis foliolo subrotunda
albido, hyalina

pendula Melothria Hort Cliff. 490x S.V. pag. 82.
Byonia oleosa fructu minor Plum p. 3. w. tab 66 fig 2
Cucumis minima, fructu ovali negro Levi Sloan hist. h.
pag 227. tab. 42. fig 1.
Cucumis parva repens virginiana fructu minimo
Pluk n. alm. 123. tab. 05. fig 5.
Habitat in Canada Virginia Jamaica O
Caulis scandens filiformis angulati. folia petiolo
alterna ^{sup.} cordata sive lobis angulati. lobis obtusi
mucronatis intermedio ^{in inferionibus ovato in superioribus lobis cord.} longior ^{subdentulata} vel
integerrimis utraque a puncto numerosis pinnis
libero nervi subavenis nervi pectus subtrigoni.
cum axillares pedunculati axillares in maxima
mea videtur monaria pedunculis masculis 3-4 fl.
foemineis unifloris ex ead. axilla

Descriptio in Off.

umbellatum 15 Eriocaulon ^{Culmo tereti} stapso nudo, ^{umbellati} pedunculis scapiformibus in volucrio,
foliis linearibus necoloratis radicalibus

Eriocaulon umbellatum; caule nudo umbellifero, in volucrio polyphyllis,
radiis inaequalibus longissimis lamellis. Dict. bot. 3. p. 277. illustr.
l. p. 214. t. 50. f. 4.

Habitat in Guiana. Ex herbario Pussiori

Folia radicalia, plura, semipollicaria et ultra, patentissima, acuta,
villosa. ^{Culmi} scapae plures, fere spithameae, teretes, glabrae, laeves, nitidae,

purpurascens. Ochrea nulla ad basin ^{Culmi} scapae. Pedunculi plurimi
ex apice ^{Culmi} scapae, palmares interdum semipedales, ^{iniguales,} triangulares, villosi.

4 cique duplo
vel triplo lon
giores

In volucrio polyphyllum: foliola subulata, pollicaria, vel mino
ra. Ochreae teretes, pollicares vel breviores, ad ens latera hiantes, sinu
ta, villosa. Capitula tenella oblonga, ovata globosa, magnitudine
fere pari. Palyis communis squama arida, ovata, acuta nives, nitida
Palae linearibus necoloratis, hyalino.

pellucidum Enodulium

Habitat in America boreali Richard
Scopi interdum palmarum et ultra

habes

polycephalon 16 ^{** Culmo folioso.} Enicaulon Culmo folioso foliisque lanceolatis glabris, pedunculis umbellatis pilosis, capitulis globosis.

Enicaulon fasciculatum; paniculo brevi folioso, foliis patentibus, Scapis plurimis fasciculatis pilosis Lamarck. Dict. 3. p. illustr. 1. p. 214. t. 50. f. 3.

Habitat in Guiana. Ex herbario von Rohr, Richard.

Affine En fasciculatum, et diversum: Culmo brevioris, interdum vix semipollicari, raro bipollicari, strictiore, acuto, glabro: foliis latioribus, obtusiusculis, glabris nisi forte ~~supra~~ inferius: pedunculis paucioribus strictioribus, brevioribus: capitulis globosis, paleis glabris?

Culmi vaginae foliorum terti. folia pollicaria, patentissima. Ocreae unguiculatae, striatae imbricatim, in linguam lineari-lanceolatam dehiscentes. Pedunculi saepe a culmo longiore, interdum aequantes, triangulares. Calycis communis foliola subrotunda, fusca villosa. Paleae lineares, aequales, nitidae, obtusiusculae.

~~Enicaulon foliosum Lamarck. Dict. 3. p. 214. t. 50. f. 3.~~
Enicaulon foliosum Lamarck. Dict. 3. p. 214. t. 50. f. 3.

~~Enocaulon~~

~~forte villosa~~

~~Habitat in Carolina~~

~~Scapi exsert angulati, pilosi. Tolia lineana, sesquipedaliana~~

habes no 2

Linifolium 10 Enicaulon culmo foliato folisque linearibus glabris, pedunculis umbellatis superne ochreisque hispidulis, calycibus scariosis

Habitat in Guiana. Richard.

Culmi palmares, erecti. Folia distantia, patenti pinnis, pollicariis, acutis
scula, suprema ax viscosa? Pedunculi circiter decem, culms longiores,
inoequaliter, triangulares, apice hispiduli, coeterni glabri. Ochrea vix pollicari
res, striata, in ligulam lanceolatam apice reflexam desinens. Calycis com

Capitula hemisphaerica, minutis foliis lanceolata, acuta, fls pallide flavescentia, rubra. Paleae sub
repere nigrae duplo minores.

lanatum 19 ^{Culms} Enicaulon caula folioso lanato, foliis linear-lanceolatis, pedu-
pedunculis terminalibus umbellatis & capiformibus umbellatis
Habitat in America meridionali.

Culmus
Culmi palmaris vel ultra, erectus, simplicissimus, ^{nigro} lana ^{densa} densa
textus. tris folia frequentia, pollicaria, approximata, pollicaria, acuta, nervosa
tenuissime striata, ore lentis villosa, stete glabrata. Pedunculi circi-
ter viginti, bipollicares et ultra, filiformes, villosi & bicinerei, prae-
sertim sub capitulis. Ochreae pollicares, superne oblique hiantes: la-
mina lanceolata, patula. Capitula parva, vel oblonga, villosa: squa-
mo imbricata, oblonga, pallida flavescente, nitida, basi villosula.

Habitus. Culmis ^{stridgansulati} erectis, simpliciter. ^{veginantia} folia in plerisque radicalia, ^{linea}
ri-ensiformia[†]. Ochreae ad basin culmi vel pedunculi. Capit-
† Erecta, striata, ad culmum terminale, solitarium.
to.

~~Enicaulon foliosum~~

Encaulon

Habitat in Madagascar et insula Bourbonica Commae for herb. Mus.

herb.

Amplexicaule 20 Enicaulon Culmo subramoso, foliis linear-lanceolatis, capitulis axillaribus.

Enicaulon amplexicaule; culmo repente angulato, foliis confertis canaliculatis amplexicaulibus; floribus capitatis difformibus Roett.
Gur. 2. t. 1. f. 1.

Tonina fluvialis Aubl. fl. gu. 85 t. t. 330.

Hyphydra Schreb. gen. n. 14 p. 4

Habitat Surinami Rolander, in Caesena v. Rohr 7

Caulis filiformis, pedalis et ultra, laxus, quinqueangularis, glaber.
Folia semipollicaria, confertis, summa, sagittaria, alba acuta, inferne pilis longis ciliata, cetera non glabra. Pedunculi axillares, solitarii, unifolii dimidiis breviores. Ochreae longitudine pedunculi, pallide ferrugineae, raris pilis. Capitula parva, subglobosa. Calycis communis foliola linear-lanceolata, pallida acuta, pallide ferruginea ciliata. Pales structura foliolarum calycis.

Caulis interdum erectus, interdum decumbens radians Aubl. in quo Descrip
tio partium fructificationis oque ac eorum figura minime exacta est hunc

