

125.

Eriophorum

Eriophorum. Gluma pallida indigne imbricata. Cor. 0. Stm. 1, cana
Congisfina cinctum. -

vaginatum 1. Eriophorum culmis vaginatis Teretibus, spica & lanosa len
fl. & vac. 45. 50. Fl. Dan. 236. Pollic. pal. n. 51.

Fucus alpinus capitulo lanuginoso ^{prodr.} Bauh. theatr. 107. 23. theatr.
107 seu Schoenogonon Bauh. prodr. 10. 23. theatr. 107. Schreb.
gram. 302. t. 7. f. 1. app. t. 7. ~~f. 1.~~

Habitat in Europae frigida & venilibus.

Culmi pedales, vaginis duabus vel tribus superne ampliatis.
Solia culmo saepe altiora, trigona, pubulata, medullosa. Spica
oblonga, & emipollicans: squamae oratae, acutae. Lana tenuis.

Spartum Lygeum Coef. et. 205. 7. 2 *

Spartum herba alba Clus. hist. 2; p. 220. fig. 2.

Gramen *spartum* secundum; panicula brevi folliculo instructa
Bauh. pin 5.

Habitat in Hispania et Barbano campi argillosi &
^{fructes}

Culmi erecti ^{fructes} ~~in~~ Venaci glabri ^{fructes} sed alii et ultra inferne
foliosi et ^{unquam solum} vaginati. Vaginae glabrae. Folliculus convolutus rigidus & setis
vaginae glabrae ^{fructes} ~~fructes~~ non a latitudine culmi ligula lan-
ceolata bifida. Peristomatibus erectis vel parum inclinatis
ovato lanceolatis attenuatis saepe pollicariis

alpinum 7. Eriophorum Culmis ^{genuis} nudis ^{triquetris}, Spica pappo breviora Syst. veg. 104.
Sc. Dan. 620. Roth. fl. germ. 2. 64.

Fucus alpinus bombycinus Bank. prodr. 6.

Linagrostis juncea alpina, capitulo parvo: Vomerio variore Scheuch.
gram. 305. t. 7. q. 4. opp. t. 8.

Habitat in Europae alpinis, locis que affinitus &

Eriophorum hed Culmi spithamei, aphylli, filiformes, basi vaginati. Spica parva
Boniarum; Culm. oblonga: squamae lanceolatae ferrugineae, infima in aristam adscissa
mo nudissimo, acute
triquetra: foliis radica
libris paucis; subtri
gone canali culm.
petaceis: Spica
unica: sillis paucio
ribus. Michaux fl. Am. bor. 34.

Specimen Erioph. p. hedboniani, quod in herbario Richardi nunc
est diversum ab Er. alpino ^{apparet} ~~apparet~~

sergineum L. Culmis foliosis teretibus, foliis planis, spica erecta lra 1. V
Gramen tomentosum virginianum, panicula magis compacta erecta
foliacea, caule compresso aures colore perfusa Pluck. alm.
179. t. 299. fig. 4.

Gramen tomentosum, capitulo ampliore fusco et foliaceo Monj.
hes. t. 3. p. 274. f. B. t. 9. fig. 2.

Habitat in Virginia 4

Culmis glaber striatulis apice triquetris. Spica terminali
matura diff. ampla hemisphaerica involucrium triphy-
tum capite spica longior folioli subulato triquetris
in apicalibus lana albedo gelva

pycnostachyum Michaux non diff. a virgin. Stamina 2. stygmata 3
Richard

involucro foliis brevior

polystachy^oam 4. Eriophorum ^{foliosu} culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis,
pennibus ovatis Roth. nove Beytr. ~~II~~ I. p. 94

Gramen eriophorum Dod. pempt. 562.

Gramen pratense tomentosum, panicula & pissa Bauh. theatr.
60.

Linagrotis panicula ampliore Vaill. bot. par. t. 16 p. 1.

Eriophorum polystachyon, culmis teretibus, foliis planis, spicis
pedunculatis Lin. syst. veg. 104 Less fl. heb. n. 37. t. 1. p. 5
Smith engl. bot. t. 563.

III Habitat in Europae uliginosis turfosis 4 Culmo breviora

II: vaginae inferae
saepe fusco-nigri-
centes.

Radix fibrosa. Culmi ~~per~~ ^{interdum} desquipedales. Solium cauliculi
plura, apice triquetra ^{trigona} ^{trigona} Involucrum ^{trifidum} triphylum
umbella brevius. ^{plurimae} Spiculae fructiferae ovatae, erectiusculae;
fructiferae oblongae, pendulae: Equinae & canosae.

II Eriophorum ~~per~~ Catifolium; culmis teretibus foliosis, foliis planis, apice triquetris, spicis
erectiusculis fibrosissimis. Stappe bot: Taschenbuch 1800 - p. 108.

Boiss

1724

conglobatus. Lili. Culmo Inquetro nudo capitulo ovato Verminali involuero tri
phyllo deflexo.

Habitat in umbrosis graminosis India. Hong

P. Cephalote proximus. Culmi plures ~~Spithamo~~. Inquetri basi vaginas

membranaceis semigineis tectus, glaber. Folia radicalia, connata

glabra altitudine culmi. ~~Ca. Classi in speculo~~ ^{collecti} in capitulo Ver
minali ovato magnitudine cerasi, ex ovato oblongo compresso glabro

spicula inferiore submembranaceo ovato oculo armato fructu.

germen Inquednum stylus bifidus

in Cephalote germen subrotundum punctatum

angustifolium # *angustifolium*, *teretibus*
Eriophorum culmo foliosis, foliis canaliculato. Triquetris, spicis
pedunculatis erectis Reich. fl. moen. francif. n. 34, app. 165 Reut.
fl. germ. Deth. act. soc. Lin. 2. p. 209. Smith. angl. bot. t. 564.

angustifolium 5.
Eriophorum foliosum *Linagrostis palustris angustifolia*, panicula sparsa, pappo rariore
Eriophorum foliosum Vardi Scheuchz. gram. 300.

Eriophorum foliosum Vardi
bus, foliis canaliculato *Eriophorum polystachyon* Curt. fl. lond. fasc. 4. t. 9.

triquetris, spicis pedunculatis, seminibus ovatis. Roth. new. bestr. 1.
Habitat in Danica, Germania, Angliae uliginosis turfosis &
Differt ab antecedente: Statura majore: foliis multo longioribus
angustioribus quibus in antecedente angustioribus
Pedunculi ^{in raris} foliis culmo longioribus involucrium bi-triplyt

p. 94.

cum umbella longius, foliolum unicum saepe tri-polliciare
Pedunculi & abriusculi.

Eriophorum angustifolium *descriptio in flora britannica* 1. p. 60. potius ad *Eriophorum*
Eriophorum gracile *fructus quadrat.*

videndum ad h. n. Smith. Synon. hui. vel ad gracilem
vestiret

vaginatum C. Culmi vaginati teretibus, spica panosa fl. Lu. 504

fl. Dan. 1. 236

Gramen tomentum alpinum et minus Bauh. prod. 10. p. 5.
Funicus alpinus capitulo lanuginoso f. Schoenolagum Bauh.
prod. 1. 23. p. 1. Theatr. 100. Schenck. gram. 307. 4. 7. p. 1.

Habitat in Europa frigidis montibus &
Culmi pedali erecti simplicissimi glabri striati. vaginatis.
folia inferiora lanugine angustiora glabra. spica
terminali

Spica alterius describenda

gracile 6 Eniophorum Culmis teretibus foliosis, foliis triquetris persum canaliculatis, spicis pedunculatis, seminibus linearibus Roth. Catalect. 2

* Eniophorum panicum
la minore Vail. bot. par.
T. 16. f. 2.

app. nova beyl. 1. p. 95
* Eniophorum triquetrum; Culmis ^{triquetris} subtriquetris foliosis, foliis triquetris
spicis erectis simplicibus Hoppe bot. tusc. emb. 1800. p. 106

ultra medium anceps

Habitat in Europae uliginosis turfosis & tenerior quam in E. angustifolia
Piedra repens. Culmis pedalis. Colia culmi duo- tria tri-quadri-

Involutum
Diphyllum, non
bella brevius.
Pedunculi ope
tertio villosuli.
2. catini usque culi

pollicari. # Spiculae duae, tres, erectae, oblongae
Culmi ultra medium accipiter

Vail. fig. 2. hinc revocat Roth.

virginicum 7. Eriophorum culmo tereti folioso, foliis planis, spicis congestis subsessilibus involucri brevioribus.

Gramen tomentosum virginianum, panicula major compacta ~~erecta~~, foliacea, aureo colore perfusa Pluk. alm. 179. t. 299. f. 4.

Gramen tomentosum, capitula ampliora fusca et foliacea Moniz. hist. 3. p. 224. b. p. t. y. f. 2.

Eriophorum virginicum; culmis foliosis teretibus, foliis planis, spicula erecta Lx. syst. veg. 104.

Eriophorum virginicum; culmo tereti, folioso: foliis anguste planis; caulinis plerumque duobus: spicis pleribus subsessilibus congestis: floribus diandris: lana fluorescente Michx. fl. bor. Amer. 1. p. 34.

Habitat a Canada usque ad Carolinam &

Palmis teres. Sola plana. Involucrum triphyllum; foliolum unicum tripollicare. Lana albida gilva. Capitulum fructiferum hemisphaericum.

Sphaerium

Stamina duo: Stigmata tria Richard

Habitus Palmi erecti, striati. Sola vaginae foliorum integre.

Asperifolia Onopordii

Habitat in Carenia boreali Ruthen

Culmi plures, erecti, uninodes, basi foliosi. Vagina duo, folio brevifimo, pubulato
terminata. Oblea nigra, angusta, planiuscula, subpergentia, fectus margi
neque aspera. Flori subracemosi. Pedicelli 1-2 flori. Floresculi majusculi, herma
phroditi. Gluma 1 floris, amplior quam calyx corolla 2 valvis: valvula oblon
ga, obtusa, sive nervis, glabra. Corolla bivalvis, inaequalis: valvula ^{exterior} anterior
minuta, subtereti oblongo ^{exterior} verdeo, apice aristata. arista calycis longiore, villo
sa. Stamina 3. Stylis 2 Germen lineare Stylus unicus. Stymata 2 villosa.
Nectaria linearia, plana, filamentis brevibus

Capitellum S. Culmo Vacti, capitulo ovato, involucrio diphyllo Thunb. prodr. pag

16

~~Serpis Unguiculis culmo Vacti nudo, spica cylindrica squamis lanice
latis basi laterali membranacea Lin. S. V. pag 98.~~

~~Habitat in Cap. b. spici~~

~~Spithameis filiformi~~

~~Culmus inferne vaginis femigineis Vactis. Folia inferne filiformi~~

~~Culmo dimidio breviora carinulata glabra. Capitulum ^{imbricatum} terminale~~

~~in unguiculari diphyllo foliolo filiformi carinato basi dilat-~~

~~in acumine filiformi carinato depresso carinato alterum sequi~~

~~nulli ac alterum unguiculare capitulum squamato lato~~

~~ovato attenuato fusco nigrescente glabro~~

Scheuchzeri? Eriophorum culmis basi vaginatis teretibus, foliis tera-
ti canaliculatis, spica florifera subrotunda. Roth. ^{naive} ~~naive~~ Beitr. 1. p. 93.
Funic. alpinius capitulo tomentoso majori Scheuchz. gram 304. app.
t. 7. ~~pl.~~

Eriophorum Scheuchzeri; ~~Hoppe~~ culmis teretibus vaginatis, inferne foliosis,
foliis canaliculatis, spica subrotunda Hoppe Taschenb. 1000. p. 104
Habitat in alpidibus Salisburgensibus et Rhaeticis.

Radix fibrosa. Culmus pedalis, superiora inferne foliosus, superne
nuda. Folia culmo breviora. Squamae coloratae, margine glaucosae

~~Frankfurt
Eriophorum Culmo foliosis, foliis canaliculato-angustis, spicis
cuneatis erectis Reich. de mero-graeof. n. 34. app. 165. Rothgorn. II
Angustifolium
Scheuchz. 2. gram 300.
Habitat in Danis, Germaniae uliginosis humosis? 4~~