

Enthali

1. fruticosa L. foliis ellipticis racemis compositis
2. polygama L. foliis obovatis, cymis axillaribus subdichotomis

Fruticosa Enthalis Lin. S. V. pag. 210

Habitat in montibus. In Apennin.

Rami oppositi, teretes, glabri, purpureo-florescentes

Folia petiolata, opposita tri-quadripollicana, pollicis 1 ad 2 lata, reflexa
apice ramorum approximata, ovata, interdum obscure reticulata, basi
si in petiolum attenuata, integerrima, arena, obscure nervosa,
lancea, supra nitida.

Stipulae ramum cingentes, mucrone breviter folia

pedunculati ex axillis penultimis, oppositi, solitarii, pallide florescentes
tati, compressi; parthiales uti pedicelli oppositi. Bracteae subula
te ad basin ramorum peniculae.

(Arbor varians secundum locum fertilitudine, habitu foliis ^{numeroque} stamine
bracteisque num. varietas foliis ellipticis

Vesperale Bullonia

montana

Scandens Cnethalis?

Habitat in Domingo herb. Guaf.

Rami teretes, glabri, scandentes, apice compressi. Folia opposita, ut polliciana, oblonga, acuta, utrinque glabra, obfure nervoso-venosa, subtus pallidiora, subsessilia. Stipula decidua. Pedunculus terminalis, trifidus: partialiter dichotome divisi. Calycis laciniis oblongis, obtusis. Stamina quinque. Anthera flava.

retusa Enthali?

Habitat in Madagascari Comnes. herb. Aug 5

Rami glabri, teretes, crassitie fere penno cyneo, annulati post casum stipularum. Do-
lea petiolata, opposita, tripollicaria, obovata, retusa, subcordata, glaberrima, supra
axillaria, enervia, subtus remote nervosa-venosa. Pedunculis terminalibus, pariterque
primis & secundis, deinde dichotomis, cum flore pedicellato in dichotomia. Capsula
magnitudine seminis Leonardi, subglobosa, striata.

Andromeda L. Indica proclumens Jacq. Fl. amer. pag. 72

non vidi

2 polygama E. foliis obovatis, pedunculis axillaribus dichotomis
Erithalis polygama foliis obovatis: floribus axillaribus masculis
cymosis, hermaphroditis solitariis *Erst. prodr. p. 17. n. 101.*
angustifolia *β. Timonius Rumph. amb. 3. p. 216. t. 140.*

Habitat in societate Anpulo

Rami teretes glabri, cortice cinereo cicatricati. Ramuli
oppositi obscure angulati. Folia brevissime petiolata
opposita bipollucaria utraque glabra, acumine bene
obtusiusculo terminata, integerrima, supra nitidiuscula
venis tenuissimis obscuris, subtus aversa. Axilla ovata
Pedunculi axillares solitarii, folio breviores compressi
apice bifidi, flor. in dichotomia sessili pedicelli sub triflori
Calyx 6 dentibus brevis, Corolla villosa

fruticosa C. Lin S.V.

Lambucius ligno odoratissimo f. *Santalum racemosum* foliis obtusis
Plum u: 1.249. fig. 2.

Enthalis odorifera, arborescens Jacq. Amer. 72. t. 173. fig. 23.

Enthalis fruticulosa, foliis obovatis crispis nitidis oppositis, pedunculis
ramosi ad alas superiores Brown. Jam. 165. t. 17. fig. 2.

Habitat in Jamaica f.

arbor Rami glabri obscure tetragoni purpurascens subarticulata. Folia petiolata
opposita, elliptica, integerrima subcoriacea glaberrima supra nitida
obscure simpliciter venosa obtusissima. Stipula membranacea pediculis
connatis, integerrima. Pedunculi axillares, oppositi angulati
5 coes in racemo composito pedunculi pariales et pedicelli oppositi
vel alterni

fruticosa C. foliis ellipticis, racemis compositis.

eupatorioides L.