

Cernodca

purpurea & Eriodea?

Habitat in h. maritima

Glabra. Pinnis cuneato-lobatis. Solia sessilis, pollicaria, lanceo-  
lata, rigida, penna terminata, supra nitida, subtus tenuissime oppres-  
sente nervosa. Stipula subulata, attenuata. Pedunculi axillares, bre-  
ves. Calycis laciniae squae lineari-lanceolatae, carinatae, acutae, ad  
laeviores.

pungens Emodia foliis lanceolatis rigidis pungentibus, floribus pedun-  
culatis. See Mark T. Enc. pag 286.

Habitat in Amer. merid. f

Calycis s. fidi

San. for Godm. tab 25.

~~meridi~~

Citronalis Ernodea Schum prodrom. pag. 29. <sup>Ernodea</sup> Symb. bot. pag  
Thymelaea humilior foliis acutis atro-virescentibus Sloan her. 2. p. 93  
t. 189. fig. 1. 2.

Habitus Spermacoie <sup>variati</sup>,

Rami teretragoni, articulati, cinerei, aphylli, ramulosa; ramulorum  
alberni, bipollicares.

Folia opposita in ramulis, opposita, sessilia, sesquipollicaria, laniceo-  
cata, utraque attenuata, avenia, obscure trif-5 nervia.

Utraque glaberrima, nitida, integerrima, mucronata cuspidata.

Stipulae ramum amplexantes, truncatae, ciliatae.

Loes axillares, oppositi, sessiles, in diaphotus: laciniis

Calyx profunda quinquefidus, lanceolatis, cuspidatis.

Corolla tubus unguicularis, tenuis, calyce longior.

Laciniae limbi lineares, obtusae.

Stamina longitudine corollae.

Stigma truncatum.

(Genus affine Spermacoie. Variat foliis latioribus et angu-  
stioribus