

2. *Androsace Geranioides* caule suffruticoso foliis subincisatis, quinque
lobatis serratis etnum involutibus. Cav. 10: 1. pag. 6 Tab. 8.
Habitat in prona. b. p. 5

petroselinum
~~numidicum~~ Geraneum

Geraneum numidicum caule decumbente, foliis oppositis bipinnatis glabris
sculis inaequalibus pedunculis bifloris pag. 214. Flor. A.T. 2

Erodium petroselinum: pedunculis bifloris foliis pennatis: foliolis pennatis
laciniis lineariibus L'Herb. Geran. n. 9.

herfutem q. foliis superioribus indivisis cordatis, inferioribus 3-5 lobis, ramulis petiolis
herfutis, seminibus viridibus adhaerentibus Sw. l. c. p. 22. *

Pluk. alm. 172. t. 299. f. 1. mala

Goof: procerus, foliis trilobis, seminibus minoribus adhaerentibus

glaucophyllum Geranium

Geranium crassifolium; foliis glabris, crassiusculis, inferioribus cordatis
superioribus oblongis; omnibus crenato lobatis *Tournefort. de ser. p.*

123.

rupes Geranium

Paranell. 316.

Geranium aculeatum L. Veg. Ed. 10. p. 1143.

pentagonia

petraeum g. pedunculis multi floris f. lobis pentanervi, petalis integerrimis
foliis pilosis tripinnatis. f. d. s. l. a. p. radice albis.

tabulare germanum Burm. Ger. 44. Cassan. 320. non Lin. Cortusoides h. Herbario
Cithmifolium Geran. L. Herbar. fructuosum Cassan. t. 122

Pentapetes Cordalis Aubl. Tombeya acutangula Bar. 177

Sida multiflora Jacq. obs. 2. t. 45. fig. 1.

Sida fruticosa Hort. Panf. carpiniifolia Lin.

arborescens. Penurana hort. Panf.

Hibiscus aciniifolius, trilobus, armatus in Mf. S. Sumatren.
Secundaria volubilis Rumph. arb. 5. 2.

viskopa Megna.

Chorophyllum G. C.

geranium citato folio. eadem conanum. Bar. mus. 2. p. 93
fig. 22

Geranium caule procurrente, petalidis multifloris, foliis duplicato
pinnatis, pinnis acute incis. Hall. herb. 944

Geranium chorophyllum caule erecto-decumbente foliis oppositi
pinnatis incis, pedunculis elongatis multifloris: cotyledonibus
in libro Caran. des. p. 226. tab. 95. fig. 1

Habitat in Gallia & Babaria Helvetia C.
Caulis pubescens ramosus, generulis valde inusitati. Folia longis
sine petiolatis. Hipula ovata acuminata. Pediculi ut illos
longissimi involucri tecta. pedicelli 6 fructiferi declinati.
foliola calycis oblonga aristata striata. petala integerrima
Caran.

Caulis striatus pilosus. cuspis i. pennis asperis. Folia pinnati
pinnata: pinnulae lineares cuneae. Hipula ovata,
Calycis foliola longioribus mucronata herb. Musp.
an a Ger. muscato diversa

geranium glaucum

botrys G.

Geranium superuum botrys folio, aciu fuscum fructante Boicon. mus.
2. p. 144. Tab 9. Querfl. hep. p. 6. p. 163. no 10

Geranium montium annuum laciniatum, aciu longissima botrys
inf. 269.

Geranium botrys caule superuo foliis cordatis oblongis sinuato
pinnatifidis hirsutis, fructibus longis erectis Cavan. des. p. 210
Tab 90. fig. 2

Habitat in Hispania et Neapoli in arcuosi.

Haec planta hirsuta. Caules plures frithamoni dichotomi. Folia
radicalia longe petiolata, caulina opposita. Stipulae breves
siccatae. Pedunculi axillares et terminales sesqui pollicares,
biflori. Foliole calycis aristata lanceolata. Capsula tomentosa
Cavan.

Evidum

non vidi an mea Cavan

Laccinum Genm. foliis multinatis-pinnatis p. s., laciniis dentatis.
Gussgh. pl. ii. cent. 1. 2021
Habitat.

Erodium

mibi ignotum

botany 9

Habitat

Barford

Secundum herb. Tinsleyi videtur esse graminum pennis.

Chamaedryoides γ subacaule pedunculis unifloris, foliis cordatis
obtusis crenatis Hort. Kew. 2. p. 416

Geranium officinarum, minimum, superum alpinum, chama
dryoides, flore albo variegato Boiss. Mus. 160. t. 120.

Geranium Reuchardi

Erodium

Murr. in Comm. Gott. 1780. p. 11. Tab. 3. I-V

Geranium parvulum

Scop. infatr. 1. p. 10. t. 3.

Geranium chamaedryoides acule foliis radicalibus parvis
orbiculatis cordatis crenatis in apice unifloris bracteatis

Cavan. Desf. 4. p. 197. Tab. 76. fig. 2.

Habitat in Menorca, Corsica γ

Tolia radicalia longissime petiolata vix unguiculata
cordato subrotunda oculo armato pelis aliquot adpressis
petioli longi tertiae digiti minimi raris pelosi. Lappulae
capellares longitudine petioli superne bracteis duobus, unifloris
corolla campanulata, alba petala integra oblonga
ungui villosi. Lacinae calycis lineares, mucronatae

crassifolium. Caulis humifusus, foliis cordatis subrotundis rugosis crassis, floribus
umbellatis parvis. Caran. det. p. 219. Tab. 90. fig. 1.
geranium malaccoides superum. Lado rotundo crasso rugoso integro
foliis acutis brevissimis canalicatis. Boerh. mus. L. p. 109. Tab. 89.
Habitat in Sardinia.
Caulis semipedalis. Folia radicalia numerosa. Stipula ovata
acuta. Umbella pauciflora. Boerh.

non vidi

mantimum *G.* foliis cordatis crenatis incisè pinnatis, caulebus depressis
Linn. S. V.

Geranium minimum procumbens, foliis betonicis Morf. bot.
2. p. 512. f. 5. 7. 3. 9. fig. 10

Geranium pusillum maritimum, althoe. f. betonicis foliis Planch.
4. 31. fig. 4.

Habitat in Anglia *mantimum*

Geranium mantimum caule procumbente, foliis cordatis ovatis
crenatis incisè pinnatis, floribus parvis pentandris, pedun-
culis raro trifloris Cassan. bot. pag. 219. Tab. 88. fig. 1

Caules procumbentes subditotomi striati villosi interdum
pedales. Folia unguiculata incisè sublobata lobis
obtusè dentatis villosis subincompositis, opposita vel cum
summo opposita. Stipula lanceolata membranacea. petiolus
folio triplo vel quadruplo longior. Pedunculi axillares

Erodium mantimum
Hort. Kew. 2.
fig. pag. 466

folio triplo vel quadruplo longior. Pedunculi axillares
folio longiores 2-3 flori, involucrium tetraphyllum
calycis villosi subtriflori mucronati. Capsula subtomentosa

foliis cordatis oblongis incisè sublobatis obtusè dentè crenatis
pedunculis subtrifloris caulebus depressis

Helictropoides G.

Gomnium helictropoides caule fruticoso minimo, foliis oppositi-
incanis subobtusis ovatis crenatis dentatis, pedunculis umbelli-
feris aequae anthesis longioribus Cavan. *disj.* p. 220. Tab. 113
fig. 1.

Habitat in Africa 4

Caulis vix pollicaris. folia petiolis brevioribus, pollicaria
stipula lanceolata subulata. Pedunculi 4-5 pollicares
axillares subquadriplori. Calyx pentagonus foliolis ovatis
anostatis. capsula tomento feminea Cavan.

nidi ignotum

muricium Erod.

Geranium muricium, caulebus gracilibus herbaceis ramosis foliis oppositis
trilobis, lobo medio longiore, obtuso crenato. Cavan: Despect. pag
272. tab. 126. fust.

Habitat in Hispania O

Caules striati, nodosi, villosi. pedales. folia opposita petiolis ^{sub} equa
lia basi acuta, triloba crenata. Sepala ovata. Peduncululi
axillares longitudine fere foliorum. Pedicelli 3-4. vix semper
licares. Glosula calycis ovata, striata. Cavan.

non vidi

Geranium ~~longifolium~~

Chium G. foliis cordatis incis; superioribus lyrato-pinnatifidis Len.
Spec: pl. pag. 951. & Burm. ger: 35.
Geranium chium vernum, coryophyllata folio Tournef. Cor.
Co. Mart. Cent. 4. 7. 4.

Habitat in Chio O

Geranium chium caule herbaceo erecto, foliis oppositis cor-
dati incis, superioribus trilobi: lobis pinnatifidis Cav.
Def. pag. 224. tab. 92. fig. 1. Lunaria pubescens

Caules herbacei lani. glabripuli angulati ramosi, pedali
et ultra. Folia inferum petioli breviora ^{opposita} ~~simplicia~~
caulina dentata glabra excepto nervi subtus. Peduncul
li axillari ~~spatiis~~ longior ut petioli pubescentes
sopit 6 flori. Stipula involucri minuta. Foliole caly
cis pubescentia striata aristata lanceolata. Corolla deti
ta coerulea. Capsula villosa

Cittoreum Jacaulé

geranium mantoum calycibus monophylli foliis cordato, ovatis
subtiliter crenatis caule nullo Burm-geran. no 60 Pavan. des
a pag. 222.

~~α~~ foliis pinnatis crenatis rugosis, floribus dilute purpureis

β. foliis subrotundis crenatis floribus purpureis

Habitat in Cap. b. p. c. 0.

Radix fibrosa. Folia longe petiolata, flores 3-6 in apice
scapi Burm.

non vidi.

Andropogon foliis cordatis quinquelobis, scapulis radicalibus Linn

Spei: pl. pag. 9524

Habitat ad Cap. b. Spei 4

Folia crenata subtus scabra

non vidi

incarnatum G. foliis tripartitis trifidis glabris, petalis integris, an-
tis glabri Lin. suppl. p. 306. L. V. p. 619.

Habitat in Cap. 6. p. 1.

incarnatum G. pedunculis paucifloris, foliis tripartitis ternatis ve
lobis trifidis fibratis caule furticuloso Hort. Kew
2. p. 415. L'Heretis Geran. Cust. B. mag. tab. 265

Caulis glaber.

folia semipellucida subrotunda reniformia lobis trifidis
tridentatis crispisulis ^{glabris} subtus nervis venis
petiolis folia 3-4plo longior. Pedunculi ^{oppositi} subsiformes
inflori. stipula lanceolata. lacinis calycis lanceolata petalis aequales
geranium incarnatum foliis incis. sublobis punctatis
paucis, petalis longissimis pedunculis inflori Cavan
Duf. pag 223. tab. 91. fig. 2.

Geranium

Trifolium ^{villosa v. hirsuta}
Erod. sp. *Dianculis multifloris*

geranium trifolium caule herbaceo crasso ramoso, foliis radicalibus
ternatis lobatis caulinis oppositis simplicibus lobatis, petalis vero
his, superioribus maculatis. Cavan. Desf. p. 227. tab. 97. fig. 3

Habitat in montosis Barbano 2

o Erodium *hymenodes* L. Heret. Geran. tab

caulis brevissimus ^{caput} potius radice crassitie digne squamis femi-
gineis imbricatis & cupis summate rami plures semel
vel bis bifidi villosi. folia petiolis breviora opposita
simplicia, tripartita vel ternata lobis inflexis dentatis
villosi. Petioli villosi v. hirsuti. Stipula ovata. Pedunculati
axillares folio longiore villosi v. hirsuti. Pedicelli 6.
pallidius filiformes. foliola calycis oblonga stria-
ta submucronata

reliqua vide in Adversaria

trilobatum (Erodium). foliis oppositis tripartitis lobis subrotundis serratis
umbellis multifloris

~~Erodium~~ trilobatum Jacq. coll. 4. p. 200

Habitat in Pap. b. p. 4

Tota planta hirsuta, viscida setidula et tomentosa. Caulis her-
baceus debilis erectus pilis ramosis bipedales inferne triquetri.
Folia opposita petiolata, tripartita lobis ex basi angustiore subro-
tundis obtusis, serratis una alterave incisura ciliis. Stipula ter-
na ovata acuta scanosa fuscescente. Pedunculi axillares alterni
foliis longioris. Involucrum foliola parva, ovata acuta hirsuta
parva patentissima. Pedicelli cincti setis hirsuti. Calycis
foliola lanceolata fenestrata hirsuta et latiora. Petala ovarium
pallida carnea venis purpureis. duo orbicula. macula purpurea
sub punctata. et glandula depresso. Jacq.

non ad:

~~Triangular~~ Ger. foliis triangularibus subpinnatifidis. D. dentatis sub
triangularibus villosis Torph. fl. arab. p. 123.

Habitat in montibus ad pyramides

Caulis plures diffusus spithamidi. Scolii pinnati
crasse pinnatifida lobis incisus serratis

Caulibus oppositis pedunculi axillares 6 flori
calycis incanis mutici

~~met~~
~~met~~

pulverulentum Erodum

Geranium pulverulentum caulebus rectis erectis foliis oppo-
sitis pennatifidis laciniis incis. pedunculis elongatis uni flori
Cavan. Desf. pag. 272. Tab. 125. fig. 1.

Habitat in Hispania. O

Caules teretes prostrati decumbentes, demum erecti. Folia ru-
bra alba copiosa, caulinea opposita petiolis breviora lacini-
is crenato-incis. stipula ovata. Pedunculi axillares
involucrum tetragynum. pedicelli subquinque fructiferi
annuato declinati. foliola calycis ovata, striata, aristata.

romanum G. foliis pennatis incisivi, scapo radicalibus Lin. Spec. pl. p. 951. f. 2
p. 1
Geranium ^{per m. ger. 30} foetidum Lob. illustr. 134. Monf. 2. p. 516. f. 5. t. 124.

fig. 27.

Geranium myrrinum Tenaxifolium, amplex flore purpureo
Barb. rar. u. t. 1245.

Habitat in Romae plateis &

Geranium romanum caule foliis bipennatis incisivi, scapo
radicalibus multifloris Cavan. Desf. pag. 225. Tab.

94. fig. 2

romanum Endium caule, scapo radicalibus multifloris, foliis
pennatis foliolis, pinnatis pedis Hort. Kew. 2. pag. 414
folia radicalia digitalia vel palmata frequentia. Ramo
alternis linear lanceolata acuta pilis raris substrigosis uti
petioli et scapi aspero, unguiculare. Stipula ovata
ciliata. Scapus foliis parvis longior. Pedicellis 5-6
capillares pollicares. Calycis lobi unari lanceolata
anastati. Corolla purpurea

petroem Erod

Geranium foetidum Kobel. Illustr. 134.

Geranium petroem creata folium Tournes. cap. 269. Magn.
nonf. 109.

Geranium petroem pedunculis multifloris, floribus pentandris
foliis bipinnatis, foliolis incis, scapis radi alibus
Gouan Illustr. 45. t. 21. fig. 1.

Geranium petroem subcaule, foliis oppositis, nervis
rubi bipinnatis, scapis axillaribus multifloris. Cavon

Erodium

Dos. pag. 224. tab. 96 fig. 2.

Habitat in gallica australi, Hispania Barbana &

Radix superne crassitie digiti intermedii squamosa. Folia
frequenter reticulata digitalia, vellosa uti tota planta

Cassiope
mulsana
cucullata

intercipite bipinnata foliolis pennatis, do. inaequalibus
incis fissis super erectis foliis dimidio longior. involucrium
polyphyllum foliolis ovatis. Calyx bipartitus antistatus lacin
scissatus nervosus. P. DuRoi 3-5

Supraeanum Erodium

reduncul. biflor.

prope petraea

L Herb. Germ. tab 2

non vid.

mairedemum Eradium

L. Herf. gerani: pag. tab. 1.

prope petraum

non vidi

Erodium
glandulosum *Geranium*

Geranium glandulosum acaule, foliis tripinnatis longissime petiolatis
petalis duobus latioribus maculatis plumosis. Cavan. Desf. pag
271. tab. 125 fig. 2.

Habitat in Hispania 2

Stem radicalis, prostrata, rugosa: pinnulae parvae. Sepala adnata
lacini lanceolati. Scapi erecti graciles 4 pollicares. involucri
foliola 8-9. pedicelli 400 pollicares, rari villosi. Calyx villosus foliolis
ovatis fissatis antratis. Corolla dilute violacea petala acuminata
petala duomajora. Cavan.

prope petraun

ubi ignotus

procox Erodium

Erodium procox abaulo foliis pennatis, scapis bifloris Cavan. d. p. 272 tab
126 p. 2
Habitat in Hispania ☉

Folia radicalia bipollicaria: pinnis incise. Scapi 4 pollicares 1-2 flori
Calycis foliola ovata, acutata. Corolla lacinata violacea. Cavan.
valde affini curutatio.

non vidi

alpinum γ foliis pennatis pennatifidis lacinus incisus umbella sub
quinqueflora

Producei Geranium alpinum L. Hort. Geran. tab 3.

Geranium alpinum caule rubescente, foliis bipinnatis, floribus
umbellatis rubescentibus inops. Bar. Nat. p. 227. sub. 96. fig 1.

Habitat in alpinis γ

Caulis glaber purpurascens; folia petiolata, radice alia
frequentia pedalia: caulina ^{caule altera} opposita altera breviora
sub lancea ^{caule altera}. lacinis lineares, subvillosae.

Stipula lanceolata attenuata membranacea fulgore
hyalina semiglossa. Petiolis raris villosis. Pedunculi
axillares ^{peristylis} longitudinalibus foliorum radice lumen subvillosi
involucrum amara pentaphylla lanceolata, pedicelli
3-5 villosi pollicari foliola calycis lanceolata nervosa
villosa aurata. Capsula villosa

geranium alpinum coriandri folium longius radice
flore purpureo majori

geranium pedunculi multiflori, calycibus pentaphyllis
floribus pentadactylis, foliis incis et crenatis radice
tuberosa Burm. ger. no 31

crassifolium G. umbellis multifloris, foliis pennatifido - laciniatis
crassi: laciniis linearibus Hort. Kew. 2. p. 414.
Habitat in Insula Cypri 4

Endium

melis cypriota

Geranium
hirtum ^{Geranium} pedunculis multifloris floribus pentandris, foliis subbipinnatifidis
caule ramofo

Geranium hirtum; pedunculis multifloris; calyce pentaphyllo; floribus pentandris
foliis petiolatis triangularibus, bipinnatifidis hirsutis Boiss. de apr. pag. 123.

Folia Geranii carnosifolia, hirta uti caulis: Latinis autem infolia

Involucra scariosa, ovata. Floris plenis

Floris plenis que scariosa, ovata.

Calycis striatus, villofus; folioli muconatis.

Petalis basi nigricantibus.

Habitat

cicutarium G. floribus pentadoni, foliis pennatis incisè obtusè caule
ramoso Lin. S. V. Burm. Ger. 33. pl. D.

Geranium superuum Dod. pempt. 63.

Geranium cicuta folio, minus et superuum Bauh. pen
319.

Habitat in Europa sennabui cultis O

geran: cicutanum, caule ramoso prostrato, foliis pennatis
pinnatis subovatis Caran. des. pag. 226. tab. 93. fig. 1.

cicutanum ~~Geranium~~ ^{Erodium} pedunculis multifloris, foliis pennatis: folio
lis sesquialteris pennatisfidis H. New. 2. p. 414

Caules prostrati villosi. Folia radicalia frequentia
subullosa pinnatis alternis, interdum oppositis oblongis
incisè. foliola calycis ovata ^{micronata} petala purpurea calycis
vix longiora

moschatum f. foliis pennatis incisè obtusi caule ramoso. cotyledonibus
pennatifidis L. V. Gaigu. hort. 4. 55. Burm ger.

24.

geranium cicuto folio, moschatum Bauh. pin. 319.

Habitat in Barbana, Oriente O in Bonana Comneson

Caules plures procumbentes semipedales pubescentes,
ubi tota planta. Folia longe petiolata ^{remota} ~~remota~~
pennata cum impari foliolo alterna, remota, extra
confluentia ovato-oblonga serrato subtrifida. Stipula
oblonga. Pedunculi axillares folio longiores. Pedi-
celli 6. unguiculares. foliolo calycis oblonga mucro-
nata. Petala purpurea calycis sex longiora. Capsula
tomentosa

Geranium moschatum caule procumbente foliis pennatis
pinnulis ovatis incisè, cotyledonibus pennatifidis
dis floribus umbellatis Casan. Disp. pag 229
tab 94. fig. 1

Moschatum End. pedunculis multifloris, foliis pennatis foliolo
subpetiolatis inaequaliter incisè H. Kew. 2
pag. 414

bipinnatum Erodium

Genus Aethiopicum

Boeckl. A.

Geranium bipinnatum caule decumbente foliis oppositis inaequalibus
bipinnatis: pedunculi biflori Casan. Desf. pag. 273. tab. 126. fig. 3.

Habitat in arenosis Barbano &

Caules prostrati, glabri, breves. Folia opposita inaequalia basi ovata
angustis brevibus. Stipulae ovatae. Pedunculi axillares longitudo
aeque foliorum. Pedicelli semipollicares. Floscula calycis ovata
strata, anastata. Casan.

novi.

multifidum Erodium. foliis pennatis pinnis bipinnatis ^{lineantibus} fidis caule ^{prosum} prosum
bente villosa ^{subrosi} subrosi

Habitat in arenis maritimis Barbaro ^{fructu} fructu

Caules plures, pedales et ultra ^{prosum bentes} prosum bentes ^{Veretes ramosi} Veretes ramosi

Folia petiolata ^{remota supra} opposita ^{superiora subseriata} laciniis lineantibus angustis acutis

Stipula lanceolata. Pedunculi axillares ^{pedicelli} folios longioribus

is. laciniis calycis lanceolato villosa ⁶⁻⁷ villosa 6-7

foetum subulatum & pollicare.

geranium *G. pedunculati submultiflori, floribus pentadymis, foliis
ternatis lobatis. L. V. Burm. ger. 32.*

Geranium latifolium aeu *Longispina* *Burm. pin. 319*

Geranium pulchrum annuum, Longispinis rostris, creticum
Burm. herb. 3. p. 479

Habitat in Creta O

Geranium geranium caule crasso herbaceo erecto piloso: foliis ra-
dialibus cordatis ovatis incisis caulibus oppositis
subternatis media longispina floribus pentadymis spici-
forme ternis *Caran. Desf. pag 217. tab. 88. fig. 2.*

Geranium *Erodium pedunculati submultiflori, foliis ternatis*
venato dentatis; extremo pennatifido lobato H. Kew
2. p. 415

Caules crassi pilosi ramosi ad nodos in raras partes.
Folia radiale longe petiolata cordato-ovata venato
caulina opposita glabra vix armata ^{is sum} villosa alle-
niata. Stipula lanceolata. Pedunculi axilla-
res et terminales biflori vel multiflori involucri
hibulata foliola calycis oblonga nervosa magna
liunosa, anstata. Corolla violacea Petala intijro
rostris capsularum longispino capsula pilosa.

Cicouneum G. foliis pennatifidis obtusis Amicad. 4. Faug. hort. Tab. 10
Collect. 1. p. 310 Burm. Ger. 2 20

Geranium cicutifolium, acu longissima Bauh. prodr. 130. pin
139.

Habitat Mospelii inque Valleja, Italia Barbaria O.

Geranium cicouneum caule herbaso rectinato, foliis
pennatis pennuli crispis, petalis duobus sepe non
bus latioribus Cavan. Diss. pag. 220. Tab. 95. fig. 2

Caules uti pedunculi et petioli heri. Folia radica
lia copiosa longissime petiolata pennata pinnu
lis alternis majoribus. Stipula lanceolata atte
nuata. Involucella oblonga scariosa anstata
pedicelli 4-7. pollicares villosi. foliola calycis
nervosa anstata lanceolata. Corolla dilute
coerulea.

Cicouneum G. caud. pedunculis multifloris bifloris, foliis inter
rupte bipennatifidis laciniatis, caule strigoso
Hort. kew. 2. p. 415

Geran. botrys Cavan. 90 fig. 2. Pin. ind. hort. kew
pupis varietas