

Ervum

1. Lens L. pedunculis subbifloris, seminibus compressis corvetti
2. Tetraspermum L. pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis
3. Lupinum L. pedunculis multifloris, seminibus globosis binis
4. Plouicense L. pedunculis subbifloris anstatis, petiolis acuminatis, foliis obtusis
5. monanthus L. pedunculis unifloris
6. Ervum L. germinibus undato-plicatis: foliis impari pennatis

Erorium Tenuespinum pedunculis filiformibus subuni flori calycibus brevissimis, divi-
vhis simplicibus Marsch. in Schr. Jour n. 7. bot. 1. 6. pag 463

Habitat in gramineis Caucasi. ©

Et Tetraspermo primum

volubile E. pedunculis multifloris floribus geminatis, caule
volubili Walt. fl. Car. p. 187.
Habitat in Carolina

non vidi

erectum E pedunculis bifloris, caule erecto subdichotomo
Walt. fl. carol. p. 107.
Habitat in Carolina.

Lens E. pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis Len. p. V
fl. Dan. Tab. 95.

Lens Dod. pempt. 526.

Lens vulgaris Bauh. pin. 346.

Habitat inter gallas pyretes ³

Caulis angulosus. Folia ^{corotho terminata} 10 panum. ^{foliola} cristata altera linearis canicula
ta mucronata. Pedunculi capillares longitudine foliorum
1-2 flori superne anastati lacina calycis tubulato. Legumen
reniforme longitudine et latitudine aequale. Semen
1.

monanthos E. pedunculi uniflori L.V.

Less monanthos Herm Leydb. 560

Vicia pedunculi uniflori, folioli integerrimis, stipulis
alternis dentatis Hort. Ups. 2197

Habitat in Asia rethenea O

Caules vix diffusi, 4 anguli. Codiola obtuse oblate emarginata
complicata 6-7 panum alterna glabra. Stipula altera
linearis integra altera palmata lacinis 8-9que capillantes
Pedunculi axillares solitarii quadranguli anastati legum
en. compressi vix diffusi, glabrum inter brachia depressum

Tetra sperrmum L. pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis.

Len. Spec. pl. p. 10397

Siccia segetum, singularibus siliquis glabris Bauh. pin. 345.

Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris Morf. herb.
2. p. 64. f. 2. 4. fig. 16.

Habitat inter Europa segetes ☉

Caulis subtetragonus aequalis. folia folioli septem 10, clemmque
alternis. Ped. unicus capellari 1-2 floris. flori minutus
sape sanguineus. Legumen ovali oblongum laeve

hirsutum L. pedunculis multifloris, seminebris globosis tenuis Lin. S. V
fl. Dan. tab. 639.

Cracca minor Tabern. ii. 507.

Vicia segetum cum pleguis plurimis hirsutis Bauh. pin 345

Habitat in Europa agri oriente. ☉

Pedunculi 4-6 flori. flores parvi albi foliola et calycis villosi

Ervillea *E. geminibus undato-pleiatis*: foliis impari pennatis Lin h. V.

Eruc. Cam. epix. 215

Orobis siliquis articulatis, flore majore Bauh. pin 347.

Habitat in Gallia, Italia, Oriente ☉

Caulis angulatus, foliola linearia obtusissima basi acuta
glabra inferiora alterna superiora opposita pedunculata axil-
lari 1-5-5 flori glabri lineari tonulosi

Solonense E. pedunculis subbifloris angustis, petalis acuminatis, foliis
obtusis hem. Am. acad 4. p. 327.

Vicia proco~~er~~ verna minima, solonensis, femine hexaedro Monj
bles. 321. hist. 2. p. 63.

Habitat in Anglia, Paris, Montpelii ☉

Planta pusilla ramosa rami filiformibus. foliata 4 jugis foliola
narrow retusa cum mucrona. pedunculi longitudine foliorum
1-2 flori petali interdum in mucronem dependentes sive
in circho simpliciter vel diversis

Synonymum Magnol. a nonnullis huc relatum pertinet ad Viciam Cathartidem