

Erijsimum

1. officinale E. foliis fruis adpressis, foliis mucronatis.
2. barbara E. foliis radicalibus lyratis extimo subrotundo, caulinis oblongis
obtusè dentatis
3. alleiana E. foliis cordatis dentatis
4. repandum E. foliis lanceolatis dentatis, radicibus oppositis foliis plicatis
sub sessilibus.
5. Cheiranthoides E. foliis lanceolatis obtusè dentatis integerrimisque, fr:
quis natalis
6. hemic folium E. foliis lanceolatis serratis
7. bicorne E. foliis lanceolatis peltatis, siquis apice bicornibus
- ~~8. montanum E. foliis lanceolatis integerrimis, siquis rariis
peltatis~~

precocis L. foliis inferioribus lyratis: superioribus pennatifidis: laciniis linearibus oblongis integerrimis Smith fl. Angl. 2. pag. 707.

Sisymbrium Lucea folio glabro, minus et precocius Tournef. inst. 226.

Early Winter Cress Pet. Fl. Brit. tab. 46. fig. 2.

Habitat in herbis irriguis vel ad fossas

Differt a Sisymb. barbarea foliis superioribus pennatifidis, laciniis oppositis, linearibus oblongis, integerrimis; floribus pallidioribus; folioli caliginis latioribus; siliquis vix longioribus. Smith

Lipymbrosp Erythronium
Linn

Bursa pastoris orientalis cardaminis folio filiqua Conyssonia quadrangula Tour-
nef. Por.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Cauli simplex, erectus, pedalis et ultra, terquetis, angulis glabris, interdum ramos
uno alterove. Folia sesipia, pollicana, pennata: foliola sesipia, inferiora
sesipia alterna, subrotunda, terminale majus, dentatum, superiora linearia
minora, glabra, crassiuscula, inferius in dilatatum cordatum subro-
tundum, integerrimum. Flores parvi. Siliqua subsessilis.

hieracifolium C. foliis lanceolatis serratis Len. S. V.

Faerqu. fl. austr. t. 8. 73.

Pseudopus luteus Sylvester *hieracifolium* Baiche prod. r. 102. pin

201.
Habitat in Gallia p. 24

Siliqua apice in duobus nodis quasi divisa.

Folia remote denticulata subrepanda sinu ciliis rotatis. Pedicelli
et pleura erecti. Stigma saepe obtusum emarginatum. Flores
puresci, duplo majores quam in *Chersanthoda*

non vido

Repp. 517 nota a

Cheiranthoides E. foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patentibus. Lin.
Spec. pl. p. 923. Jacq. fl. austr. t. 23. pl. Dant. 731.

Camelina myagnim alterum Th. Caspi officina Lob. ii. 225.

Myagnim siliqua Conza Bauh. pin. 107.

Haec bitatarbique in Europa asi.

Caulis erectus simpliciter vel subramosus teres pubescens
stratus. Colicis basi attenuata denticulo uno altero
obtusiorae plerumque integerrima siliquis pollicaria.
Stigmata vix divisa. Siliquis patentioribus quam in *Chei*
ranto crispinodes.
reticuli patentibus Pediculis siliquis erectis acuta, absque vestigio
stigmatis herb. Royan.

repandum E. foliis lanceolatis dentatis, racemis oppositifoliis, flexuosis
ramosis subsessilibus, corollis minutis Am. ac. d. ^{Gaier fl. austr.}
4. 22. ²⁴⁴⁵⁷

Habitat in Bohemia et Hispania arvis O

Caulis erectus ramosus striatus et pilis adpressis pubescentibus
foliis radicalibus repando dentatis, caulibus lanceolatis
basi attenuatis, remote dentatis vixi canescentibus prostratis
na. ^{proxi sulphurei.} Iniquis subpetiolatis patentibus
nigra

Hesperis erythra lutea folio dentato argente Boeck-huyd
hab. Turf

officinale *E. piliquis spicis depressis, foliis runcinatis* L. V. fe. San
1. 560

~~*Emilia lutea latifolia* f. *Barbara* Bauh. pin. 90.~~

~~*B. Symbrium, emilia foliis glabris, minus et procerius* Tournef. 7. 6.~~

~~41. 226~~

~~Habitat in Europa 4~~

Verbena mar Tuck. phot. 592.

Enysimum vulgare Bauh. pin. 100.

Habitat in Europa nederatis 0

Caulis erectus sesquipedalis pilosus striatus superne rami aliquot
axillares breves. Folia, uti pet. solo pilosa, laciniis dentata
folia suprema pinnata indivisa: Aliqua breves.

Barbarea E. foliis lyratis extrema subrotundo Lin. l. V.

Cnicus lutea latifolia / Barbarea Bauh. pin. 9. 8.

Ps. Silybrium, cnicus folio glabro, minor et procerius Tournef. 4.

Pr. 4. p. 226.

Habitat in Europa 4

Caulis erectus sulcato angulatus, glaber uti. tota planta superne in ramos floriferos divisis. Folia radicalia petiolata laciniis extrema subrotunda dentata. Caulina semiamplexicaulis oblonga, indivisa, basi sagittata postquam anthera obtusa inaequaliter obtuse dentata. Siliqua brevis sine pedicellata, siliiformis erecta

radicalibus

caulinis oblongis integris

obtusè dentatis

alliana E. foliis cordatis L.V

fl. Dan 7.

Alliana Lam epit 509. Bauh. pin. 110.

Habitat in Europa septentrionali, cultis umbratiis & s. r

caulis erectus, simplex striatus. folia petiolata dentata
glabra dentibus obtusiusculis. si liquet bipollicari

polyacanthum L. foliis repando-dentatis, si legis pilos per se
natis Pall. A. 3. p. 741. T. Mm. fig. 1. cornutum

Habitat in Sibiriä

non vidi

hybridum

8
E. foliis lanceolatis denticulatis glaberrimis, plicis
calycis triplo longioribus superne incrassatis Weber Suppl.
fl. holl. pag 9.

Habitat in Colchata

Mut. cyrota

bicornis E. foliis lanceolatis pilosis, plicis apice bicornibus Hort. Kew.

hew. 2. p. 394 +

Habitat in Canariis ☉

Floris parvi flavi. Calyx flavescens extus pilosus. Ligula
approximata, adpressa, ex alicubi tetragona, pilosa
tri vel quadrilobata. Stylus pedicellari capillari longi
tudine corneum. Stigma capitatum integrum. H. Kew

non vidi

pinnatum foliis subsessilibus pinnatis: pinnis pinnatifidis.
Walt. fl. Carol. p. 174
Habitat in Carolina

non vidi