

# Erythrina

1. herbacea E. foliis ternatis, caulibus simplicibus mi fruticoso annuis.
2. carnea E. foliis ternatis glabris, caule arboreo aculeato, calycibus campanulatis  
truncatis.
3. corallo dendron E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calycibus truncatis  
tri quinque dentatis.
4. pecta E. foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeatis.
5. in pta galli E. foliis ternatis: petioliis subtaculeatis glandulosis; caule arboreo  
inermi.
6. planifolia E. foliis simplicibus oblongis.

latifolia Erythrona foliolis ovato oblongis petiolis subaculeatis

Habitat in Guinea Thonning 3

Rami crassitie penna cygneo. Aculei solitarii subpetiolis. Folium  
ternato: foliola petiolata, palmata, obtusa, subvenosa, glabra. Petio-  
lus angulatus ad insertionem foliolorum uti et in petioli partibus ad basin  
glandula utraque parva perforata, uno alterove aculeo adpressi.  
Racemi axillares; pedunculus laxis tomentosus, semipedales. Flores  
laxi inferiores remotiores, supremi compacti. Bractea caduca subulata  
fla bordice flavescanti tomentosi uti calycis.

velutina *Erythrina* foliis ternatis inermibus pubescentibus, caule  
arbores aculeato. Willden. l. c.

habitat in Valle Aragua prope Caracas.

Arbor aculeata. Folia alterna inermia longe petiolata  
ternata, foliolis cordato-triangularibus obtusis inermibus  
~~inermibus~~ in legeris tomentosis. Petiolo terminato  
biglanduloso, lateribus uniglandulosis, glandulis minimis  
oblongis obtusis. Flores rosei racemosi, racemis  
simplicibus, pedicellis ternis. Legumina longa oglin,  
dracea loculosa tomentosa. Semina oblonga terebinthina  
rubra.

glauca ~~Erythrina~~ foliis ternatis inermibus subtus glaucis  
petiolo subinermibus caule arboreo aculeato  
habitat. Caracas. Willden. t. c.

Arbor aculeata. folia alterna ternata, foliolis  
ovatis glabris subtus glaucis, medio majore. Petioli  
varis sine aculeati; terminali biglanduloso, lateralibus  
uniglandulosis. Flores crocei racemosi; racemis sub  
biatis. Vexillum maximum subunciforme patens pallide  
croceum. Ala triplo brevior. late obtusa concave  
pallide, apice crocea. Larina alis longior ventriora  
obtusata. Stamina decem inaequalia basi connata  
asymmetrica viridia carina longiora. Legumina longa  
serotina torulosa glabra. Semina oblonga serotina  
cinerea lineis atris compressa.

Erythrina

Commeron Rio Janeiro Herb. Mus.

Foliola Laurina. Glandula nulla in petiolo. Intra + inermis. Racemi  
axillaribus, longitudine petioli. Pedicelli 3.

*Erythrina*

Habitat ad Senegal. Herb. Mus.

Rami teretes, crassitie, pennis anfernis; aculei sparsi, subrecti, apice nigri. Folia petiolata, ternata: foliola petiolata, oblonga, bipolluciana, lateralia parva minora, utrinque obtusa, venoso-subreticulata. Petioli raris aculeati villosuli, interdum aculeosus vel alter subtus in costa. Racemi axillares. Pedunculus palmatis. Flores frequentes. Calyx truncatus, altero latere oblique super villosulus. Corolla polli-

cani

an carnea?

obtusifolia Erythrina folio ternatis oblongis, caule foliolisque subtus aculeatis  
Habitat in Senegal Herb. Martii 7

Rami glabri, crassitie pennae aegyptiacae, apice subtomentosi. Aculei sparsi, pauci, com-  
pressi, recurvi, flavescens, apice fissi. Siliola petiolata, tripollicaris, obtu-  
sissima, utrinque glabra, venosa, subtus subreticulata, aculeus unus vel al-  
ter in costa. Petioli fissi. Pedunculi axillares vel terminales, fuit hamis,  
aculeati. Flores superne, penduli. Calycis subvillosi, ore oblique truncato.  
Corolla pollicaris

Confer cum Erythr. ex Bruceo Traversi, et folio in Descripta obtusifolia

aquatica Erythrina

Habitat

Foliolis oblongis, glabris. Petioli subtus aculeati. Stipula ternata. Petioli  
~~petioli laterales~~ ~~com paucis apice et intermediis petiolorum~~ ~~superne~~  
biglandulosi  
an ab Eryth. crota galli diversa.

isometala Erythrina. foliolo crato lanceolatis glabris, petiolis glandulosis

Prid. Jacquin Commens. ex herb. Friesii 5

Inermis. Caulis volubilis, glaber. foliola venosa, glabra, subtus palli-  
diori, parum acuminata, obtusiuscula, mucronata, bipollicaria. Glandu-  
la nulla nec in petiolo universatim nec in alibus. Petioli filiformes  
pollicares. Pedunculi axillares bi- tri-pollicares, rigidi, crassitie ramo-  
rum, glabri. Pedicelli, <sup>sporici</sup> saepe 2-3 ex eodem puncto, ope lentis pubescentes,  
ubi pedunculis superne et calycis pubescentes. Bractea crassa, et ad  
basin pedicellorum et duo sub calyce, parva decidua. Calyx ungui-  
cularis; lobis rotundatis. Corolla sesquipollicaris; unguis albam et  
caninam calycis longiores.

aquatica L

Habitat herb. usq.

Petiole, uti costa subter ac uleo uno alterove, recurvo, compresso. Sotiolab  
Lanq, petiolata, bipollicaria, parum acuminata, venosa, glabra. Stylula duo  
lanceolata. Petiolus partialis intermedium aqua crispus, articulatione  
glandula duo ad articulum. Flores decussati

anqua

refoni Adura Gus. / gener. plant. pag. 363.

*Geoffroya nemis*

non vidi

1. *Herbacea* E. foliis ternatis caulibus simplicissimis fruticoso annuis L. V.

Lin. Mart. 430.

*Corallo dendron humile*, spica florum longissima, radice crassissima

Cat. Car. 49. & 49.

*Coral carolinense*, hastato folio Dell. Elth. 107. t. 90. fig. 106.

Habitat in Carolina, Missipi &

Caulis teres <sup>sternatus</sup> folia rhombica triangularia obtusa, petiolata  
terminale majus bi- & tripollicaria, venosa, membranacea  
glandula duo ad folia. Petiolus spithameus. Racemus  
terminalis palmari. Pedicelli 3. 2. 1. sparsi Calycis campanu-  
latis obscure dentatis dentibus obtusi. Corolla bipollicia-  
ria

Caulis teres, glaber. Aculei compressi, recurvi. Ciliola subtulata  
tubo intermedio ovato lanceolato attenuato: laterales recti rotundati  
hastati

2 *carnea* *E. foliis ternatis glabris, caule arboreo aculeato, calycibus  
campanulatis truncatis Hort. kew. 3. p. 8*  
*Erythrona americana* Mill. Dict.

Habitat ad Vera Crucem  
*Ceratia* s. *plequea sylvestris spinosa arbor india Bauh. pin.  
402.*

*Corall arbor americana Com. hort. 1. p. 211. t. 100*  
Tota glabra. Rami teretes cicatricati. Toleola ovata terminata  
reliqui duplo vel triplo major. Tubercula duo inter folia  
lateralia et duo ad apicem infra terminale. Pedunculis spith  
novi. Flores sparsi racemosi 1. 2. 3. ex eodem puncto penduli  
tripolliciares

3 corallo dendron E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato. Lin.  
calycibus truncatis quadrifloratis Hort. Kew. 3. p. 8  
Spei. pl. p. 992\*

Erythronia arborea spinosa et non spinosa, foliis rhombicis ternatis Brown  
fam. 200

~~occidentalis Peruvia f. filiqua sylvestris spinosa arbor indiae Gaertn. per 402.~~

~~Coral arbor americana Com hort. l. p. 211. t. 100.~~

~~orientalis f. Merenore Rheed. mol. 6. p. 15. t. 7.~~

Gelala littorea Rumph. amb. 2. p. 230. t. 76.

Habitat in India. 5

Erythronia corallo dendron foliis ternatis inermibus, caule arboreo  
aculeato Lin. Spei. pl. pag. 992\*

Coral arbor Cuzco

Corallo dendron triphyllum americanum spinosum flore ruberrimo  
Tournef. Cor.

4 pecta *Erythrona foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato* Lin. Spec. pl. pag. 993 \*

L. V. pag. 642

*Gelata alba* Rumph. Amb. 2. p. 234. T. 77.

Habitat in India

Differet a *Coallo dendron foliolis alba* rochi costisque et aculeis minoribus in utraque pagina, cum illius foliola viridia et nervia sint. Illi glandulosi ad basin folioli in parte, huius vero nulla. Ceterum utriusque caulis et petioli aculeati haec spec. l. c.

5 *Erythra galli Erythra foliis ternatis*: petiolis subaculeatis glandulosis caule arboreo inermi  
Mart. 99. S. V. pag. 642.

*Erythrina laurifolia* Jacq. off. 3. p. 1. v. 51.

Corol arbor non spinosa trifolia Pet. Mus. 16. Plai. vend. r. 109

Habitat in Brasilia &

Arbor caudice inermi. Rami striati. Folioles ovato-oblongas integerrimas. Petiolis  
elongatis, subtus aculeo saepe uno alterove recurvo; in hoc petiolo ad pedicel-  
lorum exitum utrinque glandula, ut et glandulae hinc in medio pedicelli inter  
medii. Flores 2-3 axillares, purpurei, pedunculis propriis, reflexis. Calyx  
campanulatus; labio inferiore mucronatus. Vexillum ovato-cordatum,  
reflexum emarginatum. Alae minime subovatae, calycis breviores.  
Carina striata, subfoliata, acuta, compressa, longitudine fere rest illi.  
Stamina diadelphica; interna 9 fere toto coalita, longitudine carinae.  
Anthera oblonga. Germen oblongum villosum. Stylus subulatus. Sty-  
ma puncto minuto. Lin. M. l. c.

petiolis glandulosis

6 planifolium *Erythrina* foliis simplicibus oblongis Lin. S. V. pag. 642  
*Corallodendron* foliis jugulari oblongo, foliis plana Plum. frui. 21. Pl. 102.  
fig. 1.  
Habitat in America