

Eucalyptus

Calyx superior persistens truncatus ante anthesin tectus operculo
in aegymis deciduo. Cor. 0. Caps. 4 locularis apice dehis-
cens polysperma

rostratus. Euclyptus folus ovato-lanceolati attenuati nitidi
calyptra rostrata Curv. fi. vol. 4. pag 23. tab 342
Habitat in nova Hollandia 5.

Capitella Smith potius forte robusta

Corymbosus Eucalyptus foliis lanceolatis, petiolis subulatis, flori-
bus corymbosis. Cavon. &c. p. vol. 4. pag. 23. Tab. 240
Habitat in nova Hollandia

Corymbosa Smid

platypodos. Eucalypti folis alternis canicolato subfoliatis umbel-
li foliatis, pedunculo communi plant. Cavan. Ic. vol.

x. pag. 23. tab. 341.

an metopidew foliifolia Gortn.

Habitat in nova hollandia. 5

botanydes Smith.

folia foliis Eucalyptus foliis lanceolatis nervis altero latere
angustioribus ~~et~~ ~~que~~ ~~longioribus~~ brevioribus Caron. 90. pag.

24.

Habitat in Nova Hollandia

non id.

Procemopus Eucalyptus foliis lanceolatis acuminatis, umbellis ra-
cemosis Cavan. ii. vol. 4. pag. 24.
Habitat in nova Hollandia &

non vidi.

robusta Euc: operiulo concavo medio confixato, calycis lobis
imbellis lateralibus terminalibusque, foliis ovatis
Smith-herb. trans 283
Eucalyptus robusta Bot. of New. Holland 408. 13
Habitat in nova Hollandia

piculularis L. operculo conico medio instructo longitudine calycis, um-
bellis lateralibus, fructu globofo, foliis linear lanceolatis
Smith. An. Trans. 3. p. 284
Habitu

non vid:

Tecticornis E. operculo concavo. Tecti. levissimis membranaceo palyce latere
triploque longiore, umbellis lateralibus solitariis. Smith. L. Trans: 3

p. 204

Eucalypt. Tecticornis Bot. of New-H. 41.

Habitat

non vidi

resinifera E opericulo conico Testi coriaceo calyce duplo longiori
umbellis lateralibus solitariis Smith - Gen. Trans. 3. p. 204.
Eucalyptus resinifera White. Voyage. 231. tab.
Metrosideros gummosa Gaertn. Sem. 1. 170. t. 34. fig. 1.
Habitat.

non vidi

capitellata E. openulo conico obtusifido calycisq[ue] angulato suban
cipiti, capitulis lateralibus solitariis, fructu globoso, foliis
ovato-lanceolatis

E. capitellata Bot of New Holl. 42.

Fruct White's Voyag. 226 Tab. fig. a

Habitat

non vidi

Saligna E. operculo conico acuto calycis anguloso suban-
cipiti, capitulis lateralibus solitariis, fructu triloculato
foliis linearibus lanceolatis Smith. Lin. Trans. 3. p.
205.

Habitat

nonnd.

Botryodes E. operculo subnatis, capitulis lateralibus foliatis, pedun-
culis cuneatis compressis, fructu tuberculato Smith. h. Trans.
3. p. 206.
Habitat.

no 2 v. di

homoptera. E. operculo depresso micronulato, umbellis lateralibus
terminalibusque & pedunculis compressis, ramulis angulatis
fructu subgloboso Smith. L. Trans. 3. p. 286.
Habitat

non vid.

pepenta E. operculo mucronato, umbellis lateralibus subpanicula-
tis solitariisve: pedunculis compressis, ramulis angulatis Smith
Lin. Transact. 3. p. 286.

Habitat

Eucalyptus pepenta White's Voyag. 226. tab.
New Holland. 42.

Bot. of.

Habitat

non vid.

Conybofea E. operculo microtubulato, calycis 5-lobi, umbellae cony-
bofea paniculatae Vermenalebus Smith bot. of New Holl. L-Tr.
3. p. 287.

Eucalyptus conybofea bot. of New Holl. 42.

Habitat

non vid.

paniculata E. operculo subnatiso, calyce anguloso, umbellis
subpaniculatis terminalibus. Smith L. Trans. 3.
p. 207.
Habitat

non vid.