

Euclea

1. racemosa L. foliis oblongis alternis planis, racemis foliis longioribus
2. undulata L. foliis obovatis alternis oppositisque undulatis, racemis foliis brevioribus

herbacea lutea floribus lateralibus, caule herbaceo Lour. fl. Coch. pag
629.

Habitat in Cochinchina

Caulis pedalis, erectus ramosus. Flores laterales.

non vid.

foemina non vid. in hoc spec. n. in re. melo. an
id. eorum super Genes. 1.

pelosa Cuscuta caule arbores, foliis ovato-lanceolatis ^{hirsutis} foveatis, floribus
micropis pelosi Lour. - fl. Coch. p. 624.

Habitat in Cochinchina.

Arbor magna. Folia integerrima, alterna, breviter petiolata. Racemi
terminalis. Cal. 5 partibus Cor. 5 partibus laciniis crispis pelosis

Salsola folia Lutea

Habitat in Cap. b. frei Lesb. Moysenii 5

Tota glabra. Rami oppositi. folia opposita, lanceolata, obtusa, in tegmina,
senosa, pollicaria et ultra. Racemi axillares, folios breviores, quinqueflori

2 undulata E. foliis obovatis ^{magna} undulatis, racemis foliis breviori
bri

Habitat ad Cap. b. Speitz

Rami teretes sparsi interdum subverticillati ramuloso
Ramuli subcompressi. Folia subpetiolata basi attenuata
alterna vel opposita pollicaria obtusa ^{retuse} emissa
marginibus ^{vix} ⁱⁿ ^{marginibus} ³ ^{glabris}, ^{subtus} ⁴ ^{venosa} supra ^{venosa}. Racemi
axillares 6. 7. flori uti tota planta glabri

1 racemosa Euclea Lin. f. V. p. 13. pag. 747. Suppl. pag. 420

Padus foliis subrotundis, fructu racemoso
Burm afr. 4. Pl. fig. 2.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami teretes et caepe foliorum circuli tuberculati glabri
Rami compressi pappuli. Folia frequentia alterna petiolata
oblonga obtusa glabra, subinaequa subvenosa integerrima
margine parum crispata pollicaria rigida. Racemi axi-
lares. Pedicelli pauci cunctis 10 uniflori

alternis
foliis oblongis margine subinaequis planis, racemis folio
conjugatis