

Leuomis

nana Euc: siapo clavato foliis lato lanceolatis acutis L<sup>Handker</sup>  
<sup>lit. angl.</sup>  
Orthisea capensis Tulipio flore roseo Pet. gar. 7. Ps. pag. 6

Entelana nana racemo corymbo, foliis bifariis amplexi-  
caulibus lanceolatis Lin. Mant. alt. p. 223. Burn.  
prodr. 9.

Habitat in C. b. spec. 7

Orthisyalum nanum Thunb. prodr. pag. 62



bifolia *Eucomis* scapo clavato, foliis geminis lanceolato-ovatis acutis

*Eucomis bifolia* Guss. coll. 4 p. 215. Gc. var. Tab 449

Habitat ad Cap. b. p. 21

Folia radicalia 2. basi vaginantis, lanceolato-ovata, acuta integerrima glabra  
carnosula, longitudinaliter obscure ~~lineata~~ utrinque punctulata subtus  
pallide viridia 7 pollicaria, pollicis 3 lata. Scapus erectus semipedalis  
breviter ovato acuminatus, pollicatus. Flores racemosi corolla  
pallide viridi Guss.

regia E. Scopis cylindrico, foliis linguiformibus obtusis humi

Ad pres. H. Kew. 1. p. 433

Corona regalis, liliifolio crenato Gell. Elth. No. 1. 93.

Antillano regia racemo comoso inferne nudo, foliis  
crenatis Lin. Spec. pl. pag. 435

Habitata Cap. 6 spec. 4



punctata Euc. scapo cylindrico foliis oblongo-lanceolatis lan-  
ceulatis patentibus, comae foliis brevibus, racemis longis  
H. Kew. 1. p. 43.  
Aphrodellus comosus Hortuyn nat. hist. 12.  
Euc. omis punctata

L Heretier bot. ang. tab. 10

Habitata Cap. b. p. i.

Ornithogalum punctatum Thuab. prodr. pag 62

undulata E. caps. cylindrica, foliis ovato-oblongis undulatis  
patentibus, como foliis longitudine fere raiemi

Habitat in cap. b. per 2

ornithogalum undulatum Thunb. prod. p. 62

non vid.



*Tizyphus*