

Eugenia

Eugenia

Rohri ~~Myrti~~ Folis oblongis acuminatis obtuse, racemis axillaribus decem-
natis calycibus glabris

Habitat in Capenna Et insula St. Crucis v. Rohr

Rami vix glabri, cortice cinereo duro, elongate superne
obtusae tetragoni. Ramuli oppositi purpurascetes p. subpunctatis
et vix alternatim compressi op. lenti nullo rarisimo adpressi

membranae
supra laeva
Folia breviter petiolata, ut sic pollicana basi acuta, glaber
rima, venosa, utraque oculis armata puncta subhis pallida
vndia. Racemi axillares folio duplo longiores pedunculati et rami
purpurascetes glabri. ramuli filiformes patenter pedicellati uni
flori.

Eugenia esse speciem aspererat Dr. V. Rohr qui veram
examinavit

ut fere varietas
similis Myrti splendens Sw. quo et Eugenia sci. Tangu
ambo vixtus sub uno genere coniungenda

non

monostachyos? Culmo Inquetro nudo, spica simplici ovata terminali: squamis
mucronatis Len. mant. 100 t. V. p. 96.

Cyperus culmi setaceis Inquetris subnatis; spica simpliciter ter-
minale, ovata; squamis infimis longius mucronatis Roth-
gram pag. 10. Tab. 13. fig. 3.

Habitat in Tades

Culmi plures palmari vel semipedales, ^{caxi} setacei, glabri.
Folia ^{gladiis - vincta} setacea Culmo dimidio brevior. Capit. Spica Termi-
nalis solitaria monogyniculis et ultra, ovata, compressa
squamis 12-14 ovatis glaberrimis carinatis, mucronatis
albido virentibus

Rothb. huc revocat Sloan. Tab. 79. fig. 21. quod inquirendum

mucronat. Luzeniæ

Holiba Cayenne herb La Martini

Tota glabra, folia breviter petiolata, tripartita, elliptico lanceolata,
attenuata, acuta, basi obtusa, venis sine venis, obsolete crenatis, supra
nitida, mucronata. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, folio dimidio
breviores. Flores magni. Calycis lacinae ovate. Petala integra

Leguminosa Eugenia

a bit at in St. Domingo herb. La Martini

Rami teretes, inani, uti tota planta glabri, patentis. Folia pollicaria,
pedunculati axillares, 3-4.

Dedit La Martini

radi folia Eugenia

Habitat in Domingo herb. La Martini 5

deid la Mart

Tavanica Eugenia

Habitat in Tava Reb. La Mentii 3

Folia sessilia, bi-3.4-nerviata, oblonga, obtusa, glabra. Racemi terminales

Pedicelli simpliciter, uniflori



Lanceolata Eugenia

Habitat herb. la maritima

Rami teretes, glabri. Folia breviter petiolata, subtripollicaria, lanceolata, obtusa,
utrinque minime nitida, glabra, integerrima, subtus venosa. Racemi termina-
tes: pedicelli brevissimi

patens Eugenia

Habitat Cayenas herb la Manthi

Rami super ne compressi, glabri. Folia petiolata, tripolliciana, oblonga,
acuminata, integerrima, subcoriacea, utraque glabra, supra arena
subtus venis ^{gemini} nervis venis. Petioli ~~uniqui~~ ^{uniqui} ~~ulares~~. Pedunculi atit
quatuor, spithamei: pedicelli oppositi, vel gemini utraque, canescenti-
patentes, simpliciter, uniflori, unguiculares. Bractea ovata, brevis, acu-
40. Calycis lacinae 40, rotundata

mespellodes Eugenia

Habitat herb. de Martini.

Pedunculi laterales, 3 vel plures, uniflori, brevissimi.

Cymosa Eugenia

Habitat herb. La Martini

glaberrima. Rami. Tetragyni, folia petiolata, tripollucaria, ovato-lanceola
ta, attenuata, retagerrima, tenuispina venosa. Racemi terminalis: pedicelli
triflori. Flores pedicellati, magne. Calyx turbinateus. Stamina longispina
lobi calycis rotundati.

rigida Eugenia

Habitat in insula Francisco herb. La Martini

Rami teretes, uti reliquae partes glaberrimi. Folia brevissime petiolata, bi-polluciana
subcoriaceo, rigida, oblonga, apice obtundata, interdum emarginata, uterque
subtus venis formae et simpliciter venosa. Corymbi terminales subaeo oppositi,
pedunculi compressi, pariter aequo oppositi, basi bractea unguiculata, figura folio
rum, sursum minores oppositi inibus. bractea sub pedicellis minuto, ovata
flores glomerati ob pedicellis ultimis brevissimis.

colorata Eugenia

Habitat in Madagascar herb. La Martini

Racemi laterales, plurimi, brevissimi pedunculati. pedunculi pariter terni,
4niflori.

rotundifolia Eugenia

Habitata in St. Domingo herb. La Martii

Rami dichotomi, cortice cinereo, divaricati. Pedunculi ternales, brevissimi
an inflori

228 La Martii

phillycofolia Eugenia

Habitat Herba Martii

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, apice subtomentosi, frequentes, virgati.

Herb. Martii

polytachya Eugenia

act. sp. hist. nat. Penf.

Habitat in Capana herb. La Mancha

Rami superne compressi, tenuiter ferrugineo tomentosi. Folia petiolata, et pollinosa, elliptico-lanceolata, acuminata, supra nitida, citraque glaberrima, venis subtus obsolete venosa, integerrima. Pedunculi axillares 3-4. unus supra alterum, foliis paucis breviores, inaequales. Pedicelli suboppositi, saepe gemini, utriusque ferrugineo tomentosi tenui, uti pedunculus communis

angustifolia Eugenia

Habitat

Deed Lamant

Catipolia Guyenii

Aubl.

Habitat in Guyana herb. La Mantini

Rami teretes, glabri. Folia breviter petiolata, 4 pollicaria, elliptica, acuminata, saepe obtusa, integerrima, membranacea, venosa, glabra. Racemi axillares, simpliciter, breviflori, 6 flori, uti flores tomento tenuisimo, ferrugineo tecti. Bractea sub calyce, dua, parva, ovata

glomerata Eugenia

Habitat herb. la Martini &

Corymbis Terminalis, supra decem profita, glomerata

Dichotoma Eugenia?

Habitat in Insula M. Thome herb. Desfont. 5

Rami *Dichotomi*, glabri, cortice albedo. Folia oblonga coriacea, supra nitida, obscure venosa, punctis perforata, subtus punctis elevatis, venis, juniora sesquialterata villosa, uti ramuli. Racemi ex axilla gemini: pedicellis 3-5 flori.

terminalis Eugenia foliis oblongis acuminatis, pedunculis terminalibus subquini
nis unifloris

Habitat in Madagascar herb Desfont.

Rami cortice albo, glabri, teretes, flexuosi. Colea petiolata, vix pollicaris, ob
longo-ovata, ^{ramu} acuminata, obtusa, utrinque elevato-punctata, glabra, obscura
venosa, opaca. Pedunculi terminalis ramorum et ramulorum, 2-5: semi-pet
licares. Flores glabri, punctati, magnitudine uniflori.

ciliata Eugenia

Habitat in Domingo herb. Desfont.

Rami glabri, superne compressi. Folia petiolata, bipollicaria, oblonga, viximur unguis
culari vel longiore circumscripta, venosa, glabra, ad presertim punctis elevatis, supra nitida.
Petioli unguiculari. Racemi axillares, solitarii, oppositi, Petiolo duplo longior. Pedicelli 7. distantes, semiunguiculari, uti bractea et calycis
vellofi. Bractea parva, ovata. Petala ciliata.

nitens Eugenia foliis lanceatis venis nitidis, racemis terminalibus

Habitata in insula Francia hab. Desfont. 5

Rami teretes, superne tetragonis compressi, glabri, cortice purpureo nigro. - Folia petiolata, pollicata, obtusa, basi acuta, integerrima, supra venosa, nitida supra, subtus pallide viridia, subavenia, enervia, impunctata. Pedunculis vix pollicares, terminales ramorum, solitarii. Flores racemosi, ^{redualti} quinque, distanter, filiformes, angulati. Ovidius 4 locularis: loculis monospermis.

Eugenia

Habitat in insula francis Commerçon herb. mus.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, opposita, oblongo-subrotunda, utraque
glabra, supra nitida, subtus pallidiora. Pedunculi laterales infra folia
eii, plures ex eadem gemma, unguiculares, uniflori. Germen vix striatum.
Palyis laciniis 4or ovato, acuta. Receptaculum quadrangulare.
Alia specimen in eadem charta, floribus terminalibus sesquipedibus.

Caryophylloides Eugenia foliis elliptico lanceolatis glabris, racemis compressis

Habitat in India orientali herb. Guj

Affinis mihi Cumini, an modo varietas?

Rami cinerei, glabri, uti reliquae partes: ramuli compressi. Folia petiolata,
5-6 pollicina, acuminata, tenuissime obsolete venosa. Pedunculi infra folia
cili et verminales axillares, solitarii: pariter distantes, patentissimi,
superiusque: pedicelli conferti, ceteris sive. Calyx tuberculatus, trin-
catus.

Duranciata Eugenia

Eugenia duranciata La Mart.

Habitat Herb. Kurf.

Tota glabra. Rami, ut in reliquis. Folia utroque punctata, minime nitida oblonga, attenuata, obtusa, basi acuta, venosa, bipollicaria.

glomerata Eugenia folior ovato-oblongis acuminatis, panicula terminali compa

ta

Eugenia glomerata La Mart.

Habitat in Insula Bourbonis Commeson herb. 4. v. p. 5

Tota glabra. Rami ut in reliquis. Folia petiolata, subperthamoa, subovata, im
punctata, glabra venis sine venosa, acumine obtuso terminali. Petioli semi
pollicares. Panicula brevis, e ramis ramosis, supra decompactis. Flores parvi, alii

masculi alii foeminei Commeson

varietas folior lanceolatis, basi pollicem lata.

paniculata Eugenia foliis ovato-oblongis circuminatis, racemis compressis.

Eugenia paniculata Lamour.

Habitat in Insula Bourbonis Commerf. herb. 4us.

Rami inferiores torti. Ramuli verites, superne compressi, glabri, uti reliqua par-
tes. Folia petiolata, opposita, bipollicaria, obtusiuscula, supra nitidiuscula,
subtus pallida et aloque armata punctis raris adpressis, utraque venis
venosa. Petioli unguiculares. Racemi bipollicares, ex axillis supremis, ap-
proximati, fusco-purpureascentes: parvales 400, pedicelli approximati, triflori,
flores subsessiles
an Myrtus?

cymosa Eugenia foliis ovato-lanceolatis, racemis lateralibus terminalibusque, pedicellis

trifloris

Eugenia cymosa La Merth

Habitat in insula Bobonia Commercii her. Guss

Tota glabra. Rami cortice cinereo, apice compressi: juniores superne purpurascens.
Folia petiolata, opposita, 3-4 pollicaria, basi pollicem vix lato, attenuata, obtuse
pinnifida; membranacea, tenuissima venosa, vix punctata, integerrima. Petali
purpureascentes. Pedunculi bipollicares, compressi: pariales oppositi, ceteri
9. distantes, patentes, inferiores triflori, superiores uniflori. Flores pedicellati.

Calycis tubulatus: lobis 4, oppositi, rotundati vel acuti. Stamina petalis con
grua

Cuzania foliis lanceolatis subtus & floribusque axillaribus sessilibus tomentosi

Habitat in Martinique Richard herb. Mus. 5

Rami glabri, apice villosi. Folia ligustrina, brevissima petiolata, pollicina
na vel perium ultra, utrinque acuta, superne valde attenuata, arenaria
supra glabra, obscure lineata, subtus oblique multinerviata, villosa. Flores
axillares, plures, villosi, tomentosi
an Myrtus?

mespiloides. Eugenia folus ellipticis glabris costa subtus villosa

Eugenia mespiloides La Mark

Habitat in insula Bourbonia Commerf. herb. Guss.

Rami glabri, cinerei, apice villosi. Folio petiolata, tri-
pollicaria, utrinque
venosa, impunctata, ellipticis-lanceolata, subtus villosa, etate glabra ex-
cepto costa, palledione, ^{Petiole} Calycis villosi, unguiculari. Pedunculi infra
foliacei, 3-4. unguiculari, uti calycis unguiculari. Bractea duo
ovata ad basin calycis. Calycis lobi 4or, rotundati. Fructus magnitudine
Ravasi.

Coccoloba Eugenia foliis oblongis subrotundis que glabris, pedunculis late
natis aggregatis

Habitat in insula Sancta Barbara Commes. herb. Mus.

Rami cinerei, glabri. Folia subsessili, 3-4 pollicaria, glabra, venosa,
filiatim venosa, venosa, obscure punctata, supra impunctata. Pe-
dunculi infra foliari, saepe saepe, unguiculares, articulo armato, uti calycis
vellofolii. Bracteae duo sub calyce, minuta. Flores magnitudinis fere
nisi Compi.

forte Eug. elliptica La Martii

orbiculata Eugenia

Eugenia orbiculata Lamour.

Habitat Gommes. herb. tresp.
Rami glabri apice nudo tomentosi. Folia petiolata, subrotunda, utrinque glabra, arena, enervia, supra glaberrima impunctata, subtus tomentosa venis, interdum ferrugineo punctati, obsolete nervos-venosa.
Pedunculorum supra folia, oppositi, solitarii, uniflori, uti calycis ferrugineo tomentosi

retusa Eugenia foliis ovalibus coriaceis retusis, racemis infra foliaceis brevissimis aggregatis

Habitat herb. Fusf.

Rami crassitie penna asperna, glabri rigidi. Folia opposita, brevissima petiolata, palmata, ovali subrotunda, utrinque glabra, supra impunctata, nitidiuscula, subtus pallidiora, punctata, utrinque venosa. Racemi unguiculares, cernites quinquiflori. Flores parvi

Delatata Eugenia foliis cordatis oblongis nitidis reticulatis obtusis subsessilibus,
racemis compositis

Habitat in Insula Bourbonica herb. Mus.

Rami glabri, superne compresso-tomentosi, ad folia delatati a linea utriusque a petiolo decurrente, canaliculati, crassitie perno clypea. Folia bipollicina, glabra, utrinque impunctata, rigida. Pedunculi terminales. Emittit obovatus.

Caspioides Eugenia

Eugenia caspioides La Mark

Habitat herb. Turf.

Rami cinerei, glabri. Folia pollicaria, oblonga, arena, enervia, obtusa,
basi acuta, breviter petiolata. Pedunculi axillares, gemini vel terni, foliis
paucis brevioribus

Eugenia folio subincanis, paniculis subsplendens
an Rumph. herb. amb. 5. p. 36.?

Habitat herb. Guss.

Tota glabra. Rami cortice cinereo. Folia petiolata, sesqui polliciana, membranacea, basi acuta, apice obtusa, panem acuminata, tenuis pime venosa, subtus punctis elevatis. Panicula composita, multiflora. Flores neri, similes *Eugenia multiflora*

hirsuta Eugenia foliis ovato-lanceolatis subsesquialteris, ramis raris et hirsutis
hirsutis.

Habitat in Guana Richard herb. Guaf.

Rami teretes, glabri; ramuli punctato-scabri, juniores hirsuti; compressi. Soli
brevissime petiolata, pollicaria, supra nitidiuscula, punctis impressis,
obscure nervoso-venosa, subtus pallidiora, punctis elevatis, juniora pilis
decumbentibus adpressis, obtuse nuda, attenuata, acuta. Racemi
axillares, longitudine foliorum, simplices, 5-7 flori: pedicelli inferiores
remoti. Bractea ovato-lanceolata ad basin pedicellum, punctata, acuta,
hirsuta, longitudine pedicelli. Bractea quatuor ad basin pedicelli pro-
terea, calycisque longior. Calyx basi hirsutus: laciniis lanceolatis

rostrata Eugenia foliis ellipticis - lanceolatis acuminatis ramulis foliis
junioribus subtus tomentosis.

Habitat in Guanae Richard Leub. Guaf.

Rami apice ferrugineo tomentosi. Folia 4-5 pollicaria, basi acuta, apice acuminata longis, obtusiuscula, supra nitida diuisula, secundum nervos remote pubescentia, subtus tomento ferrugineo, stipe nudo glauca, Petiolus unguis uloni. Racemi terminalis gemini, compositi, tomentosi. Bractea minuta, ovata. Strobili in pedicelli ultimi.

androsamifolia Eugenia foliis ovatis glabris, racemis axillaribus solitariis brevibus

Habitat in Domingo Dupuis herb. Guss.

Rami ut in reliquis, apice oculo armato pubescentes. Folia pollicarij integermina, utrinque glabra, parum acuminata, acuta, subtus punctata, utrinque obsolete venosa - nervosa. Petioli semiumguales. Peduncululi longioribus, 3-5 flori. Flores parvi. Germina oculo armato villosa.

an Myrtus affinis monticola Swartzii

acutifolii Eugenia foliis oblongis, ramis rarisque dichotomis

Habitat in Antillis Richard herb. 4 usq.

Rami glabri, superne villosi, coeternum ut in congeneribus. Folia petiolata, pollicaria vel parum ultra, basi acutius, apice interdum acuminata emarginata, subtus pallidiora, venosa, punctata, supra obscure nervoso-venosa, imipunctata, utrinque glabra. Pedunculi ex supremis axillis et terminalibus, terminalibus interdum ternis, foliis longioribus, glabri: parciales quinque laterales bis bipedi cum flore sepius in dichotomia, reliqui glabri. Calyx glaber, punctatus.

inter Myrtos herb. mei certa invenitur

ovatifolia Eugenia

Habitat in Madagascar herb. fruf.

Tota glabra, Rami ut in reliquis. Folia petiolata, ov. posita, tri pollicaria, coriacea,
apice rotundata, cum acuminē brevi, interdum subretusa, venosa, oculo armata
subtus punctata. Petioli semi anguiculares. Racemi axillares, compositi, foliis
breviores, solitarii. Pedunculi compresso-tetragoni. Pedicelli triflori. Flores
semples. Omentum magnitudine nisi, dispermu

brasiliensis *Leuzenia* foliis ellipticis coriaceis nitidis, racemis terminalibus simplicibus, pedunculis basi bracteis imbricatis

Habitat in Brasilia Dombey herb. 4 usf.

Rami teretes, cortice cinereo, glabri. Folia opposita, 2-3 polliciana, obtusa, supra nitida, utraque glabra, oblique nervoso-venosa, nervi ante marginem ciliatissimi, impunctata, integerrima. Petioli unguiculares. Pedunculi ex apice gemini, basi imbricatis bracteis oratis, acutis, incanis coriaceis, superne foliosis; foliis oblongis semipollicaribus. Pedicelli oppositi, diffracti, sesquipollicariuni flori, patentes, fusco-purpureascentes, bractea basi vaginanti; oblonga, unguiculari, obtusa, punctata. Calyx punctatus. Flores magnitudine Myrti *Leuzeni*ae.

paranica Eugenia foliis ellipticis sessilibus, racemis axillaribus terminalibusque, pedicellis trifloris

Eugenia paranica La Mart

Habitat in Java Herb. Mus.

Rami ut in congenitibus. Folia opposita, obtusa, basi sine parvo, membrana
cra, tenuissime venosa, nervi subter infra marginem concurrentes, obscure
punctata. Pedunculi foliis breviores: pedicelli patentes, circiter 7. inferio-
res triflori. Flores pedicellati: lobi calycis rotundati

multiflora Eugenia

Eugenia multiflora

Habitat in Capenna

Tota glabra, rami ut in cognatis. Folia petiolata, bipollicaria, acuminata
obtusis, venosa, oculo armato utriusque punctata. Petioli semiunguiculares.
Racemi decompositi. Flores parvi. Fructus magnitudine pipi