

Eugenio

~~Hagenia~~

Imbriaria

Harkenya

racemosa Eugenia foliis crenatis, racemi longissimi longissimis, proris oratis quadrangulis
Olor. Leyl. 191. & Spec. pl. p. 673. Sy. V. pag 461.

Sam Kravadi J. Caibathiumbu Pitied. Mall 4. p. 11. tab. 6.

Bullockia sylvestris alba Rumph. amb. 3. p. 101. Tab. 116

Habitat in sylvis maritimis Ceylond. T.

Folia obcordata, brevissime petiolata sericea apicem ramorum floriferorum
vel superne conferta, glabba, undulata, subcrenata, crenis minutis acutis cuspulis, max.
dilatata inferne magno pedunculo et ultra. Proximi simpliciis fere ~~stipulis~~ sesquipedales
sericea angustiora foliis alterius, remota.

affinis acutangulo differt foliis majoribus, foliis crenis minutis

ac tangula ~~Eugenia~~ foliis ferratis, per Racemis terminalibus longis, pinnis oblon
gis ac tangulis

Eugenia Tomentosa, foliis oblongis integerrimis rami que villosis, racemis astillatis
bus compositi

Eugenia Tomentosa: foliis ovatis subsessilibus, floribus racemosis.

Litr. H. pag. Aubl. flor. Guian. pag. 504. Tab. 200.

37.

Habitat in Guiana.

Rami villoso-subtomentosi.

Folia praeceps petiolata, opposita, sesquipolligana, parva, supra
arenaria, secundum nervos lineata; subtus pallidiora, venosa,
obtusa, integerrima.

Pedunculi atillares, solitarii, folio longiores, uti pedicelli incani.

Flores parvi.

Calyx villoso-cineraceus.

~~multo~~ Bignonia foliis conjugatis oblongis glabris, racemi terminali varia dichotomis,
Caunfofer cerollis etus fomentosum mollespissimis

Habitat in Cappadocia Dr. von Rohr 5

Peculiae velutinae s. rami recti, glabri

dolci pediculatae opposita, conjugatae. foliola petiolata, quadripollita
res, ovata oblongo-ovata, plerunque obtusa, superiora int adum
menata, acutissima, integerrima, utrinque glabra, pubtuluspissime
venosa.

Pedali peltatis convexi, supra plani, glabri; cunctus nullus, saltem in
specimine quod Soran habeo tan-

Racemis terminalibus rectis, graciliatis et ultra, complicitis. Pedunculis
pedatales alternatum complicitis: pedatales opp. prop., distantes.
inferioris bei dichotomia superioris penet, absque flore in dichotomia
xores: pedi ellati. Bractea setacea, ad basi pedunculorum, de-

sub nomine Bignonia
incarnata & mult.

von Rohr cum

incarnata Aubl.

habet tamen bene

conspicuit Deoque

nomen nectum

Calyx simplex, unicoloratus, integerrimus; glabriusculus.

Corolla in carna, bipinnata, extus vello bristulis denudata
fomentosa, mollespissima, in specimine sic. ferruginea fusca
intus minus fomentosa.

hic multo

(A Bignonia jacquemontii Blattis diversa racemis terminalibus.
nec articulatae Calyx integer nec spissus dentatus sic aliquid sic
Hymen bilamellatum frathulatum ut in omni Bignonia ven-
tosa fomentosum florum

elliptica Luy. foliis ellipticis acumunatis, floribus paniculatis
calyx repondo, balausta globosa Smith. Lin Trans. 3. p. 201.
Habitat
in nova valle po

non id.

corticosa Eugenia folia ovata acuminate, rameis cymbospi pub
terminalibus; filamentis brevissimi Lour. fl. Porchenh.

pag. 360

Habitat in silvis Porchenhend

Arbor magna. cortice waspifubaromato. folia acuminata
integerrima, glabra, puberula. Flores pauci, albo
nebri. Calyx cyathiformis pubescens. Corolla 4 petala
subrotunda clavata. filamenta 20. Bala minuta pubescens
binata glabra nigra et perma. semen subrotundum
mollis pulchrum

non vidi.

nervosa Eugenia folio lanceolato, floribus terminalibus coryn-
ticis, basi globosi nervosi nervo. fl. Cochinch. pag 30 v.
Habitat in Cochinchina sylvis 5

arbor magna. Rolia integerrima glabra. pedunculi uniflori
flores albi Cal. 4 petalii magni laevis obtusi petala
4 pubescentia nerva filamenta 100. Bacca caudata
glabra fusco nigra supra. femina globosa in matre
fructu angulata, subaequaliter facie separabili.

non vidi

Luccida f. foliis ovalibus rotundatis concavis nitidis subtruncatis puberulis
floribus spissibus laevibus. Linn.

Habitat in Apula Transitoria

Ramnus grisei subnodosus. Oalia opposta obliqua inqualia

lesque pollicem lata, imparitata

flores in axie spissi solitarii vel paucos.

Floribus pedunculatis

non siccata habet alio nomine

obtusata E. foliis puberulatis coriacis peltatis albidis, pedunculis usque
ni foliariis astillariis laevi. Linn. Enc.

B. foliis magis petiolatis

Habitat in Apula Borbonea?

Folia minora quam in E. cotinifolia. Rami albi, glaberrimi.

Folia pubescentia ut aquae glabra inter nodos breviora. Pedunculi
foliis longiora. Flori minutus. Calyx virginalis

non vidi

me spicilloride E. folia orato - canescolatio pedunculi usne floris brevibres articulatibus, calycibus albidis Tonentofsi La Mart. En:

Habitat in Capula Norbonio &
Rami Canesei. Solia petiolata glabra, panior pubes alba. Petio
les puberullosi 3-4 pollicariae usque pollicem longa. Pedunculi solita
ni flore breviores pubescentes ut calyces

cuneifolia E. foliis cuneiformibus acuminatis avenis, pedunculis

oppositis foliatis

Habitat in Apula Francia Commepon Thoma 5

Rami Verter glari superare compresi. Folia petiolata,
opposita Triplicanaria basi arcuata, obliqua cum acumine
integerrima, plana, utraque punctis elevatis. Petiolas
semiplicans. Pedunculi longitudine petroli, uniflori
Calyces glabi quadrilobi.

an Eugenia vel myrtus

angustifoliae R. folia angusti crenatis acutis pedunculis oppositi
la molla lata
Mystis pomeriferus foliis compatis angusti Plam spic. 10 ft: tab.
207 feij.

Habitat in Domingu

Ramæ grisei. folia crenata opposita glabra subsplice bipinnati
cana pedunculi solitari vel gemini at illorum

non vidi

Geodophium E.
Gemmifera M.
pedunculi astillares / geminis foliis ovato oblongo
terminalibusque
senosi netidis.

Habita in India occidentali.

Rami cunei glabi. Folia petiolata, bipinnata
et geminae, folia plana parum attenuata, obtusa
ut unque venis elevatis, glabra subtiliter pallidiora punitus
venosus, supra impunctata. Pedunculi astillares
ut unque gemini quotuor in apice folio dimidio
breviores filiformes glabi.

caspinoidea E. foliis ovatis atque pubacutis, pedunculis astellatis unifloris
aggregatis la Marck Ceytl.

P. foliis oblongis

Habitat in Madagascari

Folia similes Raff. peraguae. Rami ad nodos paucum compresi, glabri. Folia
coriacea glabra nitida & fissa sequipolluccaria. pedunculi foliis
breviori 2.3.

non vidi

macrophylla L. foliis matris ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis
subfasciculatis brevibus lateralebus haustoriis Eniget.

Habitat in India orientali

Floris magnitudine tig: malaccensi folia pedata; 4-5 pollices lata
petoli breves

non vidi

elliptica L. folio ovato elliptico subter venoso, pedunculi lateraleibus
brevibus fasciis elatis. ex Mark Cai:

Habitat in Apula Francia

Rami rigidi tortuosi nodosi, grisei. Solia subsessilia cuncte cum pubes
biculata, glabra nervosa, pellucida pernata, fuscopallens

non vid-

Jesplifolia E. foliis cordatis jesplibus, radenis axillibus

Habitat in Insula Boboneo Cormerion Thourint

Rami teretes, cortice cinereo globo.

Tolca jesplica Apollodora dulcis, exalte cordata integerrima

glabra pubinella emarginata, aenia flavo eructa -

P. Dunculi axillares foliatae opposti praudentes pini
folio dicondo breviori Pedicelli gemini oppositi. Flores cicutar-

teri.

Calyx integer campanulatus

an hujus generis flores nondum etiam vix

Javanica L. foliis ovali oblongo-spatulatis pedunculis ramosis laxi axillantes
et terminalibus La Martre Enic.
an jambosa aqua Rumph. amb. p. 126. tab. 30. fig. 2.

Habitat in Java

Rami glabri teretes fusci. folia integerrima, glabra non nitida 4. 5 pollia
non 3 pollia lata - Racemi laxi 6. 7 flin. Pedicelli oppositi, inferis
ver pollicares - florae magnitudine 3/4 in

non vidi

venosa h. foliis ellipticis coriacie opacis venosis reticulatis ramos paucifloris
et terminali laevi Eri:

Habitat in Madagascari.

Rami nigri piperne angulati. Folia glabra supra nitidissima et polluta
 $2\frac{1}{2}$ polliares latè petiolata. Flores magnifici.

non vidi

Difolior E. folii oblongi venoſi acuminati, racemis terminalibus pedicellis

Infloni

Habitat in Insula Borbonia Commerſor Thoeni;
Rami grisei, glabri verdes. Tola petiolata, oppoſita, bipinnata,
canis, pollicem lata, nequa
rami, glabra, foliis rufi venis
subtus fine puberula, subtus rufescens oculo armata
punctata, supra glabra. Petoli semipollacives; fusi per
mucos. Pedunculi terminalis; colore petrolorenum utrū pollis
canis ex inter quatuor. Rachis approximatis 3-5. Inflon
flos pedicellatus glabri

an mystus

an exco for la mode

impunctata E. foliis lanceolato ellipticis acuminatis impenetratis supra
subcervosis racemos terminalibus simplicibus
Habitat in India orientali Boni.
Rami verticis cortice griseo. Polia petiolata, opposita,
5-6 pollici aria, sequi petiolam lato, opaca rara integri
ma utnique glabra impunctata marginae vero reflecta
Coria saepe supra venis oblique simplicibus terminalibus
frequentibus fere subcervosis sub Ysi panum extantibus
acumina brevi. Racemos petoli fusco purpureo sanguineo
pedunculi terminali solitarii, petiolari fusco purpureo
scintet 3-5 flori. Flores oppositi, sessiles, majorer

an Myrtus?

citrifolia E. foliis ellipticis ^{concrep} venosis ac umbratis, racemo terminalibus
simplicibus.

Habitat in India orientali Krongt

Rami glabri; cinerei; Teretes; superne ad runcis compresi.

Toleo breviter petiolata, opposita 6.7 pollicaria petiolis

duos lata ac umbris brevi, supra pallide vindio, punctis
rancoribus in pressis, in juniora frequentia in adultho fere
eraneda oculo armato videndi subtili rufipunctis

utique glabra minime nitida Petoli femeungium
laci. Pedunculi et apice teri ³⁻⁵ pedo purpureo

Pedicelli ³⁻⁵ ~~graciles~~ simplices ~~late~~ breves. Calyx 4
fidus glaber

an rotund Myrti

lanceolata E. folio lanceolato subfusiforme, pedunculis ramosis paucifloris
subterreneis La Marta - Eni.

Habitat in India orientali⁵
Rami foliiferi pauciflori 2-3 parvum inflorescens. Folia glabra paucis
pelluc. 2-3 pollicaria, flore pauci-

non vid

parviflora E-folius orato. Canis colatis acuminatis, paniculis pubescentibus flori
bus minimi la Mart.

B. paniculis minoribus

Kraatz marum Ried: M. 5 p. 37 & 19 an. hujus varietas?

Habitat in Java?

Flori numerosi huius generis minimi. Ramis pubescens. Solca petiolata
subtus velloso bi-pinnipolluccia. Pedunculi axillares et terminali
cristati calyces vellosi cuneati. Flores magnitudine Galii albi

violacea E. folia rotundato cordata, panicula terminali fasciis congesta Co
Marth. Enc:

Habitat in Inf. Francia?

Rami npd piperne folioli. - Folia approximata pollices $2\frac{1}{2}$ -lata
paniculo ramo & chotomis fructus magnitudine Perap.

non vidi

glomerata E. foliis oratis obtusis conicis, panicula super breviflora glomerata
terminali la Marck Enil.

Habitat in Insula Borbonia 5

Rami nodosi, grisei, glabri. Folia petiolata lesque pollicianae - flore
parvi numerosi

non vidi

panniculata E. foliis ovatis ac utro petiolatis apice recurvis, panicula con-
gesta terminali la mark Enc.

Habitat in Ile de france Bobonius 3

Panic rigidum panum nodosum griseum. Tolea crenulata magnitu-
dine et figura ferre pyri glabra rubida. flores parvi numerosi
rami paniculae purpureo-pentei. bractea dura ad basim calycis

non vidi

multiflora E. folia ova - lanceolatis acuminatis pubescentiis et punctatis
panicleis multi floris astillibus laevibus. Cae.
Habitat in Apenninae.
Rami fusi vel grisei. Solea glabra pubescentiis punctata bipinnata
nra. Panicle folio longiori floribus paucis

multi cynta

Brophlebi L. foliis ovalibus superiore levidis, pedunculis complicitis bracteatis
et gemma squamosa - imbricata praedicta habentibus laevi - *Marie* Cae.
Habitat in Brophlia.

Rami rigidi grisei. folia obtusa coriacea foglie pollici arcu sequi-
pollici ex lato. Pedunculi astillari et terminaliter.

non vidi.

cymosa

E. foliis ovato - solatis, pedunculis ramo- cymoso- paniculatis
ceterminate, calyculis quadrituberculatis laevibus Eneget.
an Gambosa ceramea Rumph. amb. 1. p. 130. Tab. 41.

Habitat in Moluccis

Rami superne angusti. Folia acuta squarrolobata. Pedunculi
infra folia in parte nuda rami, colorata

non vidi

conyombo E. foliis ovatis obtusis opacis estipulatione negris corymbis complicitis
terminalibus La Martre Egypt.

Nyara Rhed. Mal. 5. p. 53 v. 27

Habita in India orientali?

Rami glabri. Olla vespa capa angustata, petiolata, glabra bi-
pollicularia. Petrola brevis. Pedunculi ramosi in corymbo complicito
fusilli bracteas pubulate - Flores numerosi pauci.

non vid - an Nyctea caryophyllata

matuel E.

Tuegum matuel Gosta De ser. & fr. pag. 166. tab. 33. fig. 1
Habitat in leviter

non audi

lucida E.

Sargyrum lucidum Gorsk de Sem. pag. 167. tab. 33 fig. 1.

michi cognata

paniculata L.

Luzula paniculata Gord. de Fruct et Semen: pag. 166 Tab. 33. fig. 1

Milki cynotata

in ~~abrupta~~

periploca folia Euphorbia pedunculis paniculatis axillans foliis
acuminato lanceolatis. Haec coll. 2. pag. 10 d^r. Tab. 4.

~~ma~~nyctis splendens