

Eugenia

Pedunculis unifloris
glabris

- uniflora E. foliis ovato-oblongis attenuatis, pedunculis unifloris axillaribus foliis brevioribus
2. ~~multiflora~~ ^{involvis} E. foliis ovatis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus longatis
3. cordifolia E. foliis cordato subrotundis, pedunculis axillaribus foliis longioribus
4. ~~lanceolata~~ ^{bracteifolia} E. foliis lanceolato-oblongis obtusis, pedunculis lateralibus terminalibus
5. ovalifolia E. foliis ovalibus emarginatis, pedunculis lateralibus, ramis dichotomis
6. emarginata E. foliis ovalibus alternis glabris, floribus axillaribus solitariis
7. cotinifolia E. foliis obovatis integerrimis, pedunculis axillaribus subgeminis
8. pseudopoffidium E. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis axillaribus terminalibus
undulata ^{aggregatis}
9. subbiflora E. foliis oblongis obtusis, pedunculis axillaribus solitariis ternisve
subunifloris foliis longioribus.

floribunda est ex petiole acta foliis. herb. nat. Paris

xx floribus sessilibus pluribus

10. diphylla E. foliis floribusque terminalibus geminis sessilibus
11. ramiflora E. foliis ovatis-oblongis subsessilibus glabris membranaceis, floribus aggregatis infrafoliaceis
12. juncosianensis E. foliis ovatis-lanceolatis acuminatis acutis, floribus axillaribus terminalibusque

13. ~~guianensis~~ xxxi floribus racemosis

xxx floribus racemosis

13. guianensis E. foliis oblongis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus subsessilibus
14. foetida E. foliis lanceolatis-oblongis attenuatis obtusis glabris, racemulis axillaribus brevissimis
15. glabrata E. foliis lanceolatis-oblongis integerrimis glabris obtusis, racemulis axillaribus brevissimis
16. aromaticus E. foliis lanceolatis-ellipticis acuminatis glabris, racemis terminalibus, geminibus cylindricis.
17. longifolia E. foliis elliptico-lanceolatis integerrimis glabris, racemo terminali.
18. jambos E. foliis lanceolatis attenuatis, racemo terminali
19. malaccensis E. foliis lanceolatis, ^{pedunculis ramosis} racemis lateralibus

- 20 andropemoides E. foliis ovato-oblongis acuminatis obtusis pinnis subsessilibus, racemis axillaribus terminalibus que
- 21 acutangula E. foliis lanceolato-ellipticis ^{serpatis} inferne angustioribus, seu racemis axillaribus longissimis, pinnis oblongis acutangulis
- 22 racemosa E. foliis lanceolato-ellipticis serratis inferne angustioribus, racemis longissimis, pinnis ovatis.
- 23 nitida E. foliis lanceolato-oblongis attenuatis nitidis glabris, racemis terminalibus ^{compositis}.
- 24 tomentosa E. foliis ovatis integerrimis ramis que villosis, racemis axillaribus ^{compositis}.
- 25 sespli folia E. foliis cordatis sessilibus, racemis axillaribus simplicibus

Eugenia Patrisii, ³foliis ellipticis glabris acuminatis acutis, pedunculis axillaribus
geminis terminalibus subquaternis unifloris capillaribus.

Habitat in America meridionali von R. & H. 5

Rami teretes, glabri, cortice cinerescente. Ramuli oppositi, foliosi et
flori ferri.

Folia petiolata, opposita, bipollicaria, integerrima, acuminata,
acutiuscula, basi interdum obtusa interdum acutiora, membra
nacea, utrinque glabra, supra sublineata, subtus pallidiora, veno

sa.
Pediculi vix semiunguiculares, supra plani.

Pedunculi axillares ^{vel} ~~et~~ parum infra gemini, terminales quatuor vel
quinque, sesquipollicares, glabri, capillares, uniflori. Bracteis
setaceis ad basin pedicellorum.

Calycis laciniis rotundatis.

Affinis Eugeniae tri uniflorae, diversa habitu et bracteis setaceis,
nei orati.

Eugeniam hanc Patrisii nominavit von R. & H. in memoriam Dr.
Patris botanico cultor et hujus speciei inventor

axi. lantib. solitarii

tri nervi Eugenia foliis ovatis trinervi glabris, venis infrafoliaceis
geminatis oppositi altero compresso.

Habitat in Cayenna d. v. Robor sub nomine Eug. in ontano no 15 q.

Rami inferne ne desecti superne compressi ope lenti villosi.
Folia reticulata ^{perenne}, ~~ovata acuta~~ ^{folia} ~~trinnervia~~ ^{trinnervia} ~~trinnervia~~ ^{trinnervia} acuta, ^{pedunculata}

oculo armato
tota

et venis evidentioribus, oculo armato utrinque per Petioli
breves femine unguiculares subullosi.

Pedunculi axillares
solitarii folio dimidio brevior, infra foliacei tripolluare.

oppositi gemini ad pagulum cu ad nervulama alter robustior
basi se per utrinque ramo, omnes compressi subullosi. pedicell.

remoti, oppositi unguiculares, patentissimi ^{uniflori} bracteola
lunari lanceolata decidua basi persistenter. Calice ^{booi} incanae
foliola subrotunda 4. extus punctis elevatis. Petala oblonga inter
germina gemina villosa incana.

macrocarpa Eugenia foliis ovatis nitidis acuminatis, floribus lateralibus aggregatis
pedunculo latissimo, baccis fusiformibus

Habitat in martinique monte Calvasse 9 set 5

Rami glabri, inferne teretes, superne compressi. Folia breviter petiolata,
spithamea, pollicis 4 lata, venosa, glaberrima. Pedunculi unguiculares,
4-5: bractea duo, minuta, ad basin calycis. Fructus pollicari, calycis aplobo coro
natus

Coronata Eugenia foliis oblongis obtusiusculis, floribus aggregatis brevissime pedunculatis

Habitat in Guinea Thonning 5

Erigit ramosis bimis. Rami inferne teretes, superiores compressi, uti et
liquor pedes glabri. Folia brevissime petiolata, bipollicaria, oblonga
obtusiuscula, rigida, & supra opaca nitida serena, & subtus pallidiora
oculo armato punctata, subvenosa. Pedunculi axillares, plures, vix
inquinulares, uniflori. Calyx 4fidus: lacinis 2. parum majores. Petalis
4 alba, ovata, calyce duplo majora. Bacca ovalis, calyce coronata,
ovine grossularia. Semen unicum. nigra, magnitudo

Capiflorus C. foliis cordatis glabris, pedunculis subtrifloris, corolla hypocrateriformi maxima. Encycl.

Habitat in Domingo

Folia ~~acuminata~~ ^{interdum} Pedunculi axillares petiolo ^{interdum} crassiori uniflori
interdum ² 3 flori. Calyx brevifolius 3 exteriora longiora acuta
interiora ^{oblonga} ~~obovata~~ ^{obliqua}. Tubus longus crispis aequalibus. Lacinis
diametro spollioni La Mark

f. bona non caule aculeato herb. Vahl.
subtriflorus

forte Ipomoea nortii Americana herb. Thourin

~~non est~~

undulata ² Eugenia ¹ foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabri ²⁷ subundulatis, pedunculis lateralibus unifloris aggregatis.

Eugenia undulata foliis ovato-oblongis, acuminatis; fructu parvo, rubro, oliviformi

Aubl. fl. Gu. pag. 508. Tab. 202.

Habitat in Guiana Cayenne & V. Robr.

Rami inferne teretes, superne alternatim compressi, cortice griseo, glabri, uti reliqua

partes planta

Folia ^{supra neri} petiolata, opposita, tri-vel quadripollicaria, sesqui pollicem ^{glaberrima} lata, venosa, obtusiuscula, late vincta, perforata, obtusiuscula

Petioles triquetri, fusci, vix unguiculares.

Pedunculi supra cicatrices foliorum, ^{quatuor septem,} infra foliorum deciduorum, ²⁷ semiunguiculae, uni flori, fusi. Bractea duo, parva ad basin calycis, subrotunda, par

Calyx quadrilobus.

Corolla tetrapetala.

germen oblongum, glabrum.

Eugenia Trinervia, foliis ovatis Trinerviis glabris, racemis ^{oppositis} axillaribus solitariis:
infrafoliaceis geminatis.

Habitat in Guyana non Probo 7

Rami inferne teretes, superne compressi, ope lentis villosi.

Folia superne versus apices ramorum, petiolata, opposita, saepe quadripol-
ticaria, ovata, acuta, integerrima, utrinque glabra et subnitida, ope
lo armata punctata, Trinervia, venosa, subtus pallidiora, venis
nervis evidentioribus.

Petiole breves, basi unguiculares, subvillosi.

Flores racemosi: Pedunculi axillares solitarii, folio dimidio breviores: infrafoliacei, tri-
pollicares, oppositi utrinque gemine ad circulaem cicatriculam, alter
robustior et basi saepe utrinque ramulo; omnes compressi, subvillosi.

Pedicelli remoti, oppositi, unguiculares, patentis sicuti triflori.

Bractea linear-lanceolata, decidua, basi persistens.

Calyx basi incanus: laciniis quatuor, subrotundo, ~~extus~~ ^{extus} adpresso
punctis pluribus elevatis.

Petala oblonga, integerrima.

Germen villosa-incanum

Bigonia mollis foliis ternatis subcordato-oblongis utrinque pubescentibus, panicula terminali.

Bigonia tomentosa: scandens, trifoliolata, nudo-hirsuta: folioli
amplis, subcordato-ovatis utrinque tomentosis: panicula
terminali multiflora: floribus parvis Act. Soc. hist.
nat. Paris. Tom. 1. pag. 111.

Habitat in Cayenna, von Prokr 5

Scandens.

Rami pube brevi ~~et~~ ^{sub} flavo-~~viridate~~ ferrugineo ^{mollis}, inferne teretes;
superne alternatim compressi

Polystachya Eugenia foliis amplis oblongo ovatis longe acuminata
et imperceptibili pube, fructis axillaribus et terminalibus
plurimumque geminis laxe floris longis Act. Soc. Sci. Paris. 1. pag
110
Habitat in Amer. merid.

non vid.

multiflora Eugenia dumosa ramosissima glaberrima foliis par-
vulis ovatis sensim in acumen obtusum saepe depresso-
paniculis pedunculatis axillaribus et terminalibus in
omnibus ramulis Act. Soc. Bot. h. n. Par. 1. pag. 110
Habitat in Amer. merid.

non id.

bracteata Eugenia ramis villosis foliis subsessilibus sub lanceolatis
ovatis fusum angustatis pubescentibus; bracteis coloratis & coram
singulum sessilem involucentibus Act. Soc. h. n. par. 1. pag.

110

Habitat in Am. merid.

non redi

fallax Eugenia foliis petiolatis oblongiuscule ovatis acuminati
promis, obtuso planis lucidis subnerviis, paniculis termi-
nalibus, fructibus immaturi ovatis maturi globosis aut. for-
h. n. Part. 1. pag. 110
Habitat in Amer. merid.

non vid.

3.6 punctata [pedunculis oppositis trifloris;
Eugenia foliis oblongis utrinque punctatis, pedunculis oppositis trifloris
Fapula St. Crucis
Habitat in America Dr von Rohr & Dr West

Litr. N.
pag. 65.

Rami teretes, alterni, inferne cortice cinereo, superne purpurascens,
punctis elevatis adpersi.

folia opposita, petiolata, pollicaria vel ultra, oblonga, obtusiuscula,
glabra, rigida, plana, integerrima, subtus pallidiora, utrinque
punctata: tenella sericea.

Petioles breves.

Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, longitudine foliorum, punctati
triflori. Flores laterales pedicellati, intermediis sessilibus: 15^{na} Species
duo sessilibus ad basin lateralium.

Calycis lacinae quinque, subrotundatae, punctatae.

Petalae quatuor, ad lentem tenuissime ciliatae

Cum tantum varietas Myrti fragrantis 2 conveniente in variis, differt
solummodo quod pedunculi in quos quot vidi constanter triflori
sunt, nec terminalis tripartiti pedicellu trifloris in M. fragrantis
folia quoque longius petiolata quam in illa. Fructum non vidi
ex auctoritate inventorem huius retuli.

undulata Eugenia

inter americana

Castrohaynesii Eugenia pedunculis ramosis axillaribus Galyc. sup. Amer.
July 1773. leaf 53

non vidi

mini Eugenia racemis axillaribus ter menalibusque, foliis lanceolatis gla
bris pellucidis-punctatis Aubl. fl. Guian. 1. pag. 490. Tab. 197
Habitat in Guiana

non vidi

obliqua M. foliis alternis, oblongo lanceolatis inaequaliter lobatis

Habitat in Nova Cambria

non vidi

aquea. Eugenia pedunculis quadrifloris, drupa sive loculari R
Rumpf amb. 1. tab. 30. fig. 2.

non vidi

Luciens

M. foliis lanceolatis etnque acuminatis ovarius crenatis, floribus
terminalibus congestis subsessilibus. Forst. fl. austr. p. 30. no 216

no. 216.

Catipolia Euz. pedunculis unifloris axillaribus, foliis ovatis acutis rigidis pellucidis.
punctatis Aubl. fl. Guian. 1. pag. 502. Tab. 199.

Habitat in Guiana.

non ordi

~~Sycamore~~ M

banensis Eugenia

Eugenia banensis Jacq. am. 153. Coll. 3. pag. 103

Habitat in insula Ban prope Carthagenam 5

Tota glabra ramis Cortex cinereus. Strius fusis. Ramis oppositi
et alterni. Folia opposita lanceolata, vel ovato-lanceolata, bre-
viter petiolata coriacea nitida obtuse acuminata bipollicaria
Pedunculi axillares et alii et ceterum foliorum proventoria
brevi simpliciter uni flori aggregati alii racemosi. bractea ad
pedicellum minuto. Calyx 4 partitus deciduus laciniis subrotun-
dis concavis apice purpurascens 2 bus oppositis latioribus.
Petala 4 calycis orbe longiora. Stamina corolla parum longio-
ra. Drupa globosa non coronata nitida nigra magnitudine
nucelli loculari. Nuc globosa glabra Jacq.

Guianensis E. foliis oblongis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus
subtrifloris

Eugenia Guianensis foliis ovatis obtusiusculis, subpetiolatis, pedun-
culis solitariis ^{et} trifloris, fructu monospermo Aubl. fl.
Guian. pag. 506. Tab. 201.

Habitat in sylvis Guianae

Frutex ramis teretibus. Folia opposita petiolata pollicari
glabra utrinque punctata integerrima rarisime obscure emar-
ginata, obtusissima, basi acuta venis tenuissimis venosa. Pedun-
culi axillares solitarii, terminales plerumque gemini foliis
brevioribus triflori.

foetida C. foliis lanceolato-oblongis attenuatis obtusis glabris, ^{racemulis} floribus axillaribus brevis
simis

Habitat in insula St. Crucis in Olyge et West.

Rami teretes, virgati, cinerei, glabri: ramuli subvillosi, tenuibus
foliis breviter petiolato, opposita pollicaria, glabra, integerrima vix
venosa, oculo armato subtili punctata et pallidiora.
Racemuli omnium brevissimi, oppositi. Flores parvi

sedes de West ad Eug. retuli.

aromaticus Caryophyllus Lin. S. V.

Sonnerat Voyag. a Canow. Ju. p. 196.

4. 119.

Caryophyllus Plief. exot. 16. Rumph. amb. 2. p. 1. 4. 1. 2. 3.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo Bauh. pin. 416

Caryophyllus aromaticus ind. orient. fructu clavato

monopyrene Plukh. alm. 10. 4. 154. fig. 1.

Habitat in moluccis, solo andosimo 5

Solia petiolata, opposita, lanceolato-elliptica basi attenuata acuminata, integerrima, trans versa nervis numerosis tenuibus
fimis

Solia lanceolato elliptica acuminata integerrima floribus
virescentibus

Longifolia E. foliis ellipticis-lanceolatis integerrimis glabris, racemo terminali
Habitat in Insula Francia

Rami teretes glabri.

Folia breviter petiolata, pithamora, basi versus parum angustata
obtusè nervosa venosa, nervi marginem laud attingentes. Pedun-
culus terminalis foliis triplo brevior. pedicelli oppositi subtus
convexi supra plani ut unguiculati sed flore articulati. Flores
magnitudine E. pambos cui simili at folia multo latiora
nec attenuata.

Gambos E. foliis integerrimis, pedunculis ramosis terminalibus Cu
Pl. Zeyl. 1004

Pepi: osiculo fructus malaccensis ex candido rubescens. Bauh. pin. 441.
Malacca Schambe Rhed. mal. 1. p. 27. t. 17.

Gamboja sylvestris alba Rumph. amb. 1. p. 127. t. 39.

Habitat in India

Rami teretes, glabri, cortice griseo-ferrugineo subrimosis. ^{breviter} folia petio
lata, opposita, quinque pollicaria, subionacea, glaberrima
supra sulco longitudinali secundum costam subtus venosa vix
armata punctata. Racemus terminalis subsessilis sex florus
pedicelli oppositi glabri sub flore articulat semiunguiculares
calycis lacinae margine membranaceo tenuiore

caucolatis attenuatis, racemo terminali

malacensis foliis integerrimis, pedunculi ramosi laterales

2 Nanis Hambu Rheed. mat. 1. p. 29. v. 10.

1 Persi i osculo fructus malaccensis rubens Bauh. pin. 241.

Tambofa domestica Rumph. amb. 1. p. 121. v. 37. 30.

Habitata India herb. 4us f

Rami teretes superne compressi, uti reliqua partes glabra, oppositi
folia opposita, ^{alternis} petiolata, spatulata et ultra, membranacea ellipti-
ca lanceolata, attenuata, acuta, integerrima, basi versus semper
angustata, basi subovata, venosa. Pedunculi ex apice ramorum
solitarii cernentes quinqueflori. Pedicelli oppositi uniflori

andropomoides

obtusata Eugenia foliis ovato-oblongis acuminatis obtusis firmis sub sessilibus
axillaribus terminalibusque.

Habitat in Tava Commerçon Thouray.

Glaberrima. Rami teretes folia vix petiolata, opposita palmata
basi sine parvo emarginata, integerrima fere glaberrima supra
sulco longitudinali, transverse nervosa subtus nervo s. subvenoso
nervi marginem non attingenti. Pedunculi axillares saltem termi-
nales terni vel quatuor folio dimidio breviores. pedicelli oppositi
sex vel septem.

acutangula L. foliis crenatis; pedunculis terminalebus; racemi oblon-
gii acutangulis Cen fl. cycl. 1904

Theni-Sampradi Rheed. Mat. 4. p. 51. t. 7.

Butonica Verredis ubra Rumph. amb. 3. p. 101. t. 115.

Habitat in India

Solia alterna glauca virens. Racemi longissimi ex axillis
ultimis. Similis racemosa et floribus minoribus et fructibus
diversa

— serratis, racemi axillaribus longissimis

racemosa L. foliis crenatis, racemis longis pennis, pomis ovatis quadran-
gulis Lin fl. Zeyl. 1914

Sam. Travadi f. Cai bathiambu Reed. Mal. 4. p. 11. t. 6.

Butonia sylvestris alba Rumph. Amb. 3. p. 101. t. 116.

Habitat in India t

~~Folia ad~~ Rami glabri. Folia brevifera ^{pallide viridia} petiolata, ad apicem ramo-
rum, approximata, alterna lanceolata-elliptica subtriangu-
la attenuata serrata, basi mucosus integerrima, serraturis apice
fuscis, venosa, glaberrima, racemis ^{ad} apicem squipedalis
pedicelli breves alterni vel oppositi

ferratis lanceola elliptica subtriangata

nitida Eugenia foliis lanceolato-oblongis attenuatis nitidis, ^{glabris} racemis
terminalibus compositis
Habitat in India occidentali 5

Rami teretes cinerei. Folia opposita petiolata bipollicaria
integerrima, obtusa, basi acuta, utrinque venoso-reticulata
subconvexa supra nitida, impunctata, Racemus terminalis erectus
floris in pedunculatis parvis ad apicem confertis parvis calycibus

unifloro & foliis integerrimis cordato-lanceolatis, pedunculis unifloro
lateralibus Lin. S. V

Eugenia indica, myrtifolio deciduo, flore albo, fructu suave rubenti
molli leviter sulcato et odore Mich. gen. 226. t. 100.

Myrtus indica, foliis nigrescentibus latis ac recurvis parum odoratis
Till. per. 117. t. 44.

Habitat in India t

Rami teretes punctati, glabri folia breviter petiolata, opposita
glabra, bipollicina, venosa attenuata obtusa. Pedunculi gemini
e gemma distincta axillari cum ramulo, filiformes foliis breviores
punctati abscissati, corpusculum subperthulatum angustum semunqui
culare patens ad basin singuli pedunculi

ovato-oblongis attenuatis
folio brevioribus

Plum petiolata et } hinc eadem non diversa specie
Myrtus brasiliensis

mollis trifolia

Tomentosa Eugenia foliis ovatis subtus tomentosis, pedunculis axillaribus unifloris

Habitat in Insula Franciæ

Rami subtetragonis tomentosi

Folia petiolata opposita, bipollicaria ^{potentia} integerrima, margine ciliata
subinaevis supra levissima, glabra, subtus molliter villosa tomen-
tosa, juniora utraque villosa supra etate glabra

Petioles subpollicares tomentosi

Pedunculi axillares oppositi longitudine foliorum, tomentosi

Calyx ~~longe~~ molliter tomentosus villosus folioli oblongis, intus glabri, fundo

cinereo villosi

Cordifolia Eugenia foliis cordato subrotundis, pedunculis axillaribus unisporis folio

~~long~~
Habitat in Insula Francisco;

Rami teretes, glaberrimi cinerei; ^{apice} laves ^{integerrime} superne compressi
Folio subpetiolato, opposito pollicari, fere latiora quam longa, margine
reflexa, glaberrima, ~~integerrima~~ ^{superius} pallida venosa

Pedunculi oppositi, sesqui pollicares.

Calycis foliola ~~ix~~ semiunguicilana rotundata.

^{lanceolata}
Eugenia foliis lanceolato oblongis, obtusis, pedunculis lateralibus
terminalibusque oppositis unifloris

Habitat in Insula ^{Globu}Francis

Rami cortice cinereo apice angulato compressi gl.

Folia petiolata, pollicaria, oblonga vel lanceolata, integerrima mar-
gine reflexa, glaberrima coria subtus pallida

Pedunculi ut in ovalifolia ad basin ramulorum infra folia
Calyx turbinatus, cinereus villosus

ovalifolia Eugenia foliis ovalibus emarginatis, pedunculis lateralibus, ^{unifloris} ramis

dichotomis

Habitat in Insula Franco 7

Rami teretes, perenne compressi venis glabri

Folia petiolata, opposita patentia, pollicaria, integerrima margine reflexa

Costa benigna, subtus pallida.

Strobili purpurascens

Pedunculi in ~~caespitibus~~ primis terminales, demum laterales in ramis extre-

mitatis, unguiculares, pubescentes

germen turbinatum.

Calycis foliola rotundata coracea

emarginata E. foliis ovalibus alternis glabris, floribus axillaribus solitariis
Habitat in insula St. Crucis de West.

Rami teretes, alterni, glabri, cortice cinereo

Folia petiolata alterna, ovali-oblonga, sesqui-polliciana, integer-
rima, emarginata, utrinque venoso-subreticulata, glabra, subtus
pallidiora, supra nitida, rigida et pila.

Petiolus se minus quadratus.

Peduncululi axillares, solitarii, longitudine petioli, uniflori

affinis Cay. cotinifol. Jacq. at folia alterna.

Cotinifolia E. foliis ovatis obtusis integerrimis, pedunculis unifloris
Linn. Mant. 243. & L.V. p. 461. Jacq. obs. 3. p. 3. v. 53.

Habitat in Capenna

Caeterum cinereus glaber. Folia numerosa obovata, obtusissima rarius
emarginata, coriacea splendens glabra, breviter petiolata. Pedun-
culi uniflori tenues, pollicari solitarii bini vel terni Jacq.

Pseudopidium L. foliis integerrimis, pedunculis unifloris plantis caetera
libris terminalibusque Faequ

Habitat. in America
arbor vixit in ped. aliis. Folia lancicolato ovata, ciliata, integerrima,
nitida, breviter petiolata, opposita, lutea venata, 3-4 pollicaria
Pedunculi ^{gemmae} ~~gemmae~~ aggregati, pollicares. Faequ.

lancicolato-ovatis pedunculis axillaribus terminalibus aggregatis
unifloris

pubbiflora E. foliis oblongis integerrimis obtusis pedunculis axillaribus solitariis

ternisve subternifloris foliis longioribus

Habitat in Madagascar Commercio Thourin

Rami teretes grisei glabri. Folia opposita breviter petiolata, pollicaria utraque punctata suborbata vix venosa, obtusa, submarginata plana. Pedunculi axillares vel ad basin ramulorum oppositi, foliarii gemini vel terni sesquipedicellares uniflori vel biflori floribus alteris sepius. Calycis glabri

G. phylla
sepidiflora

foliis

Eugenia floribus, terminalibus geminis subsessilibus
Habitat in Insula Franciae

Rami teretibus oppositi, cinerei glabri, apertylla.

Folia terminalia duo opposita subsessilia vel brevissime petiolata, ovata
subrotunda interdum ovalia, tri-lobata, margine parum reflexa inter
gemino nitida, glaberrima, subtus pallida venosa

Flores terminales geminis subsessiles.

Calycis lacinae 4 vel 5 oblongo cordatis emarginatis

Fructus corollae cinereo villosus.

5-6 Sespli flora Eugenia floribus ^{Eugenia} lateralibus sesplibus, foliis oblongis integerrimis
nitido subtus punctatis.

In Insula St. Crucis legit Dr. West.

Rami erecti, glabri, cortice cinereo, superne foliosi, inferne ^{serme} ⁱⁿ ^{triste}
folia opposita, brevissime petiolata, sesquipollivaria interdum
bipollivaria, sesquipollivem saepe lata, integerrima, margi-
ne parum reflexa, utrinque venoso ^{reticulata} glaberrima, supra nitida
sub impunctata, subtus puncta pallidiora adpersa punctis
numerosis ^{sub} ^{superficientibus}:

Flora infra folia, sesplis, solitarii ^{saepo} vel plures, oppositi.

Calyx coriaceus, lobis oblongis, extus canescentibus, ^{sub} punctatis.

Fructus magnitudine Cerasi Prunae, globofus, punctatus.

ramiflorus Eugenia foliis ovali-oblongis subsessilibus glabris, ^{membranatis} floribus aggregatis
infra foliaceis

Habitat in insula St. Crucis de West. 5

Rami teretes, glabris, deflexo-patentibus sumis, cortice cinereo. ramuli e caps

^{foliorum subnodosi}
Folia vix petiolata, opposita, pollicaria vel parum ultra, utrinque
punctata subtus pallidiora, nervi tenuissimi subcostati, obtusis sumis
marginibus venis reflexo, obscure venosa.

Floris minutis ramis infra foliis aggregatis

Cuneifolia Eugenia foliis cuneato oblongis integerrimis glabris

Guianensis E. foliis ovato lanceolatis acuminatis, ^{acutis} floribus axillaribus
terminalibus sessilibus

Eugenia Guianensis foliis ovatis, acuminatis; floribus sessilibus con-
gestis, terminalibus et axillaribus; fructu rubro, Insupermo Aubl.
fl. Gu. pag 501. Tab 198

Habitat ad ripas fluvii Guianensis &
Rami elongati teretes glaberrimi supremi cortice cinerei
ramuli purpurascens. Folia vix petiolata membrana
ca venosa, glaberrima, palmata integerrima basi acuta
flori 4 ^{vel} pentapetali Aubl.