

Euonymus

1. Americanus E. floribus omnibus quinquefidis, foliis serratis, ramis tetra-
2. latifolius E. ^{gonis} floribus plenis quae pentandris, cortice lavi, pedunculis filifor-
mibus teretibus multifloris
3. europaeus E. floribus plenis quae tetrandris, pedunculis compressis multifloris,
stigmatibus subulatis, foliis glabris
4. Vernicosus E. floribus tetrandris, cortice vernicoso, pedunculis filifor-
mibus teretibus subtrifloris
5. atropurpureus E. floribus omnibus quadrisfidis, ramis glabris, foliis pectis
latis acutis
6. Japonica E. floribus quadrisfidis, foliis ovatis obtusis serratis subinor-
dis, panicula trichotoma
7. tobius E. floribus 5fidis, foliis oblongis integerrimis ramis alternis
pedunculis aggregatis terminalibus unifloris

187 (O. alternifolius L. foliis lanceolatis pinnatis acuminatis alternis.
y. colypon. foliis obovatis serratis, floribus paniculato-corymbosis
Ad bina oleo loco quocumque

americanus L. floribus omnibus quinquefidis, foliis septilobis Len. t. V
Rhus virginianum, folio myrti Com. hort. 1. p. 157. t. Pl. Raj. d. endr 57.

Euonymus virginianus, per rai antho foliis, capsula verrucosam
infra serrata Pluk. alm. 139. t. 115. fig. 5.

Habitat in Virginia

Rami acute tetragoni glabri. ^{perulati} Folia ovato oblonga ^{perulati} coronata nervosa
bipollicaria et ultra

ramus tetragonis

Linnaei *Trionymus* foliis 3lobis, pedunculis multifloris, caule scandente
Lour fl. Cochinch. pag 156.

Habitat Cantone Siamum

Caulis herbaceus cirrhis scandens. folia cordata: lobi laterales
obtusi, denticulata apice. floris albi. Petala squae oblongo-orata
Bacca utrinque attenuata 10 gona 1 loculari praepolyperma
evalvi semina ovata, compressa, calyptra fuli ope vestita

non vidi

Europaeus E. floribus plerisque quadrifidis, floribus sesquialibus Lin-hyppel.

p. 154. f. v

Cucurbitaria 2. Claf. herb. 1. p. 57.

Cucurbitaria vulgaris grana rubentibus Bauh. pin. 4 28.

Habitat in Europa sequitur

Europaeus Cucurbitaria floribus plerisque tetrandris, pedunculis compressis multo
floris, stigmatibus subulatis, foliis glabris

Rami oppositi compressi folia elliptica utraque acuta, venis
me femelata. Pedunculi axillares bi-quadriflori

Latifolius *Euonymus* floribus plerisque pentandris, coticis lavi, pedunculis feliiformibus
tardibus multifloris Hort. kew. 1. p. 273.

Euonymus latifolius: floribus plerisque quinquefidis, capsulis alatis
angulatis in pedunculis foliis longioribus *Laque* L.V. p. 236. *Fœnum*
fl. austr. 3. t. 204

Euonymus l. f. *latifolia* Clus. hist. 2. p. 56.

Euonymus latifolius *Bauh.* pin. 420

Euonymus europæus β. *lea* *Spee.* pl. p. 206

Habitat in *Pannonia* 7

per petiolum vix decurrentia

Rami glabri. Folia petiolata opposita oblonga acuminata, glabra
venis sine serrulata. Pedunculi axillares longitudine foliorum
bifurcati

Vernucopus E floribus omnibus quadrifidis ramis vernucopi L.V. p. 230. x

Paëqu. fl. austra. 1. t. 49. Scop. fl. carn. n. 260.

Euonymus europæus V. Cernuus Lin. Suppl. p. 154

Euonymus secundus Clus. hist. 1. p. 55.

Euonymus flore phoeniceo Bauh. hist. 1. 2. p. 203.

Habitat in Carniolo rupibus asperis 5

vernucopus E. floribus Tetrandris, cortice vernucopo, pedunculis feli formibus
varietibus subtri floris Hort. kew. 1. p. 273

Rami teretibus. Ramuli oppositi compressi uti rami adpressi
versuti supis numerosi folia ovato oblonga bipollucaria ut
acuminata serrata glabra pedunculi axillares folio longio
seu biflori vel dichotomi pedicelli triflori floribus pedicellatis
floribus dichotomia

japonicus & floribus quadrifidis, foliis ovatis obtusis serratis Thunb.

Le. jap. 1004 p. v. p. 230. prot. fasc. 5. p. 790
199. Hierog. rom. p. 100. p. 790
Eunonymus japonicus floribus quadrifidis, foliis elliptico ovatis
serratis obtusissimis Len. Suppl. p. 154 *

Habitat in Japonia

Rami teretes oppositi. ramuli decussati breves foliosi. Stipulae in
ultimis ramis oppositae, integerrimae approximatae petiolo, crassa
subtus pallidiora, ^{obtusae} nervosa glabra, pollicaria. Stipes axillares
paniculati. Panicula trichotoma decompakta, divarica
ta, subsessata. Pedunculi compressi.

Panicula trichotoma

subconiciis

alternifolius L. foliis lanceolatis serratis acumatis alternis

Habitat in Cap-6-pei 7

Rami alterni compressi striati teneri. Folia petiolata utraque attenuata sesqui pollicinari, mucronata utraque glabra subtus pallidiora venosa. peduncululi axillares ceteri tres breves uniflori. Flores minuti fructus glaber

an Celastri vel Bhamani frondosus

ethi

Atropurpureus E. floribus omnibus quadrisidis, ramis glabris, foliis petiolo
tubo acuto L. V. p. 230. Jacq. hort. 2. t. 120.

Atropurpureus floribus Tetradis, pedunculis compressis multifloris, sty-
matibus Tetragonis truncatis Hort. kew. 1. p. 274.

Habitat in ameno septentrionali

Rami teretes, glabri, apice compressi. Sola ovata lanceolata
acuminata utraque glabra opposita tenuissime serrata
cum margine purpureo petioli rubentes. Petala 4 subrotunda

Atropurpurea Jacq.

Tobira & floribus quinquefidis, foliis oblongis et usis integris Thunb. fl.

Jap. p. 99 + S. V. 230.

Tobira f. Tobira varius Kompp. Am. S. pag. 796. fig. 797.

Habitat in Japonia &

Caulis erectus, fruticosus ramifus rami alterni glabri foliosi rami
alterni. Folia in ultimis ramulis, aggregata alterna opposi-
taeque, petiolata integerrima, supra viridia subtus pallida
reticulata marginibus reflexis, crassifolia subbipollicia-
ria, glabra. Flores in apicibus ramorum aggregato subum-
bellati. Pedunculi uniflori raro dimorphi pubescentes erecti

pedunculi aggregati terminalibus unifloris.

ramis alternis

integerrimis