

Eupatorium

placet usque hanc martini in paco hab. sub benedico repentur in paltor

Sophocledium

Caules plus pedales, erecti, globis superius ramos. Calyx luteo umbri-
catus: filulae aequantibus. 13. villosa maturitate reflexa.

integerrimum Eupatorium foliis ovatis triplicinerviis obtusis integerrimis
glabris, ^{flor} ~~compositis~~ compositis, caule fruticoso

Habitat in Martinica. 3

Rami teretes, crassitie fere penno arsenino, cinerei, & uperna villosi
to tomentosi. Folia petiolata, frequentia, sesqui polliciana, nervi
tantum villosi, subvenosa, obtusis pallidiora punctata. Calyx
cylindricus: ~~foliola oblonga~~ ~~compositi~~ ~~terminales~~. Pediculi ter
minales, ^{ramis} ~~plurimumque~~ ~~quatuor~~ semipollicares villosi ~~serotini~~ ~~et~~
cum serotinis canescentes: pedicelli tres vel quatuor, plerum
que triflori. Flores subsessiles. Calyx cylindricus: foliola
oblonga, obtusa, flavescens, apice virescens, subpubescentia
striata. Plosculi quatuordecim

int egnifolium Eupatorium ^{triplicineris} foliis ovatis obtusis integerrimis & lobatis, caulis
fruticosa corymbis com

Eupatorium foliis sagittato subhastatis trinerviis basi dentato-angulatis caulique scandente glabris, corymbis compositis
attenuati
Habitat in Guinea

Caulis tenuis ramosus. Folia petiolata, opposita, sesqui pollicaria, basi dente uno alterove angulata, juniora integerrima, vix venosa. Pedunculi ex apice ramorum, filiformes: pedicelli fastigiati. Calyce simplex. Corollula tres. Semina tetragona. Pappus purpureo-scissus.

in usu de
minata

~~lineatifolium~~ ~~Euph.~~ foliis linearibus integerrimis tubere & u. illatis
calycibus subyueque floris Walt. Car. pag. 144
Habitat in Carolina

Non Ed.

integrifolium Cephaelorum foliis ovatis integerrimis obtusis glabris, corymbis ver-
minalibus

Habitat in Guadeloupe Fruct 5

Caulis erectus, fruticosus: rami tenuis, superne tomento tenui vesti. Stem petiola
40, bipollicaria, triplinervis, simpliciter venosa, subtus oculo armato
excavato-punctata. Petioles canescentes. Pedunculi et apice ramulorum
et ramorum, plerumque quadrati. Calycis cylindrici, imbricati: foliis
oblongis, pallidis, nervis tribus viridibus notatis.

codinifolium Lycop. foliis ellipticis mucronatis integerrimis glabris
Trinervio, floribus corymbosis ^{caulibus fructuosis} Wed. Phyt. pag 11. Tab 7. fig. 1
Habitat in India orientali 7

unicum *Eupatorium* foliis ^{subhombis} ovatis profunde serratis cauleque pilosis, corymbis

lateralibus terminalibusque simplicibus paucifloris

Paraguay daphnifolia diffusa; diffusa natula et subprocumbens, foliis subcor-
datis incisio dentatis, floribus sparsis paniculatis Act. bot. holl. nat. par. t. p. 112.

Habitat in America meridionali v. Roder. et Richard.

Caulis herbaceus; teres, ramosus, puberulus folia longe adpressis pilis
raris albidis ^{articulatis} ~~conspicuis~~. Folia breviter petiolata, opposita, altera ~~longiora~~ ^{longiora} ~~longiora~~ ^{longiora}

4 In quinque acin pollinaria, facie utriusque dicitur, opposita, attenuata, serraturis utrin-
que quatuor ad septem, basi apiceque integerrime six venosa,
obscura trinervia. Pedunculi apice diphylli, elongati, later axillares
oppositi; terminalis terni, intermedii brevior aphylli: pedicelli
tres - sex, filiformes, uni flori vel biflori: flores pedicellati. Calyx
late subimbricatus: foliola lanceolata, acuta, striata, pallida fl-
vescentia. Corollula tringinta purpurea. Pappus subplumosus

Eupatorium foliis alternis lanceolatis integerrimis subtus incanis,
Corymbi terminales supra decompositi
Habitat in Madagascaria Commerson. Ex herbario Turcico

Rami incani, angulati. Folia petiolata, bi- & tripollicaria, utriusque
acuta, supra glabra, axilla, & subtus a venis tenuibus, incana
nervoso-venosa. Pedunculis terminalis fere & pithamou, parciales
alterni, in ramos dichotomos divisi, compressi, incani. Calyx
cylindricus, ante imbricati, glutinosi; foliola oblonga, obtusa, fave
scentia, apice fusca. Corolla lacinis. Pappus calyce longior, Semi
na apice calyculo coronata, & superius margo pappus calyce longior
dentatus, albidus

forte propria generis

Melissofolium Eupatorium

Habitat in Peru herb. frug.

Caulis ramosus, teres, villosus. Folia opposita, bipollicaria, oblonga, basin versus sensim paucum attenuata, venosa, grosse obtuse serrata, supra glabra, subtus villosula. Pedunculi ex axilla ramorum et axillis supremis: pedicelli brevissimi. Flores fasciculati. Calyces cylindrici, simpliciter villosi; folioli linearibus. Floruli siue

Eupatorium melissofolium: foliis oppositis ovatis crenatis & ciliatis; floribus. Hb. K. g. fasciculatis La Mart. Dict. bot. 2. p. 411.

Balicianum

Eupatorium foliis lanceolatis petiolatis extorsum serratis, subtus
reticulato villosis, corymbis axillaribus terminalibusque decompositis
Eupatorium Balicium; foliis oblongo lanceolatis superne rarer den-
tatis, supra glabris et nigosis, subtus tomentosis La Mart. dict. bot. 2p409
Habitat in Peru. Ex herbario Fusioi

Caulis erectus, crassitie penno Cygnas, obscure tetragonus, superne
villosus. Folia quadri vel quinque pollicaria, basi a medio ad apicem re-
mote serrata, supra glabra, venisissime venosa. Petioli unguiculares,
villosi. Corymbi foliis longiores. Calyx laxo imbricatus: foliola oblon-
ga, obtusa, villosa. Flocculi undecim

Regina Catalina

Habitat in Perù herb. Jusf. 5

Caulis fruticosus: ramis teretibus, glabris, confertis, ternis vel pluribus, subarticulatis, glabris
tuberculatis & cicatricibus. Folia subreticulata, frequentia, semipollicana, lanceolata,
basin versus attenuata, acuminata, acuta, glaberrima, arena, enervi, integris
nervi, subconata. Pedunculi a supremis axillis, alterni, approximati, uniflori,
superne squamati. Calyx polyphyllus. 8. Costulae plures. Pappus simplex
receptaculum

amygdalinum Eupatorium foliis lanceolatis ^{suboperculatis} glabris est hirsutum dentatis, comybis
Simpliatur.

Eupatorium amygdalinum; foliis oppositis oblongo-lanceolatis ~~subdenta~~
tis glabris tessilibus La Mart. dict. bot. 2. p. 400

Habitat in Peru. Ex herbario Tussiori

Caulis erectus, ramosus, teres. Tota tri-quadri pollicaria, inferne inte-
germina, extusum basi remote dentata, subconiacea, venosa, su-
periora obtusa. Pedunculus superne, elongatus; post pedicelli oppositi,
bi pollicares, patentes. Calyx acuta imbricatus: lobata linearia, villosa,
acuta, villosa. Flosculi plures duodecim ad quindecim

Serratula

Faeca orientalis, folio pinnato subtus tomentoso, flore purpureo Tournef.

Cor.

Habitat in oriente herb. Græc.

Caulis erectus, ramosus. Folia decurrentia, superiora semidecurrentia, bis
tripollicaria, lanceolata, acuta, superiora integerrima, inferiora medio
dente uno alterove subpinnatifida, ad altera supra glabra, subtus tomen-
tosa, incana, uti cauli. Pedunculi terminaliter, uniflori, in cakis, folio
uno alterove parvo instructi remotissimis. Calyx magnitudine Compositi
imbriatus, tomentosus. Squama exserta, attenuata, inermis. Pappus
rigidus, dentatus. Corollula purpurea
an ^{Col. anodis} Cynaroides Linn.

videt
v. ha. pont. t. 27. Vall.

melissofolium

⁶
Eupatorium foliis oblongis sessilibus obtusa serratis subtus villosis, pedunculis axillaribus terminalibusque florum fasciculatis
Eupatorium melissofolium; foliis oppositis ovatis crenatis sessilibus, floribus oblongis fasciculatis La Mart. Dict. bot. 2. p. 411.

H. Dombey

Habitat in Peru. Ex herbario Gussonei

Caulis ramosus, teres, villosus. Folia bipollicaria, basin versus sensim attenuata, grosse serrata, venosa, supra glabra. Pedicelli brevissimi. Calyx cylindricus, simplex, villosus: foliola linearia. Flosculi quinque

ramosum ^{L. pentagon}
foliis lanicolatis dentatis glabri Scapo ramofo calycibusque
pilosus.

Habita in oriente Forst

Folia radicalia copiosa basi parum attenuata subpeltata bi
pollicaria inequaliter denta dentibus apice cartilagineis
scapus palmari ramo uno albore foliolum su lineare ad
basi ramorum. Semina strata apice dentibus minutis
filicuta. Pappus stipitatus simplex

Spicatum Eupatorium foliis lanceolatis dentatis villosis ciliatis; floribus
terminalibus spicatis

Eupatorium spicatum, foliis oppositis linearibus spatulatis superne ca-
viter dentatis, spica terminali, floribus sessilibus glomeratis La-
marck. dict. bot. 2. p. 409.

Habitat in monte video Brasilia Commerson. Ex herbario Fuspidi.
Caulis erectus, ramosus, buliatus, angulatus, superne sub can-
escens. Folia ^{opposita} pollicaria, basi in petiolum attenuata, remote dentata
superne versus integerrima, enervi, a venia, utrinque villosa,
statae glabra. Spica ^{redunculata} cylindrica, sesquipollicaris, crassitie pollicis
Flores infime duo pedicellati, pedicello unguiculari, laniscenti, pe-
lypi sessiles, conferti. Calycis foliola oblonga, obtusa, villosula,
exteriora apice fusca. Strobili plurimi.

~~Prenanthes
Prenanthes ¹⁰ Vaill. art. Panf. 1721.
Habitat in Canada herb. Guss.~~

~~Caulis erectus. Folia radicalia longe petiolata, ternata: foliola glabra, pithamida,
subpetiolata, lateralibus bifida, intermedium longius trifidum; lacina ovata, mucro
nimis acuti remotissime dentatis: caulina ovata, subpetiolata, superiora pol-
licaria, mucronata, integerrima, per petiolum decurrentia, obscure venosa. Cloni.
Prenanth. altissimo~~

Ayapanna Eupatorium foliis lanceolatis triplicinerviis integerrimis gla-
bris, corymbis lateralibus simplicibus terminalibus compositis

Habit et in America meridionali, ante travecam annos mihi me-
sum a Dr. Ditt. Pflug ex insula St. Crucis, suspicor vero quod ami-
cus illud habuit ex horto Dr. v. Roky, cum in plurimis collectioni-
bus inde missis nunquam adfuit

Caulis fruticosus, ramosus, teres, glaber, uti tota planta. Folia
opposita, bipollicaria et ultra, basi attenuata, inferiora subpetio-
lata, acuta, vix venosa. Corymbi laterales pauciflori, termi-
nales multiflori. Pedunculi elongati: pedicelli filiformes, ope-
rentis subpubescentes, foliolis patentibus, foliolum petiolum a basin
singuli. Calyx laxus, basi folioli pauci breviter subalveolatus.
Glossuli circiter viginti

glutinofum ~~Eupatorium~~

Habitat in Penn herb. 4 us. 5

Caulis teres, glutinosus. [†]folia petiolata, opposita, 4-5 pollicaria, cordata, lanceolata,
acuta, grosse serrata, supra globa, elevato rugosa inter venas, subtus lanata, reti-
culata, nervis salvia. Petioli pollicares. Corymbi terminales, decempositi. Pa-
leae oblongae, imbricatae: foliola lanceolata, villosula, multiflorae
Eupatorium glutinosum foliis oppositis petiolatis cordato-lanceolatis serratis rugo-
sis subtus tomentosis La Mart. Dict. bot. 2. pag 408

Eupatorium
tenuifolia *Cacalia* foliis linearibus integerrimis glabris, corymbis latera-
libus terminalibusque simplicibus

Habitat in Carolina Bosc.

Rami teretes, glabri, venues. Folia sessilia, & persa, aut semipollicia
ria, angusta. Pedunculi et pedicelli filiformes, laxi pauciflori. Calyx
calyculatus. Pappus plumosus, sessilis. Semina linearia, & striata

minime *Cacalia*

longata Sc. foliis linear-lanceolatis integerrimis glabris enerviis, caule subramoso
calycis subsimplicis
Habitat in Brasiliis monte verde.

Tota planta pedalis
Caulis herbaceus erectus vel inferne raris uno alterove ~~totum~~ gl. folia
glaberrima radicalia angusta ut basi in petiolum attenuata glauco viridia
venosa palmata caulina ^{semi} ~~simplicissima~~, amplexicaulia, superne sin-
gula angustiora. Pedunculis caulibus et ramorum ^{axillari} terminales elongati
simplicissimi, uniflori ~~separati~~ 2. s. 3. foliacei. folia 2 vel 3 ad basin
calycis breviflora ovata lanceolata. interiora lanceolata fixiter s. radio
breviora, lata in apice membranacea (ideoque non Trizopozon. Pappus
suffus simplex

Eupatorium
nitidum
lucidum

Eupatorium foliis oblongo ovatis trinerviis obtuse serratis nitidis,
Corymbis compositis

Habitat Capeno Richard 5

Erigitur quadri ad novem pedalis, erectus; ramosus: Rami angula-
ti, striati, uti et glabri; ramuli raris albi altiores. Folia
petiolata, opposita, margine crassiora parum revoluta, venosa,
utrinque glabra, nitida, punctata. Pedunculi angulati, pedales
oppositi: pedicelli triflori; flos intermedius plerumque sessi-
lis. Calyx cylindricus: foliola linear-oblonga, obtusa, striata,
ante imbricata, flavescentia. Floresculi septendecim. Pappus denticulatus

melastomoides *Cupatorium* foliis ovatis attenuatis triplinerviis ^{undulatis} ^{glabris} serratis
dentatis rugosis, corymbis simplicibus, calycibus 3-angulis.

Habitat in America meridionali v. Rohr ^{ramuli villosuli}
Caulis scandens? Rami teretes, glabri: folia petiolata, opposita, bi-
trijugata, ramulorum integerrima, acuta, utrinque glabra,
im-punctata, pubescentia venosis & nuda. Corymbi terminales, pauciflori. Pedunculi pu-
bescentes. Calyx laxo imbricatus: foliola lanceolata, striata, exte-
riora pubescenti. Corollula ultra viginti.

linearifolium Eupatorium foliis linearibus ^{alternis} integerrimis glabris, caule panicula
to villosis, floribus racemosis

Eupatorium linearifolium; foliis linearibus integris subverticillatis,
calycibus tri ad quinque floris. Walt. fl. car. 199

Habitat in Carolina Mosc

Caulis erectus, teres: rami frequentes, alterni, erecto-patentes,
filiformes. Folia sessilia, semipollicaria, angustissima, utrinque
acuta, punctata: plerumque folia duo breviora in axillis hinc sub
verticillata apparent. Peduncululi superne ramosi, ex apice
ramorum, pilosi: pedicelli alterni, biflori, folio suff. pedicello
parum longior suffulti. Calyx sub simplex: foliolo glabro exteri
ora ovata, interiora linearia margine subcariosa. Corollula ter no
ad quin

fœniculoides Eupatorium foliis filiformibus, ^{alternis glabris} caule paniculato, floribus
racemosis
Eupatorium fœniculoides foliis compositis linearibus Walt. fl. Car
199.

Habitat in Caronila Mex.

#, pubescentes
Caulis erectus; teres, gracilis & cubus: rami frequentes, erecto-patuli,
filiformes; rudimenta ramulorum ex omnibus axillis. Folia tenuissi-
ma, pollicaria, frequentia, ^{imbricata} ~~asymmetrica~~ ⁱⁿ Racemi terminales: pedicelli
alterni, bi ad sex flori, foliis suffulti. Calyx subimplex: foliola linearia,
unum vel alterum saepe coloratum, obtusa, mucronata. Corollae
tres ad quinque

Verbena folium. Eupatorium folio lanceolato ^{trinervis} sessilibus obtusis obtuse

serratis & ciliatis, corymbis decompositis

Habitat in Carolina Bor.

Caulis herbaeus, erectus, teres, striatus, pilosiusculus, superne
ramosus. Folia opposita, sesquipollicaria, subsimiliter serrata,
obsolete trinervis, ^{immaculata}, ^{iscula} supra glabra, arena, pubes rare villosa, sub
venosa. Corymbi terminales. Pedunculi et pedicelli sparsi,
pubescentes. Calyx subsimplex, pubescens: foliola linearia. Corol
lula quatuor. Semina tetragona, punctata.
Aliud specimen vidi, foliis brevioribus, acutioribus, & ramorum
floralium alternis, veterum similibus

423

Daltonia *Eupatorium folios daltoideum* - ovatis denticatis ramisque villosis,
conymbis simplicibus compactis.

Habitat in insula ~~St. Crucis West Indiae occidentalis~~ ^{St. Crucis}

Caulis herbaceus? Rami teretes, brachiati. Folia pet. ovata, ve
motis v. imo, opposita, patentis v. imo, bi-3-4-tripolliciana, dentibus
utrinque quatuor vel quinque remotis, infimus major, basi et
superne integerrima, superius minus villosa, glabra, subtus
tenuis v. imo venosa, subtransversaria, resinosa punctata, ramorum
floriferorum ovato-lanceolata, integerrima. Conymbi ternaria
les; Pedunculi et pedicelli brevissimi. Calyx pubescens, ^{caste} imbrica
tur; foliola oblonga, obtusa, pallida, striata

Daltonia

Sophia folium Eupatorium foliis bipinnatis pinnae pinnatifidis latioribus subrotundis
Corymbis simplicibus

Eupatorium *Sophia folium*, flore purpureo. Plum. Spec. 9. 12. p. 12. f. 2.

Eupatorium *Sophia folium*; foliis bipinnatis fidis. Lin. Syst. veg. Spec.
pl. 1175.

Habitat in America meridionali. Ex herbario ⁹Wms. par. ex. is

vel suprema
in ramos capilla
res floriferas
divisus

Caules plures, filiformes, pedales, erecti, & simplicis & imi, # glabri. Folia
remota pinnata, petiolata, opposita, & qui pollicaria: pinna petiolata oppo
sita, inferiores latioribus quinque vel septem, superiores ternae, ultima plenum
que connata, terminalis major oblonga, supra glabra, subtus ad eam lentic
in crassitia. Corymbi terminales, simplicis, pauciflori. Flores par
vi. Calyx subimbricatus. Corollula novem. Semina tetragona, angulis sin
guisculis.

~~*Sophia folium* Eupatorium foliis bipinnatis fidis~~

Lithospermum
folia

Eupatorium foliis lanceolatis sessilibus inferioribus basi dentatis, superioribus integerrimis, corymbis subcompositis.

Habitat in America septentrionali v. Robt

Caulis herbaceus, erectus, teres, superne pubescens, superne divisus.

¶ Resquippolia folia remota, inferiora basi ⁴dentata, unico magno lineari utrinque
v. interdum unico vel duobus remotis minoribus, margine & lobis
supra avenia, & lobis impunctata, subtus pallidiora, punctata,
interdum villosa, & supra ramorum alterna. Peduncululi terminales
breves, conferti pedicelli conferti, inani. Calyx laevis imbricatus.
foliula lineari-lanceolata, villosa, exteriora punctis resinosis adspersa.
Corollulae quinque

parviflorum. Eupatorium foliis lanceolatis ^{extorsum} petiolatis serratis subtus subtomentosis,
corymbis compositis

Habitat in Carolina Bose.

Paulo herbaceus, erectus, teres, villosus, striatus, villosus, superne in
ramis floriferis divisus: rami frequentes, oppositi. Folia frequentia,
opposita, sesqui pollicaria, acutiuscula, [#] supra minus villosa, subtus vena

^{sto} # impunctata, superiora ramorum integerrima. Pedunculi ex axillis superioribus
et apice, filiformes, villosi: pedicelli breves. Flores parvi. Calyx sub
imbricatus, villosus-cinereus: foliola linearia, obtusa. Corollula quin-
que

Eupatorium foliis lanceolatis semicomplexicaulis dentato-serratis
& abriusculis, corymbis compositis

Paulis herbaceus, altus, superne in ^{pedunculis di} ramos ~~divis~~ ^{divis} floriferis divinis, teras, & tratus
pube ~~super~~ ^{super} inferne subvillosus, superne canescens. Folia tri-quadripollia
pollicem lata ^{ria}, [#] dentibus majoris remotis serrata, ^{apice intensissimo} acuta, obscura triplinervis, impun-
data, juniora vultus villosa, stata glabra. [#] ~~ramorum floriferorum, alternis,~~
Corymbi multi ^{infima basi dentata} ~~religua~~ Pedunculi laterales et terminales, infimi
flori oppositi, reliqui alterni, subfastigiati, villosi, & abriusculi, foliolum
lanceolatum ad basin singula inferiora basi dentata, reliqua integerrima
^{ramorum} ~~Corymbi multiflori.~~ Calyx laxa imbricatus, villosus: foliola linea
pedicelli uni ^{flori} ~~vel triflori~~ lanceolata, acuta, intima margine membranacea. Corollula quin-
na; flores 8 es 5:
la
qua.

an album Lin sed Calycis foliola apice non colorata

strigosum Eupatorium foliis ovato-oblongis petiolatis obtusis ex trosum
obtusis serratis, corymbis simplicibus paucifloris.

Habitat in America Septentrionali

Caulis herbaceus, erectus, superne subdivisus, ^{rare} teres adpressus vel ^{imbricatus} villosus
nis. Folia pollicaria, inferiora obtusissima, ^{imbricatus} ~~ter~~ ^{ax} nervia, vix venosa
oculo armato strigis nonnullis notat adpresso, Pedunculis super
ne alternis, foliis uno alterove adpressi pubescentes villosi: pedicelli
brèves, tres vel quatuor ^q intermediis bifloris. Calyx laxa subimbrica
tus: foliola linearia, margine membranacea. Corollula tres

Dichotomum Eupatorium foliis lanceolatis subtrinerviatis, caule piloso, pedunculis
dichotomis

Habitat in America meridionali A. v. Rohr

Caulis scandens? teres, striatus, adpressus pilis rarioribus, tenuis, apice

in ramos dichotomos floriferos divisus.

Folia subpetiolata, opposita, vix pollidaria, lanceolato-ovata, attenuata,
basi acuminata, medio serratura utraque unia vel duo, profunde
nilotuscula, avenia; nervis, scopis apicem evanescentes

Petoli

Rami floriferi in apice ^{et superne ad} bis vel ter dichotomi. Flores in dichoto-
mia et latera ramorum, remotissimi, solitarii vel gemini

brevissime pedunculati, ^{humam} Folia opposita, petiolata ad ^{ramo}
dichotomum, bractea ^{subulata.} utraque ad se undam, unia per flore.

Calyx squamis per anthera deera lanceolatis, glabris, striatis

Corollula plures coeules.

Pappus serotus

24 maculatum Eupatorium foliis quinifanicolatis aequaliter minutis serratis, subtus tomentosis.
Eupatorium nova Angliæ; utriusque foliis, floribus purpurascens, caule
maculato Monf. hist. 3. p. 97. f. 7. t. 10. f. 3. Raii suppl. 107.

+ Eupatorium foliis lancicolato-ovatis serratis petiolatis, caule erecto Hort.
Cliff. 396.

Eupatorium foliis quinifanicolatis subtomentosis lancicolato-ovatis aequaliter serratis v. ovatis
petiolatis L. Am. Ac. 4. p. 200 * S. V. p. 736.

Habitat in America septentrionali ?

Caule glaber, ^{superne ad flores pubescentis} ~~pubescentis~~, lineis parvis saturatioribus maculatus. Folia
petiolata ^{in inferioribus} ~~in inferioribus~~ quinifanicolata, superiora quaternaria, lancicolata; supra glabra
subtus tomentosa mollia, enervia, aequaliter serrata. serraturis minutis
+ & cæcis in cymis terminalibus foliolo linearia ad basin ramorum
Calyces glabri purpurascens imbricati. foliolis oblongis apice
rotundatis. flosculis 7.

+ Eupatorium nova Angliæ utriusque foliis, floribus purpurascens, caule
maculato Herm. Parad. b. p. 150. t. 150

vidi in herb. Tournef. foliis ternis ovatis glabris unguiculis
Desajum herb

25 purpureum Eupatorium foliis quaternis ~~siabi~~ lanceolato-ovatis inaequaliter serratis, petiolis rugosis L. Spec. pl. pag 1173. K. V. p. 736.

Eupatorium canadense elatius, longioribus foliis rugosis integris at caulebus ferrugineis Monf. h. 3. p. 97. f. 7. 8. 13. f. 4.

Eupatorium Enulae folio Corn. canad 72. tab. 72.

Eupatorium foliis ovato lanceolatis obtuse serratis in petiolos depressis Gron. Virg. 119.

Habitat in America septentrionali 4.

Caulis teres, striatus, ad extremum petiolorum purpureo-fuscus. Folia quaternis, ²quina, lanceolato ovata, siabi uscula, nuda. Rayon profunde acutiserratis inaequaliter serrata. Corymbus terminalis confertus. Calyx cylindricus glaber, folioli oblongi apice purpureo-fuscis. Sepali octo albi. Pappus albus longitudine calycis.

27. Scabrum Eupatorium villosum, foliis ~~oppositis~~ petiolatis ovatis integris, utriusque marginis rugosis
pro Scabra L. Suppl. p. 354 t. 736

Habitat in America meridionali.

Caulis teris villosus erectus. Folia brevius petiolata, ovata, rarius integra,
plenumque marginem serrata, subtus villosa, supra glabra, rugosa, pabra. Pani-
culæ terminant caulem omnesque ramulos. Flores erecti. Calyx cylindri-
cus imbricatus, sepalis oblongis, obtusis, glabris, striatis: lineis longitudinalibus
apice concurrentibus, fuscis. Petali octo, ut calycis longiores. Pappus ser-
tus.

non vidi

1710 Diffusum Cupatonium foliis ovatis serratis trinerviatis, panicula ramosa forma Diffu
sa

Habitat in America meridionali

Planta ^{tota} glabra

Caulis herbaceus.

Folia petiolata, opposita, utraque acuta

Panicula terminalis, magna, ^{pedicellis} capillares ^{ultimi}. Folia angusta,
opposita, ad omnes ramificationes, sensim minora.

Calycii foliola lanceolata, exteriora breviora.

Strobili & Corollula 8.

Pappus albus, longitudine calycis. Semina tricuscula glabra
serrata

207 ~~208~~

30 *Atriplicifolia* Eupatorium foliis ovatis triangularibus grosse crenatis peristachii acutis trinerviis
marginibus glabris

Eupatorium frutescens, comule flore, atriplicifolius Plum. Cat. 11 Valt. Act. Par. 1719.
+ ^{pag. 402. no. 132.} Eupatorium corymbosum foliis cordatis, obtusis, incisè repandis; corymbis fastigiatis
Plum. Hb. pag. 121. Tab. 130. Clab. fl. Gu. pag. 1^{ra} 2^a pag. 799.

~~Habitatio Cambai et Guana~~

~~Eupatorium frutescens atriplicifolius,~~

~~Habitatio in Cambai Pflug in Guana;~~

~~Similis *E. ovato*. Differt margo foliorum crenata usque ad apicem, foliis omnini-
bus folia aluminatibus supra glabris, subtus quibus em pallidiora tamen non tomentosa mollia.~~

~~Stami purpurea fentis, ~~pubescentibus~~ teretes, vix striatis pubescentis. Folii
infra et supra punctis numerosis minutis, subtus erid centroris purpureo mi-
canti, marginibus ~~si abro~~
Inflorescentia et Calyx Dorati. Stili longissimi~~

39 ^{perfoliatum}
~~Calyculum~~

Eupatorium foliis lanceolatis sessilibus dispersis scabris
Habitat in America septentrionali 4

Caulis, ramis, pedunculi pilosis pmi. Folia sessilia lanceolata 3-4 pollicaria
hori horizontalia, serrata, scabra propositum ad marginem et in venis subtus, ^{scabra} ~~scabra~~ ^{in apice} ~~in apice~~ ^{scabra} ~~scabra~~
glutida, subtus ^{rugosa} ~~rugosa~~ tantummodo villosis, punctis minutis aureis om-
ni armato videndi ad presens. Corymbi superne ~~et~~ ramulorum et Caulis
Calycis foliola ^{glabra} ~~glabra~~, lanceolata. Flores 13. Pappus albus calyce
longior. Semina tetragona capsulis exstantibus
affine perfoliato

28 *perfoliatum* Eupatorium foliis connatis perfoliatis tomentosjs L. S. V. pag. 736. Mil. Ind. 1
Eupatorium virginianum, mucronatis rugosis et longissimis folijs, perfoliatum
Mont. n. 3. p. 97.
Eupatorium virginianum, salviae folijs longissimis acuminatis, perfoliatum.
Plukh. alm. 140. Tab. 87. fig. 6. bona. Raii suppl. 189.
Habitat in virginia aequosjs ⁊
folia interdum ⁊ cum herb. mus. 228. ⁊ fusi.

17-18 purosam E: foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utraque glabris,
calycibus multifloris Sw. prod. 111

Habitat in Samaria

Rami teretes superne laeviter pubescentes. petioli breves folia 3-4

follicularia corymbi sessu apices ramorum pedicelli filiformes
flores ^{calyx simplex} laciniis calycis petalis

myosotifolium *Cupatorum*

Cupatorium myosotifolium Gaigu. coll. 2. p. 341

Habitatio America meridionali ♂

Caules 4 pedalis, teres, striatus, villosulus; crassitie calami superne
ramosus paniculatus. Folia alterna lanceolata, basi longe angusta
in petiolum, obsolete sine denticulata, obtusula, utraque villosu-
la, seruncialis. Pedunculi terminalis et axillares, inordinata ra-
mosi villosi. Calyx villosus mult. floris squamis acutis. Corolla
purpurea. Pappus villosus Gaigu.

Eupatorioides trichia Lin. Spec. 1662 & Lin. pan. dec. 21. t. 11. L. V. p. 217

Eupatoria conyzoides odorata, folio crenato molli subincano Plukh. alm. 140. t.

^{17. fig. 2?}
Eupatorium alternifolium, foliis alternis; calycibus multifloris; pappo plumoso.
as. Spec. 2. p. 140. t. 20.

Halitid in Pennsylvania 7

Caule sesquipedales erecti, teres, rigiduli. Folia alterna, petiolata, lato lanceola-
ta, nuda, subrugosa, subtus venosa, subdentata, serratis mediis majoribus.
Rami alterni, e medio caule. Conyzi parvi terminales et etiam saepe
ramorum terminalium. Corolla alba. Stamina albo-flavescientia. Planta
resert Eupatorium, sed Pistilla clavata, et Antheris distincto cylindricis, apu-
te labio dehiscentes, absque exemplo in alio composito flore Lin. & c.

Eupatorium speciosum

bacha nodis Eup. foliis ovatis attenuatis glabris subtinnervatis argute
serratis glabris floribus floralibus alternis

Habitat in Brasilia Commeson
affinis nervosa Swartzii Dierke vero in variis
Calycis imbricatus solidis linearibus oblongo obtuso

133. villosum Eupatorium villosum foliis ovatis trinervi integerrimis subtus villosi mollibus
+ Habitat in America meridionali Barts. Domingo Lamarca

Ca. tota fere villosa, mollis. Folia ovata, integerrima, subacuminata, obtusi-
cuscula, juniora utrinque villosa, inferiora supra glabra, si abniscula, pubes-
centia. Corymbi axillares terminales pedunculati pedicelli tomentosi. Calyx penta-
cicus breviter ad ramificationes. Soliola calycina linearis pubescentia.
Flores parvi. flosculi pedicem. Seminibus longitudinae calycis. Pappus sordidus
Calyce longior

Corymba glutinosa casti odore, floribus pallide purpureis summitatibus ramulo-
rum insistentibus, capituli et summa minoribus Sloan h. 1. p. 257. tab. 157. f. 2.

Eupatorium villosum foliis oppositis decussatis ovatis subfrenatis subtus villosis
calycibus 5-15 floris, caule glanduloso Sw. prodr. p. 111

24-25 Tripleneura Eupatorium foliis lanceolatis ^{glabris} Triplinariis integerrimis glabris.

Ex Insula St. Crucis misit Dr. Pflay.

Pauli Herz glaber, subtilissime striatus, ramosis; rami sub
patentes, divaricati, floriferi.

Folia opposita, basi attenuata, subsessilia, bis. tripollicaria,
glaberrima venosa.

4 Stigmata corollae Pedunculi est axillares et terminales ramorum, rami
la dimidio longior paniculati. Flores paniculati. Rami sub

Panicula terminalis sub trichotoma. Pedunculi par
iter pubescentes. Pedicelli pollicari velloso, geli formes.

Folium f. minutum ad basin fraguli pubescentibus,

#pag. 302. pubescenti
mollis, non flor
triflor fraguli purpureo cent et ter
pedicellati, nei ter
sessiles in pedunculo
Stigmata corollae dimidio longior

Calycis polyphyllus: folioli lineari acuti, apice velloso
ultra sepat, apice purpurei
albidus longitudine calycis fructu
Habitu ad Calcam oppositi foliam accidit at receptaculum
nudum, diversum, pro terea caulis et folia glaberrima nei
pubescenti mollis ut in C. opposita secundum Dr. Swartz off. #

Atriplex folium Eupatorium foliis triangulari-oratis ^{crenato-lanatis ciliatis} ~~grae crenatis punctatis tri-~~
nerviis magne scabris

Eupatorium frutescens, coeruleo flore, Atriplex folium Plum. Spec.
Jaell. in act. parif. 1719. pag. 402. n. 32.

Eupatorium corymbosum foliis cordatis, obtusis, incis. repandis,
Corymbis fastigiatis Plum. ic. pag. 121. Tab. 130. fig. 1. Aubl.
fl: Queanens. pag. 799.

ex Andela fl. couc. specimina grasa fuerunt a Dr de Pfluz
et Dr West. Emergenti

Rami ^{superior} purpurascens, teretes, vea strati pubescentes.
Folia utroque punctis numerose minutis, subtus ex id anthombis;
purpureo micantibus, supra viridia subtus pallidiora nervi ad
entem vellos

Inflorescentia et Calyx l. divati cui satis similis diversa vero
foliis usque ad marginem crenatis, omnibus supra glabris, subtus
quidem pallidiora tamen non tamen pubescenti mollia.
calyx marginatus

Corymbi terminales. calyces cylindrici imbriati glabri
folioli lineantibus obtusis pallidis stratis
floresculi ciliciter 20. semina fusa glabra angulata

223 macrophyllum Eupatorium foliis cordatis trinerviatis serratis ^{subtus} cauleque
pubescentibus.

Eupatorium petasitidis folio Plum. Spec: 10. ic. 129.

Eupatorium macrophyllum: foliis cordatis trinerviatis serratis
Lin. Spec: pl. pag. 1075.

Habitat in Caribois

Caules herbaceus, crassius, pennis cymis, striatus, pubescens.

Rami axillares, erecto-patentes

Folia opposita, petiolata, magna, cordata, supra glabra, venis
exceptis, ^{subtus} pubescentia, pallidiora; trinervata, venosa,
obtusè serrata, acuta: supremo saepe alterna.

Petiolis bis tripollicari

Conymbi terminali et axillares, pedunculati, decompositi,
denfi

Calyx late imbricatus: foliola lanceolata, pallide viridia
subtilis sive striata

Corollula circiter viginti, longitudine Calycis, figuram
quoad figuram

~~Conymbi~~ Plumiani ~~figura~~ Eup. petasitidis ^{quoad figuram} exacte convenit
(cuiusmodi planta ideoque non dubito quin eadem sit quam)

Folio quidem quaterna Cap: petasida tribuit Burmannus, sed nil de
numero harum habet Plumienus, Coniis quod ^{tribus tres} ~~duo~~ panes, propter magni
uti ab ipso tantum ^{duo}
Vindena ~~non~~ delineato in icone Plumieni, ad ramos potius pertinet
quod vero ad petasidum solum modo ad petasidum
~~Et cum a Burm. pro petasidis habita~~, omnes vero erronee
^{actas}
a Cal. Burmanno pro petasidis habita

incarnatum E. foliis cordato hastatis uninerviis obtuse serratis
lobis venosis petiolatis Walt. fl. Car. pag 200
Habitat in Carolina

non vidi

Dichotoma E.

nilofum E.

melanomoides
negrum E.

30 aromaticum Eupatorium foliis ovatis obtuse serratis petiolatis trinerviis, calycibus simplicibus L. Sp. pl. pag. 1175 & L. V. pag. 736.

Eupatoria valerianoides, flore niveo, tenuiori foliis cum pediculis, virginiana Plut. alm. 141. t. 80. f. 3. monf. h. 3. p. 90.

Eupatorium caule recto ramofo, foliis ovatis obtuse serratis petiolatis Gron. vry. 1. p. 177.

Habitatio virginia teres quadripedalis facie scutellaria
Caulis glaber, striatus. Folia cordata, acuminata, glabra subtus palli-
diora, trinervia. Cymae (racemi) terminales foliosi. Flores
calycis duplo longiores, toti nivesi floretulis 10 ad 20. stylis vix floretu-
lis longiores. Differt a reliquis imprimis calycibus non imbricatis,
sed ferme aequalibus et stylis non flore longioribus, ut: Agetatum. Lin.
Sp. L. c.

31 *ageratoides* Eupatorium foliis ovatis serratis petiolatis caule glabro L. Supp. p. 355. h. V. p. 736
Valeriana utricifolia, flore albo Corn. canad. 20. t. 21.

Eupatorium scopulorum foliis glabris, flore albo Monf. h. 3. p. 90. f. 7. t. 10.
f. 11.

Eupatorium caule ~~erecto~~ foliis ovatis serratis petiolatis, caule glabro ~~gracili~~
~~recto~~ Hort. Upt. p. 254. Mill. Dict. n. 3

Ageratum altissimum foliis ovatis cordatis ^{negatis} ~~negatis~~ floralibus alternis,
caule glabro L. Sp. pl. p. 1176.

Habitat in Canada, Virginia &
folia utricifolia acuta serrata

26 trifoliatum Eupatorium foliis ternis ovatis triplinerviis equaliter serratis

Eupatorium Cannabinum, foliis in caule ad gemula ternis, mani candidum Raii. pag. 189.

Eupatorium caule erecto, foliis ovato lanceolatis serratis petiolatis ternatis Gron. Virg. pag. 170

Eupatorium trifoliatum foliis ternis Gronov. Virg. 119. L. S. V. pag. 736.

Habitat in Virginia 4.

~~Caulis punctatus, purpurascens striatus. Folia ovata, ternis, breviter petiolata, equaliter serrata, ^{sub} basi ^{tri}plinerviis, venosa, sic quae polliciana Comibus terminalis. Calycis glabri purpurascens. Stylis longissimis, Pappus sericeus calycis longior. Flosculi 10 non plura quam tria serratura minus profunde, foliis latiora, caule humiliori differt a purpureo~~

trifoliatum
~~Dubium~~

E foliis ternis petiolatis ovatis acuta serratis glabris, calycibus imbricatis

Habitat in America boreali

Caulis ^{superne pubescens} teres glaber herbaceus striatus folia parum attenuata Corymbi terni
naler decompositi, Squamae calycinae lanicolatae purpureo-purpureae. ^{implerentia vasa} flosculi.

12.
~~ant. 12.~~ an Eupatorium trifoliatum Linn. ? et flos sicemnis flosculoma

43 *urticaefolium* *Cappadoniam* *hispidum*, foliis cordatis inciso- serratis, panicula terminali, calycibus multifloris tubulosis subpungentibus *Lin. Suppl. pag. 354. S. V. pag. 736.*

Habitat in America meridionali.

Herba simillima *urtica pilulifera*, etiam folia sic discolora et stimulis pilosa
Tolia petiolata *Lin. Sup. C. C.*

10749 cordifolium E. foliis cordatis serratis subtus tomentosis, petioli brevissimis; corymbis
subsessilibus; calycibus squarosis; caule fruticoso Sw. prodr. p. 111.
Habitat in Jamaica 5

montanum *C.* foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis scabris subtus hirsutis; co-
nymphis patentioribus; caule fruticoso Sw. pr. p. 111.
Habitat in Jamaica &

41 *Stoechadifolium Eupatorium tomentosum*, foliis petiolatis lineariibus crenatis tomentosissimis
subtus canis, panicula terminali L. Suppl. pag. 355^t. V. pag. 736
Habitat in America meridionali.

Caulis teres tomento albo mollissimo textus, erectus. Folia breve petiolata,
pádentia, linearia, obtusa, crenata, plana, utrinque tomento mollia,
pá pagina inferiori alba, venosa. Panicula terminalis, composita: flori-
bus conglomeratis. Calyx multiflorus; squamis subulatis, glabris. Corol-
la violacea: limbo extus pubescente ut in *E. microphylo*. Pappus sub-
tilissimè dentatus L. Suppl. l. c.

Microphyllum Eupatorium foliis triangulari ovato, crenatis, subtomentosis, supra venosis, panicula conglomerata terminali, pedunculo elongato L. Suppl. pag. 955 * S. V. pag. 737.

Habitat in America meridionali t

Tunc ex caule glabro, lignoso, rigido. Folia petiolata, ovata, basi transverse dissecta obtusa, crenata: crenis utrinque quatuor et nona terminali rigida, crassa; supra glaberrima, vincta, trinervis, subtus albo-tomentosa, venis supra reticulata, vix seminibus pisii majora. Pedunculus terminalis, elongatus, pubescens, filiformis, nudus, terminatus panicula composita, conglomerata. Calyces imbricati, glabri, subulati, pungentes. Corollo vix calyce majori, violaceo: limbo extus pubescente. Quoad flores maxime affinis *Strophia folia* L. Suppl. l. c.

1819

1324 Canescens Cupanonium ^{incanum} foliis ovatis lobatis integrisque, subtus mollescentibus trinerviis

incanum LXIII

Ex Angula s^t Cneio misit Dr. Dr. Pfluz et West

Fruites ramosis, ^{Rami} ~~rectis~~ subinnescente. Rami ^{ulsi} oppositi, praeclati, patentes, superne uti ramis, incani, mollescenti.

Folia petiolata, opposita; ramorum pollicaria, obtusissima crenis 2.2. magnis lobata, supra viridiora, subtus incana molliora. ramulorum unguiculata sursum versus sensim minor, inferiora obscure lobata superiora integra, utraque incana mollia: omnia trinervia nervi subtus magis conspicui, saepe subtus obscure venosa, plerumque avenia

Corymbi ex apice ramorum et ramulorum, simplices, pauciflori
Calyx cylindricus, subvellosus: folioli linearibus, obtusis, pallide striatis, extimis brevioribus.

Flosculi decem.

Semina ~~ad tertiam~~ ^{subtetragona} nigra, ad tertiam angulata reliqua minutis [?]
diposa

attenuatum E.

fructum cupat.

La Manhi videtur esse eadem ac mea

42 *Trofolium Eupatorium* foliis angusto lanceolatis trinerviis subserratis, calycibus squarrosis
Lin. Am. acad. 6. pag. 405. K. S. Veg. pag. 736. Sw. off.

Habitat in Jamaica

Simili Eup. hysopifolio, sed folia magis profunde trinervia, opposita, marginibus
coena una alterave serrata. Calyces subsquarrosi, ultra 17 flori. Styli longiori-
bus Lin. Am. l. c.

Caulis villosus, ramis inferis vix. Folia petiolata, opposita, bipollicina
lanceolata, acuta supra obscure trinervia, remota serrata, supra integra
rima, supra glabra, subtus villosula. Cyma terminalis compo-
sitae Calyces parvi villosi: folioli lineares obtusi herb. Musp

36 odoratum Eupatorium foliis deltoidibus ^{trinerviis} inferne dentatis, ~~supra scabra~~ subtus tomentosis
Eupatoria conyzoides, foliis molli incano, capitulis magnis americana Pluk
Phyt. 177. fig. 3.

Eupatorium odoratum hirsutum, foliis ovatis acuminatis basin versus crenatis flori-
bus compositis Brown Jam. 313.

Eupatorium foliis deltoidibus inferne dentatis, subtus tomentosis, calycibus mul-
tis flori L. linn. a. d. pag. 405*. S. V. pag. 736

Habitat in america

Rami subtulis sine spinis, fere pubescentia uti petioli et pedunculi.

^{retrocurvata}
Folia ovata, acuminata, trinervia, a medio ad basin dentata. juniora
supra et infra pubescentia villosa tomentosa, inferiora subtus modo supra
scabra, pollicaria et ultra. Petioli brevis. corymbi ex apice Rami
floriferi ex axillares, oppositi brachiati, horizontalis, quadriflori
simplicis s. simi. Corymbi corymbis terminati floribus terminati. Corym-
bi terminant ramuli et caulem. Foliola oblonga ad basin pedunculosa
calyx cylindricus, imbricatus ^{inter} raris villosus, foliola subovata obtusa
seape presentia viridi spinata, interiora laevia inflorescentia ~~et~~
12. longitudine calycis

axillari ~~Eupatorium~~ foliis cordato sagittatis glandis glaberrimis, corymbis axillaribus caule
pendente

1824 m. olle. f. foliis petiolatis cordatis acutis subserratis pubescentibus; caule herbaceo
tomentoso Sw. prod. 111.

Cyperium guianense Aub. qu. 800.3.

Habitat in India occidentali, Jamaica &c.

michi ignotum nisi non eadem cum brachyato

brachiatum E. villosum foliis ovatis dentatis trinerviatis ramis
caule brachiato.
habitat in India orientali
on melle Swartzii.

brachiatum Eupatorium calycibus cylindricis, foliis cordato-ovatis angulato-
-tatis.

Habitat in Ansp. Barb. Onid? Herb. Banksii

Calyces multiflori

35 *coelestinum* Eupatorium foliis cordato-ovatis obtuse serratis petiolatis, calyci L. L. V.
pag. 736

Eupatorium marianum, sirophulano foliis, capitulis globosis colore
coelestinis

Eupatorium frondosifolium, flore comulio Bell. Eth. 140. t. 114. f. 139.

Eupatorium foliis cordatis serratis petiolatis Gron. Virg. t. p. 94.

Habitat in Carolina, Virginia

Caulis superne villosus. Folia petiolata, ovata, panem attenuata, venosa,
glabra, basi panem acuminate, venis obtuse serrata, serraturis mucro
natis. Comuli terminaliter, simpliciter sumi. Bracteae ad basin pedicellonum
subulati. Calycis foliola plures herb. Guss

punctatum E

sestia ^{anis} ellatum Eupatorium foliis ~~lanceolatis~~ - ellipticis acuminatis scabris
profunde serratis ~~reticulatis~~. Herb. Bartrj.
Habitat in Amer-Septentrionali
Calycis multiflori

2724 Atriplicifolium Eupatorium foliis triangulari-ovatis crenato-serratis acutis
punctatis trinerviis, margine scabris

Eupatorium frutescens, caeruleo flore, atriplicis folio Plum. Spec.

Vaill. in Act. par. 1719. pag. 402. n. 32.

Eupatorium corymbosum foliis cordatis, obtusis, nervis repandis corym-
bis fastigiatis Plum. in: pag. 121. tab. 130. fig. 1. Publ. fl. Guian.
pag. 194.

An in insula St. Crucis legitur de West?

Rami superne cinerascens, teretes, vix striati, pubescentes.

Folia ^{opposita, petiolata} utrinque punctata ne pollicana, acuta, grosse obtuse-serrata
supra viridia subtus pallidiora, nervi ad centem villosi
utrinque adpressa punctis minutis numerosissimis
subtus majori conspiciunt purpureoque micantibus

Corymbi terminales, subsimplicis, ^{brevis} pedunculis sessiles, vel brevipedun-

Calyces tubulose cylindrici, glabri, ante imbricati: folioli
lineariibus, obtusi, pallide striati.

Floresuli circiter 20.

Semina fusca, glabra, angulata.

(Inflorescentia et calycis Eupat. odorati, diversa foliis usque versus apicem
crenato-formati nec tantum basi, ^{partibus} subtus quidem pallidioribus, nec villosa
molli ter villosi

triangolare E.

Ficula foliis cupatorum foliis cordatis ovatis acutis serratis siccis ulentis
glabris petiolatis
Habitat in Hispania Herb. Bantisi
Calyx multiflorus

negotium 1 E.

rigidum L. foliis petiolatis ovatis acutis serrato-dentatis rigidis subtus scabris; caule
subherbaceo Sw. prodr. III.

Habitat in Jamaica.

Caulis striatus et glaber. ramuli pilosissimi folia serrata utraque
2-3. Nervis supra glabra nitidiuscula subtus punctata punctis
in margine parvis ciliata. Corymbus terminalis simplex
Calyx oblongus sequamis oblongis fusco flavoque striatis

23-24 conyzoides Lupatorum foliis ovatis, ~~acuminatis~~ ^{obtusatis} serratis trinerviis, ^{supra glabris} calyci-

bus acuta imbricatis
Habitat in ^{Aggenjo meridionali?} Insula ~~franca~~ ^{Commano} Dr Thaurin
Rami striati, pubescentes.

Folia ovata, acuminata, acute serrata, trinervia, supra gla-
bra, subtus vix pubescentia. Lesquipolliana.

Comybis ^{sub simpliciter} terminalis, paucifloris pedunculi parvuli in flori-
pedicellis unifloris ^{et cylindricis},

Calyci Lupat. odorati (at major), superne parum latior. Solob.
lancearia, pallidior apice rotundato. fusco.

Rostrula numerosa.

Semina triquetra, calyce breviora. #

Pappus calyce ^{parum} vix longior, albus
(Calycibus majoribus a reliquis distinguitur)

Litr. Bb. pag. 97.

14 Coniacum Eupatorium foliis ellipticis coniacis glabris extrosursum dentatis
Habitat in Popula Borbonis

Folia lato elliptica, glaberrima coniacis, glaberrima, nervosa nervis
oppositis; ~~vasis apicibus~~ ^{extrosursum utrinque} remote tridentata, mucronata
tri-pollicaria. Petiolus pollicaris basi dilatatus, Corymbi tres minores
Pedunculis communis pubescentibus. Squamis minutis vasis basi singuli
pedicelli Calyx imbricatus ^{5-lobis} squamis exterioribus ovatis brevioribus interio-
ribus longioribus, linearibus. Pappus purpureo-flores calyce duplo longior sublim
p. ex.

incisum Eupatorium annuum divaricato-bracteatum glaberrimum,
foliis nitidulis membranaceis subcordatis sursum angustatis
et remote ^{dentatis} ~~incisatis~~! Conycho subgynoso albo. Ait. bot. herbar.
nat. Paris. 1. pag. 112.
Habitat in amer. merid.

glomeratum

Opuntia E.

Tomentosum Eupatorium ^{oppositis} *foliis lanceolatis serratis subtomentosis venosis*
Herb. Bartschi
Habitat in Armenia septentrionali
Calyces 10 flori

Species Eupatorii
obscuri

1. Eupatorium foliis oblongo, rugoso, ampliori, caule viridescente. altissimum in monte
- + 2. Eupatorium novo anglia, Betonicis foliis villosi flore albo. Par. Bat. nos. 110. fig. 160
- 3 Eupatorium americanum verbas. foliis Plum. Phys. t. 07. f. 1. } Tournef. Inf.
- 4 Eupatorium lophiofolio, flore purpureo Plum. Ic. 120. f. 2. } R. H. p. 456
- 5 ----- americanum frutescens, Had. er. Veret. ni folio, flore }
purpurascende Plum
6. Eupatorium foliis ovato-lanceolatis simplicibus, obtuse serratis Gron. voy. p. 120
Flores albis angustis.

+ 2. junior villosa, ad alteram ^{ramosus} Labra, pedalis. folia rugosa villosa ovata serrata inferne opposita superne altera. Flores albi. Radix annua

dedit Tournef. { ad eam cum est
Eupatorium ad Tresinem appropinquans e Madagascari
Eup. foliis alternis subtus tomentosis descripta in herb. Guss.

feliciter oppositis gaudent.

inferioribus oppositis, superioribus alternis
alternis

Oronibus cymosof conyctis
pue atis.