

Cuphorbra

~~xx~~ fructuosa, inermes

(caulis nec dehinc omnis nec umbelliferus)

9. meliformis L. inermis subglobosa multangularis
10. caput medusa L. imbricata, tuberculis foliis lanceis in fructis, floribus subglandulatis,  
petalis palmatis
11. imbricata L. imbricata, tuberculis foliolo lanceolato in fructis, floribus  
glandulatis, petalis integerrimo
12. analantha L. imbricata, tuberculis foliis subrotundis in fructis, floribus  
terminalibus foliaceis septibus, petalis palmatis
13. mauntanica L. seminudus, fructuosa, glaberrimus, foliis alter
14. pistatoria L. fructuosa stricta, umbellis quunque fidi terminalibus in  
volvelli oblongis, foliis lanceis - lanceolatis levibus
15. balsamifera L. fructuosa stricta, capitulo terminali, foliis lanceolatis lev  
bus glaucis
16. Tenuicollis L. fructuosa stricta, rami petuli patulis determinante confor  
tis, floribus
17. Thymaloides L. fructuosa, foliis <sup>oppositis</sup> alterno ovatis
18. heterophylla L. fructuosa, foliis <sup>oppositis</sup> pinnatis formibus in volvē nigræ colora  
tis

19. cotinifolia E. <sup>fruticosa</sup> foliis febrifido latis subrotundis petiolatis emarginatis  
integerrimiis
20. Ocymerdea E. herbaea, ramosa, foliis febrifido atis integerrimiis petiolatis  
bus, floribus solitariis
21. cuneata E. fruticosa, foliis obovatis, pedunculis lateralibus infloris
21. glabra E. <sup>indifferente</sup> ramosa, foliis oppositi ovatis acutis glabris  
integerrimiis
22. Linifolia E. caule suffruticosa, foliis oppositi alternisque linearibus  
solatis.
23. Ocymerdea E. herbaea, ramosa, foliis febrifido atis integerrimiis petiolatis  
et brevioribus, floribus solitariis

*glaucophylla* *Euphorbia* foliis ovato-oblongis integerrimis ferratis que glauca, pe  
tab  
ramulis atellanibus unifloris solitariae

Habitat ad Senegal Hec. la Mart., in Guinéa ad littora manis Ronning  
Caulis frondosus (redditus), ramosus, teret, erectus, ad doso - articulatus, teret,  
utri tota planta glaber. ramuli purpurascens. Siliqua opposita, sub  
sessilia, unguis ularia vel panum ultra, ovato-oblonga, altero lateraliter  
brevior brevior obliqua, apice altro lateraliter Berrutus 2-3 minutis  
altero integerrima, glaucio viridia, arenia, enervia. Siliques axilla  
rei, soltarii, breviter pedunculata. Patala suborbicularia.

Iulus Euphorbia aculeata foliis ranguinis, pedunculis paucifloris terminalibus floribus capitatis Lour. fl. cochinch. pag 290.

Habitat in hortis Cochinchinae.

Caulis fruticosus, bipinnatus, acules geminati. Rami adscendentes. Folia coriacea, pinnata, subtriangularis formis, 3 pollicaria, integerrima, carnosus, glabra. Calyx ventricosus, carnosus, interioris ruber extensus virens. Staminalia cincta 40  
cornuta cum aliis oculis ab oris

non vidi

*meloformis* L. *inermis* *subglobosa* *multangulans* Hort. Kew. & p. 135. x  
Habitat in Cap. b. spec 5

non vnde

10 Capit meduso & inermis imbricata, Subenulis folio linearis exsticto, floribus sub  
pedunculatis petalopalmatis Hot. Kew. 2. p. 135

E major Planta lactaria africana Com. hot. 1. p. 33. t. 17.

Tiliacolus aderide africanae simplici squamato caule, Iamoneum  
folio Com. p. 10. ~~t. 2~~ p. 23. & 5747

Euphorbia Capit meduso inermis imbricata, Subenulis foliolo  
linearis exsticto Lin. S. V.

minor β. Etia Euphorbiu analectum squamosum lobis florum indentati  
flor. Act. par. 1720 p. 502 t. 11. Breyne prod. 3. p. 29. t. 19

V Euphorbiu humile procumbens, rami simplicibus exquisiti, caule  
crassissimo tuberoso Burm. ofr. 20 t. 10. fez. 1

A Euphorbiu procumbens, rami planimis simplicibus squamosi,  
foliis decidui Burm. ofr. 17 t. 8

generatim E - Euphorbiu procumbens, rami gemmati, caule glabro oblongo  
lineare Burm. ofr. 10 t. 9. fez. 1

Habitat ad Cap. b spec. 5

— planis

in herb. non habeo

11 clava L. inermis umbellata, Tuberulis foliolo lanceolato instructis, floribus  
pedunculatis, petalis integerrimis Hort. Kew. 2. p. 136.  
*Tithymalus aroides* afrikanus simplici squamato caule, hamonensi  
foliis Com. prot. 5. D. 1. 8.

13 Euphorbium acutum erectum tuberosum, linearibus foliis, flore ac  
fructu foliaceis Burm. afr. 12. t. 6. fig. 1.

Habitat ad cap. 6. specie 5.  
flores uti folia superne solitaria ex Tuberulis. Pedunculi  
foliorum longitudine non vidi.

Euphorbia canaliculata La Nard. Enc.

simplis

— pedunculis unifloris

non vidi

Clava E.

Tithymalui aeroder africanus proprie*t*is squamato caule, hamoneni foliis

Com. var. 50. Tab. 8

Cuphotria Clava Fagge coll. 1 pag 104.

Habitat in Pap. b. f. p. 4

Caulei pedalis ramospi eretus Teretis superum segmentum unius ratis utri  
rami diametro univales post caput foliorum tuberculati. Folia fe-  
silea grathulata lineana, a distiusta integerrima 4 pollicares vel  
ultro avena, glabra. Pedunculi uniflori, axillares, foliatae  
pollicares, Teretes bracteis lanceolatis vel ovatis acutis vestiti  
bracteo 4-5 in apice pedunculi in cupre centro flor. Flospli. Penun-  
thum campanulatum, ~~fidua~~ dentatum dentibus rotundis cre-  
natis. Petala 5 que crassa late subtriangularia. Germen flospli extra caly-  
cam Dappula glabra femina nigra Fagge

non vidi

*Pranacantha* L. *inermis umbonata*; *Tuberulus folio subrotundo instructus*,  
*floribus terminalibus solitariis sessilibus; petalis palmatis* Hort. Kew  
2-p. 136.

*Euphorbium anaeanthum* Gramosum, lobis florum tridentatis fln.  
act. parv. 1720. p. 387. n. 12. et. pag. 392. tab 11.

*Euphorbium erectum*, *aphyllum*, *ramus rotundis*, *tuberulus quadrago-*  
*nus* Burne. act. 16. 1. 7. pag. 2.

Habitat ad Cap. 6. prei 5

*Euphorbia Indentata* Lamk. Enc.

coloratus

non vdo

longifoliae Leph. caule simplex i virgato, inferne nudo simplex prope foliis propriis  
lineari-lanceolatis integrerimis, nero dorsali velloso corymbis panus  
terminalibus La Mark L. ex cycl. pug.

Habitat in Africa vel Canaria

Paulo simplex vel bifidus; tripedalis et radicantis superne foliosus, costa  
folium velloso cana, folia 5-6 pollucana, trahit duo ad basim calyxis  
patula rotundata integrum

non vidi:

*T. mauntanea* L. inermis seminuda fructuosa feliformis flaccida, foliis alternis  
lanceolatis. Acad. 3. p. 111. \*

*Tithymalus aphylloides mauntaneus* Dill. Elth. 304. t. 209.  
fig. 373.

Habita in Afriæ montibus.

Palis feliformis, rufopilea penne aenaria, opaca lata, debiles, rarus  
ramosus; rufa glaucescens. Solea in summis ramulis alternae  
concolorata pectora tenui

non vidi

16 Trinacalli C. inermis feminada fruticosa, filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. Lin. Am. Acad. 3. p. 111.

Trinacalli Rheed. Mal. 2. p. 85. t. 44.

Tithymalus indicus prospereus Com. Hort. Hort. 1. p. 27. t. 14.

Tithymalus arboreus, caule apphylo Blush. 319. fig. 6.

Offraga latifolia Pruneph. am 57. p. 62. t. 29

Habitat in India t. et Arabia

Ramis <sup>brochiatibus</sup> sparsi, rami <sup>fructu</sup> adhæderentes. Soluta in ramis  
sparsa sessilia lanceo-lanceolata, glabra, post ferme rursum  
culana. Flores apice

fl. regl. Inv. plante

Lophogona ~~Ceph~~<sup>enomis</sup> feminada, caule simplici pentagono angulis membranis  
et labiis stabi, foliis lanceolatis spathulatis, umbella terminali dichotoma ha Mark Ca  
neg. 414.

Habitat in Madagascar

Pedalis pedalis simple pinui cœsifère digit; anguli spicules. folio ad apicem gla  
bernum 4. 6 pollicaria. Pedunculi bipinnatis breviter dichotomi flores  
6. 7. umbellati  
B. antanan. afr. 11. Tab. 5: ?

non vidi

eadem cum Vicia alli-lin. facit ha mattheus sed est in ista videtur

causi folia E. formosa, folio crassi conferti lanceolato-oblongo integrimis  
corbis, pedunculi axillaribus trifloris La Merk.

Habitat in Peru

Lignosus. folia ad apicem cauli congesta 5-6 polliciana breviter peto-  
cata. Pedunculi crassi folio brevior apice triflori intermedius  
subspinosi. petala subcordata germe glabrum

non vid.

melliferum Efolius sparsiflorus Cancelloatus acutis lacinias pedunculis  
hotomis, capsulis mucronatis Hort. Kew. 3. pag. 493.

Habitat in Madere t

non ord.

~~confolia E. quinquefida bifida, foliis subliniatisibus margine re  
volubili grayi exstansis pubescens tubus canule suffusus ha  
marum.~~

~~Habitat in Q. b. peri~~

~~Rami plani, ramulis pubescens 6-7 pollicans. folia parva, linear  
3-4 cm. longa. umbella terminalis bifida, involucrum folia ovata, involu  
cella ovata, acuta.~~

~~edicion cum georgio Vorder  
non vix~~

14 pescatoria L. inermis fructuosa procta, umbelles quinque terminalibus  
involutis oblongis, foliis linearib; lanceolatis levibus Hort. Kew. 2.

A. 137

Habitat in Canariis,

non Di

15 balsamifera E. inermis fructuosa stricta, capitulo terminali, foliis lanceola-  
tis levibus glaucis Hort. Kew. 2. p. 137.

Habitat in Canaria 3

non vidi

*Tithymalodes inermis fruticosa* foliis alternis ovatis acutis planis pub  
lucidis la mark.

*Tithymalus curviflorus* myrs folius. Flore papilionaceo coccineo  
parvo Com. possit herb. t. p. 31. v. 16. Plath. alm. 36g. Tab 230  
fig. 2.

*Tithymalus curviflorus* myrs foliis, flore coccineo mellifluso.  
Hern. possid. p. 234. v. 234.

*Euphorbia Tithymalodes inermis fruticosa*, foliis d. p. tuba alter  
ni ovatis Her. Hort. Cliff. p. 190. Gasq. herb. t. tab 92.  
Habitat in America.

varat folis linear lanceolati. Gasq. curviflora eadem ac Tithy  
malodes: folio subdisticha patentia crassifloma, rigida. Flores cocc  
inei herb. Ruth.

non videt

~~175 Thymalodes~~ ~~E~~ inermis ~~indica~~, foliis diff. alternis ovatis Hort. Clff.  
~~176 Am. Ad~~ ~~3 sp. 1114~~ ~~Hacque hst. 149. t. 92.~~

~~myrtifolia~~ ~~T~~ ~~Thymus curasavicus~~ myrtifolius flore papilionaceo coccineo parvo Pom. Hist. 1. p. 31. t. 16. Pluth. aln. 3 by. t. 230. fig. 2.

~~T~~ ~~Thymus curasavicus~~ myrtifolius, flore coccineo mellifluso Horn parv. 234. t. 234

ped. folia p. Thymalodes lauricarpa foliis non serrato Till. Clff. 303.  
t. 2 80. fig. 372.

Habita in Parafas p. fortia in Andra t  
Rami alterne sparsi cortice longitudinale ter nudo ex catenata. Folia breviter petiolata elliptica coracea, integerrima. In petiolae area pedunculi si ramuli bis vel tertii dichotomis uniflor. fructu oblongo levis  
anacampseris t. L foliis alterni ellipticis, obtusis, pedunculis dichotomis

*Heterophylla* L. *Oe hotoma* umbella bifida: involucris foliis que ovatis panduis  
formibusque ~~coloratis~~<sup>supermis capi coctinæ</sup> Retz. obf. 6. pag. 30.

*Tithymalus* Cerasifarius, foliis et atriplicis foliis hispetis, can  
lebus rubentibus Monf. hist. 3. p. 336.

*Tithymalus* cerasifarius, foliis et atriplicis foliis varis, can  
lebus viridantibus Pluton. alm. 367. t. 12. fig. 6.

*Tithymalus heterophyllos* Plum w: 250. t. 251. fig. 3.

*Euphorbia heterophylla* nermis, foliis serratis petiolatis diffor  
mibus ovatis canescentiis panduis uniformibus Len. t. V.

Habebat in Amerie a Calidore.

Rami terete striati glabi. folia petiolata, alterna, remotata

+ folio superiore an apice concreta, oblonga glabra nervosa. anguli utrin  
cuius purpurea que bene inter senum oblongum, ovatis acutis integræ vel  
serratis, basi apice que acuta. Flores terminali subdutato.

Specimen ex herbo sanguini differt petiolo, folione  
superiorum peloso  
nervosa, foliis alternis panduisiformibus crassiusque coloratis

19 cotinifoliae & foliis oppositis subrotundis petiolatis emarginatis in Vegerimis  
caule fructuoso. Caa 1.V

Tithymalus arboreus americanus, cotini folio Com. hort. 1. p. 29  
V. 15.

Tithymalus curasavicus, folio cotini triphyllor, petali florum  
ferratis Platyn. alm. 3 by V. 230. fig. 3.

Tithymalus arboreus Curasavicus, cotini folio lib. thes. 1.  
V. t. 46. fig. 4

Habitat in Curacao<sup>5</sup>

an species duo diversa

Pauli. Et rami Verdier, cordice cinereo articulati sub articuli apice  
nam delatati. Dolce petiolata & 3 ad ~~ad~~ <sup>ad</sup> fragula geni-  
culata pollicans vel ultra, glaberrima nervosa, arvensis  
integerrima excepto apice emarginata. Pedunculi articillari  
3. ad quatuor uniflori petiolato brevirose.  
culto

aliam ex americana forte diversa. foliis 6 ad genicula ovata acutangulis  
menume emarginata subtus glauca etenim similes.

Cotinifoliae Pleurin diversa spec. co. Richard

verticillata L. foliis ovatis petiolatis verticillatis subtus glaucis apice crenatis.  
glabres

Habitat in India occidentali.

Caulis fruticosus. Rami oppositi. Stola 5-6 glabra antezemina  
subtus simpliciter venosa. Pedunculi terminalis ramorum  
unguiculatae. Petala rotundata. Capsula glabra.  
affinis cotinifolia an modo varietas.

*nymphaea* L. *inermis*, foliis lanceolatis ovatis integrernis petiolatis mucro-  
nabis coriaceis, pedunculis nudis puberbellatis La Mart.

Habitat in Insula Francia d. t.

Caules 400 f. simplices nudi 6-7 pollicares, cicutatim, superne foliis 1-2.  
folia 3 pollicaria et ultra. pedunculi pollicares uniflori unus.  
vel alter proliferis; plenumque 3-5 flores libatoe.

non vrd:

mediflora Euphorbia

Euphorbia mediflora Gaertn. coll. 3. pag. 180

Habitat

Frustra ad statim homini virei pollicem exspicit albo fuscopice  
suberoso variegatus, siccus trichotomus. Tota terna vel opposita,  
petiolata, ovata, acute, integerrima, venulosa, parum undulata,  
3-4 pollicaria marginè uti petoli villoso-pilis cestinum glabra.  
Racemi cymosè ramis erecti, multiflori at illas glabri "bium  
cavas" involucellis nullis, bracteis incaudi aduersis  
ad diversioris flores 5 petalos olei festiles ali steriles. Penantis  
conspiculatum semiquaque pedunculae racinis subrotundis obtusis  
ciliatis erubescens pallide sulphureis petalo & que peltata  
compresso-conica germeret pendula Capitula glabra Gaertn.

non videt

*pecta Euphorbia*

*Euphorbia pecta* Gaig. coll. 3. pag. 178.

Habitat in America meridionali herb laevigata.

Suffruticosa. Caulis cospicie calami tereti erectus, basi glaber  
super, bipedalis interdum superne trichotomus ramis errectis  
gigante, hysti trichotomi folia opposta, alterna ad trichotomias  
ternata ovata & puberula integerrima exequaliter reproducta  
venulosa margini petioloque hysti super lora de videnti sepa  
<sup>Cryptothamnus</sup> duplex. Cerasifera pecta angue unum apicum concavante  
pedunculi uniflori hystoli breves, solitarii & trichotomia  
monorum. Flores purpelli fasti les. Calyx hysti 5 dentati lac-  
nus erectis ciliatis. Petala 2 late ovata, obtusa germinari  
oppoista alba. Ceras mona punctatum. Styli 6 de fructu simplici  
fimi. Stygma fructuaria Cappello glabro Gaig.

Caulis petiolatus, striatus, rare pilosus, apice trichotomus. Folia  
petiolata oppositas semipelticinas ovata, integerrima, villosa, uti  
petioli, supra mo lanceolata. Pedunculi terminalis, breves. Vene, una  
flori. Capsule glabro herb laevigata.

excoecata

13<sup>14</sup>  
20 Cuneata Euphorbia Indicophis foliis obovatis, pedunculis lateralebus trifloris  
Symb. trop. <sup>nos</sup> Habitat in Arabia felici Borsh. inter defcriptas vel nomenatas in  
Borsh. non invenitur

Pauli nivm, Rami texti, glabri, cortex cinerosa.

Volea petiolata, plura est Tuberculis ramorum, unguicularia,  
irregularia, glabra, avenia, integerrima.

Pedunculi <sup>per recte</sup> et codem germa cum foliis, <sup>trif.</sup> Velutis, glabri, ungui-  
cularis, triflori. Flori pedicellati: laterales horizontalis, pedicellis  
apice quam una vel altera

Calyx glaber

Petala obovata, truncata.

Pedicellus

Scamena numerosa

~~Pedicellus~~ in vix extra calycem

Cappilla vellosa: Pedicellus vix extra Calycem

*Calyx perianthium 1 phylloum lacinia bracts acutispiculis pubescens*

*Linifolia Euphorbia*

*Euphorbia Linifolia* Gaerq. coll. 1. pag. 135.

Habitat 5

Paulis Inpedali. ramuli plurimi folia ex ramulis angustis lacinio-  
ta, obtusa, mucronata, integerrima, et rurque glabra, lesplie  
remuneralis ad apicem ramulorum terna. Flor. foliatus Verminalis  
lesplis. Calyx glaber. Petala 5. subrotunda, integra corona fimbria  
aurantior. Germen mucronatum capitulo munito Gaerq.

*lineans* E. dichotoma, foliis linearibus integerrimis, pedunculis astilla  
nibus.

*Euphorbia lineans*: dichotoma foliis oppositi linearibus raro  
quadrangularibus, pedunculi solitarii Reichenb. ob. 3. p. 32.

Habitat in Insula S. Cuius?

Pauli fructuosa, teres erectus, ex solo planta glaber. Dolia  
petiolata opposita bipinnata et ultra avenia anervia  
obtusa mucronata. Pedunculi astillares et terminalis  
solitarii uniflori <sup>terris</sup> fructus coriis magnitudine ferentes  
Coronari. Petala integra

*Thymalus dendrodes leptophyllum* Plum. herb. summa

*articulata* La Marckii foliis <sup>longo</sup> plum.

*Thymalus arboreus* etc. Planta tab 251. fig. 1.

~~Peplis~~ L. Dukotoma, foliis integerrimis semiordatis, floribus foliatis axil  
lanibus, caulinis procumbentibus Len. I. V. pag 65

Symb. Bot 254.\*

~~Peplis Dalech. host 1659.~~

~~Peplis Cluf. 2. p. 187. Cam sp. 970~~

~~Peplis mantema folio obtuso Baed. pag 293.~~

~~Habitat in Nakhino, Ceyl. Japania et oriente maritimo.~~

Lupin.

Chamocysse maderensis potana major Pet. 4. 3  
herb mult

Habitat in India Orientali dedit Guj.

Caulis herbacei superne canescens. folia petiolata opposites semi  
pollicariae, oblonga, integrimo, supra glabra, subtus villosa et  
pedunculi axillares, longitudine folii cinerei. Capitula laxa.

Capsula minuta cinerea

No. 8 in Herb.

Cat. foliacum

Polypondium folia lanceolata elliptico, fixisibus costisque folium paleaceo.  
Lamia confutatoribus <sup>laminis</sup>, Lingua serena Cat. folio, pediculi greeni Plin. fil. pag. 112. tab. 120

ad ut fibroso

Subtemento so-

Habitat in Montenat de Ryan.

Stipe quinque pollicani, convexus; altero latere falcatus, tri Costa et  
nervi transversales habet, paleis nigricantibus conspicuissimis ad specie-  
tron ellipticis, 7 d. pollicani, pollicis ter latera, acuminata, bispina-  
tis, supra glabris, transversim remote alternatim luceo-nervosis  
cucis obversa vanofo-reticulatis: nervi flectuosi, puncto franchian-  
at eximum tice serie dupliciti inter nervos proprie squamo nullo  
quantus video globuli decidui remaneat nonnullum illos un-  
fusum denum estanescer

Verbenae anista Calycis floriferi patentibus stili patrum secarvi  
Corolla laevia rotundata stylis: corolla longior Stigma leviter  
bifidum

N<sup>o</sup> 274

Polypond. m. 3. de Ryan

L.

Habita t. 22 et 23 speciem habens.

Radix annua - Caulis plater diffusi, pilosi, dichotome ramosi  
folia petiolata.

Herb. no 47

~~glabrata~~ Euphorbia f. nitidens ramosa, foliis oppositis ovalis acutis glabris  
integerrimi. S. p. prod. pag. 76.

Habitat in Caribea regia di Martfelt qui mecum generose  
cum collectione ditisima plantarum americana rum, qua-  
bus a gubo la morte sub quinque Americano ipse colligit

tota glabra.

Sethynalus apicis caulis erectus, mermis, articulatus, purpureo fuscus. Ramis  
nisi in die operis foliis duhotomi, inferne foliis teclis.

but. G. v. herb. Dolia sessilis, semicoriacea, longitudine inter nodos  
Chamocysa guineensis.

Lignosa hirsuta petr. Articularis, articulatum, acutiusculata, inferre ereta, superi-  
lute quoque rotata.

ze patentia

in herbariis at Dresda Styloides subrotundo, minutus, pallidus, ciliatus

planta Clorae ad apices ramulorum, artillares et in duhotomia, soli-  
tarie, parvi, pedunculati. Pedunculi folio breviori

Calyx glaber; face veluti densis albidus.

Cetala quinque, subrotunda.

Cappula magnitudine ferre feminis Coriandri, glabra,  
tenuissima

24-25

granulata Euphorbia ~~dehotoma~~<sup>opposita</sup> foliis oblongis integerrimis floribus solitariis atilla  
ribus, i.e. aulebus procumbentibus.

Euphorbia granulata foliis oppositis, oblongis, sublespibus, integerrimis;  
floribus atillaribus, solitariis. Tost. de Fr. pag. 94.

Habitus ~~Chamocypis~~  
Caules plures lignosi, feliformes, diffusi teretes dehotome ramosipur  
~~paratiens vix pilosa~~  
~~tertius petiolatus~~  
folia ~~est~~<sup>est</sup> folia opposita, minuta duplo minora quam in Chamocypis  
oblonga, crassiuscula, oculo armato pilosa, integerrima, tali altero  
latere angustiora.

Flori pedunculati minutissimi folio duplo breviori  
Capula seminæ sinapeos minor, pilosa exula.

14-15  
13-14. Lorigata Euphorbia glandifera ramosa, foliis oppositis oblongis obtusis  
glabris in vegetum.

Habitat in India Orientali

Tota glabra

Paulis nermis rami super. Rami apice dichotomi, rami  
quader divisi

+ angustiora

Dolia peti brevis petiolata, anguis ulana, altero latere  
bifurcata, apice mucrone minuto terminata, loris are  
nia, articulus glauco-viride

Pedunculi superne ex dichotomia ramularium, foliatae

& loris parvi.

Cappula glabra, loris, magnitudine feminis Ponanorum

13-14 Linifolia Euphorbia caule suffruticosa, foliis oppositis alternisque linearibus  
ciliatis

Est Ital. Habitat in Insula S. Domingo communicata a Dr. Thominio  
Cauli basi lignosa ~~ramosa~~ inferne ramis bonis oppositis caule brevioribus.

angula inferne Verso superne angulatus, pubescens. Ramas glabri

Folia petiolata ~~glaberrima~~ avena superne alterna, infra  
ma duo ovalia, lege linearia ~~ciliolata~~, ~~intertincta~~ utrinque  
attenuata superne majora bi-pinnata et ultra

Pedunculi ex apice caulis ad ramorum umbellatim subquinque

Calyx glaber laxe glabro

Petala obovata trinitata ~~flava~~ viridis-flavescentia ~~linifolia~~

Stamina filamenta plura

Cappulo glabro levissimo magnitudine ~~lata~~ Peli minori

1444.  
1445. Cuneifolia Cephaelis caule suffrutescens, foliis oppositis, alternisque  
linear-lanceolatis.

Habitat in Insula St. Domingi congenerata a Dr. Thomae  
Pauli basi legnosus, inferne versus sapeme <sup>glaber</sup> fructus; angulatus,  
fiebrisfatuus. Rami duo infrae folios oppositi, caule breviora  
superiores alterni,

Solia petiolata, glaberrima, avenia; duos in forma orelia, opposi-  
tae, longiciliaria, ovalia; super elegia alteriora, linearia,  
utrinque attenuata, sericea, pollicaria, supra rema majora.

Pedunculi ex apice caulis et ramorum, subquadrati, umbellati.

Calyx <sup>uti</sup> glaber <sup>faut glob</sup>

Petala obovata, innotata, vidi fluorescentia.

Stamina plura

Capsula glabra, consimilis, magnitudine Risi menons.

E. articulata L. Park.

Tithymalus fuit arboreus est. Planae. Tab. 251. fig. 1.

glabrata Euphorbia, fructuosa ramosa, foliis oppositis ovatis acutis ex parte basi ante  
germinis Schw. prodrom pag 76

Communicata a Dr Mawell

Tota glabra, Pauli erectus ~~ramis~~ radicibus articulatis purpurascens <sup>Rami</sup> duobus  
~~me ramosis in~~ <sup>conspicuae inter se</sup> ~~ramis~~ <sup>ramis</sup> ~~ramis~~

Solia per filia, semi unguiculata, acutiflora, inferne erecta, superne  
radicibus, hinc infusa cum aqua imbibit

Rynulo subrotundo minuto pallido ciliato.

Dolor ad apicem ramulorum artillare et in duobus solitariae narvi  
~~floris~~ pedunculati folio breviorib.

Calyx glaber, favea villi densi alii vis

Pedalo quunque subrotund

Capsula magnitudine ferre feminis Coriandri glabro, longissima

bux folia E. ramosa pro dichotoma, foliis acutis dichotomie cat ex am  
mi oppositi, caulebus ramisque fructu alopis et articulatis La Matz  
Thymelae fruticosus, bux folium Plum frui: 2.

Habitat in Antillis t

Pauli Casphei per no anfennas, articulatur cotice rugoso rufe  
fiante, ramosus. Ramis dichotomis, foliis coriace bracteis milliones  
sed minora, pedunculis 3-4. brevis uniflori ut apicem ramorum  
petala 4 ex integrum solitaria alba. germen glabrum.

non vidi

cepsitosa 2. inermis puberula cespitosa, foliis frustulatis integrernis  
glabris pubescentibus, floribus terminalibus pubescentibus La Marck

Habitat in Bozana.

Pauci 4-6 pedales pollicaris numerosi, puberuli, glabri, subeficaces,  
latere foliis folia copiosa, parva, glabra integrernis, 4-5: linearis  
longa, flores pubescentes negro-purpureo-fuscates, capsula glabra, petala  
integra

~~Terrenum Hordeum glomeratae lateribus manipuli anfractis, in volvendo  
lateralis fructu anfractis brevibus La Mart. T. Enc. pag 209~~

~~Vall. Pan. t. 7 fig. 6.  
Habitat in Gallo prato~~

1

24 *Myrsinolea* & *Duhotoma*, foliis integerrimi subbrodundi emarginatis subtus unicolor,  
floribus solitariis, caule erecto. Len. I. V. Sw. p. 1974  
~~Cuphorba~~<sup>et</sup> ~~erecta~~<sup>sp.</sup>, folioli ovatis oppositis rameulis tenuebus  
alatis Brown Jam. 235

Habitat in Jamaica & 5

Ramis frustulosis, 1-2 pedale, ramosissimis, erectis, veris, glabri.  
Rami fere filiformes, longi, subdecipi ad petiolaris cne raspatiglabi  
nubri. folia petiolata, opposta, plana: inferiora orbiculata,  
superiora obovata, s. oblonga, l. subbrodunda, caulea glabra, super  
ne glauca, plana, patentia. Petioli brevissimi. Flores minuti,  
pedunculati, solitarii, axillares, profertim versus apiceo  
ramulorum. Petala subbrodunda, lutea. Sw

folia oculo armata  
velis raro, rarer ad  
sparsas, subtus

— glauca

non vidi

amplexicaulis L

Habitat

Herb. Desfr.

accedit ad Euphorbia helioscopia affinen à me descrita. Capsula  
minicata