

Euphorbia

* * * Dichotoma (umbella bifida aut nulla)

fructuoso omnes non
umbellati & ad 20. orben.

24. *myrsifolia* E. *Dichotoma*, foliis integerrimis subrotundis emarginatis subtus. racia
nis floribus solitariis, caule erecto
25. *peruviana* E. *Dichotoma*, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus
unifloris folia aequantibus, caule erecto
26. *portulacoides* E. *Dichotoma*, foliis integerrimis ovalibus rotatis, pedunculis
axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto
27. *longata* E. *rare* *Dichotoma*, foliis oblongis obtusis integerrimis pedun-
culis axillaribus unifloris folio brevioribus caule erecto
28. *lineari* E. *Dichotoma*, foliis linearibus integerrimis, pedunculis axil-
laribus unifloris folio brevioribus caule erecto
29. *parviflora* E. *subdichotoma*, foliis serratis oblongis glabris, floribus soli-
tariis caule erecto inflorescentia ramosa.
30. *graminea* E. *Dichotoma*, foliis lanceolatis ellipticis petiolatis inte-
gerrimis caule erecto, pedunculis *Dichotomis*
31. *organoides* E. *Dichotoma* foliis serratis ovatis obtusis trinerviis, pa-
nicula terminali, caulebus simplicibus.
32. *rotata* E. foliis integerrimis Umbella terminali
33. *alata* E. foliis oblongis integerrimis petiolatis, corymbis terminalibus

34. *Ulofa* L. foliis ovalebus canescentibus integerrimis, corymbis lateralebus terminalibusque, capsulis pilosis. *Ulofa*
35. *hypericifolia* L. Dichotoma, foliis ovali oblongis glabris serratis, corymbis terminalibus ramis divaricatis.
36. *hista* L. Dichotoma, foliis lanceolato-ovatis serratis, pedunculis capitati axillaribus, caulibus pilosis.
37. *pululifera* L. Dichotoma, foliis ovali-oblongis serratis, pedunculis bicaudatis axillaribus, caule erecto.
38. *hypoxifolia* L. Dichotoma, foliis linearibus subserratis, floribus fasciculatis terminalibus, caule erecto.
- ~~39. *capla* L. Dichotoma, foliis integerrimis semiconnatis, floribus axillaribus solitariis, caulibus procumbentibus~~
39. *Peplis* L. (b) caule procumbente
Dichotoma, foliis semiconnatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis
40. *canescens* L. Dichotoma, foliis subrotundis emarginatis obsolete crenatis, floribus axillaribus solitariis, caulibus pilosis
41. *chamaesyse* L. Dichotoma, foliis subrotundis crenulatis, floribus axillaribus solitariis, caulibus glabris
42. *polygonifolia* L. Dichotoma, foliis lanceolatis obtusis integerrimis, floribus solitariis axillaribus.

43. granulata E. Dichotoma, foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis axillaribus; capsulis pelopisculis

44. humifusa E. subdichotoma, foliis linearibus oblongis semulatis capsulisque axilla
nibus pluribus glabris

45. prostrata E. dichotoma, foliis ovalibus obsoletis sematis, pedunculis axilla
nibus trifloris, fructibus

46. maculata E. Dichotoma, foliis oblongis sematis, pelopis floribus axillari
bus solitariis (183. inter 39. et 40. collocatur)

47. rosea E. Dichotoma, foliis superioribus oblongis semulatis, superioribus linea
nibus truncatis apice denticulatis, floribus terminalibus congestis

48. thymifolia E. dichotoma, foliis ovalibus oblongis, capitulis axillaribus
globois trifloris subsessilibus

xxxx umbella trifida Dichotoma

49. umbreata E. umbella dichotoma: bifida, involuellis subrotundis mucronatis,
foliis obovatis imbricatis semulatis, caule fruticuloso.

xxxxx umbella trifida

50. oblitterata E. umbella trifida, foliis oblongis trapezoidis sematis pubescentibus
altera basi parte oblitterati.

51. Peplus E. umbella trifida dichotoma: involuellis ovatis, foliis integerrimis
obovatis petiolatis

52. falcata L. umbella trifida; dichotoma: involuelli subcordati mucronati,
foliis lanceolatis obtusis p. ali.

53. denticulata L. umbella trifida: bipida, involuicelli cordati mucronati,
foliis cetera serrulatis inferioribus linearibus superioribus lanceo-

54. exigua L. ^{latis} umbella trifida: dichotoma: involuicelli lanceolatis, foliis
linearibus

55. tuberosa L. umbella trifida, involuico tetraphyllo, caule nudo.
foliis oblongis emarginatis

56. divaricata L. umbella trifida vel quadrifida, caule fruticoso trito-
tomo

xxxxxx umbella quadrifida

57. lathyrus L. umbella quadrifida dichotoma, foliis oppositis emarginatis

58. terrina L. umbella quadrifida dichotoma, foliis alternis cuneiformi-
bus vel usque mucronatis

59. diffusa L. umbella quadrifida vel quinquefida dichotoma, caule
diffusissimus, foliis cuneiformibus integerrimis alternis

60. aquosus L. umbella quadrifida: bipida involuicellis reniformibus p. ali

61. lobata L. ^{minus obcordatis} umbella quadrifida vel quinquefida: bis dichotoma, involuicelli
nervis oblongis, superioribus, rhombis subrotundis, foliis linearibus lanceo-
latis
p. ali
sub emarginatis integerrimis

panictanifolia Euphorbia foliis ellipticis integerrimis, sulcatis margineque pilosis, pediculis supremis
quaternis confertis, floribus terminalibus

Habitat in ~~America meridionali~~ ^{Carolinensi} von Rohr no 6.

Caulis herbaceus, erectus, simplicissimus subspithamosus, teres glaber, loricis
foliis petiolatis, alternis, inferioribus remotis minoribus, supremis quater
na majoribus, sesqui pollicariis, ellipticis utrinque acutis proter quatuor
nerviis unguiculatis lanceolatis, supra ^{sub} avenia ~~venis~~ ^{venis} margini et
subtus pilis raris sparsis albidis, pallidioribus ^{venis} floribus plerumque subsessilibus
petioli pollicares pilosis pilis

prostrata Euphorbia

Julius Euphonia

~~mucronata E. Infida Detotoma foliis prois lenticulis cuneatis obtusiusculis
flemulis ovato subrotundis La Mart. apice mucronatis La Mart.~~

~~Peplis minor Bauh. hist. 3. p. 670~~

~~Manell. u. 731~~

~~Habitat.~~

foliata Lin

apetala
Caryota E. foliis ovato-lanceolatis coribus integerrimis, inferioribus
alternis, superioribus oppositis, floribus terminalibus Lamour. (Caryota)
Habitat in Brasilia

Herbarius? Rami alterni articulati, inferne nudi. Folia venella villosa
Sicula. petala nulla, gemmae tomentosa

~~Caryota~~

nuda nudi

globiferus: P. umbellata terminali composita, capituli globosi ex spiculis pluribus
arcte congestis. Lin. Suppl. pag. 104
Habitat in Teneriffa

non vidi

30 graminea E. dichotoma, foliis lanceolatis ellipticis petiolatis integerrimis,
caule erecto, pedunculis dichotomis Lin. Mant. 74 f. Vp. 450

Forst. obs. 1. p. 5. t. 31. h. 1. Am. 151.

Habitat in Carthayena graminosius ^{glaberrima}
Caulis herbaceus erectus debilis trif. 4 pedalis. Folia acuta
nitida, sesquipedalia paucis. Pedunculi communes
terminalis, dichotomi erecti. Petala integerrima alba
Capsula nitida glabra, lavi fere

Graminea Poëtia e Curispa attributa Aubi.

non vidi

31 origanoides E. Dichotoma foliis serrulatis ovatis obtusis trinerviis, panicula
terminali, caulis simplicibus. Am. Acad. 3. p. 114.

Habitat in Anpela apud ponis?

Similema origano primo intuitu. Caulis ^{herpeta} prostratus, teres, articu-
latus. Folia rotundo-ovata, sessile glabra serrata, nervis
superioris latere exteriori purpurascente. Rami nulli.
Panicula ut in Origano terminat caulem. L.

33 *alata* E. foliis oblongis integerrimis petiolatis, corymbis
terminatis

Habitat in nova Zelanda

Caulis articulatus ramosus glaber, uti tota planta
Specimen imperfectum in Thunb.

non a proci ante diversa

Decumbens

~~villo~~

E. foliis ovalibus cuneatis integerrimis, corymbis lateralibus termi-
nalibusque; capsulis pilosis pilis

Habitat in India orientali ^{India} ~~India~~

Caules palmani, ^{erectus} ~~erectus~~, teres, superne pilis saepe pubescenti. ramuli
axillares floriferi, foliis parvis longioribus. Folia subpetiolata opposita
vix unguiculata, altes latera breviora obliqua undique integerrima
mucrona minutissima terminata, subtus obscure trinerviis, ope lentis
regularibus, glauco-viridi pilis minutis profertim subtus pedunculis
axillaribus solitariis alternis apice dichylli flores plures conferti
in corymbo dichotomo minut. Calycis ubi capsula pilis minutis albis

Euphorbia Decumbens Torshälai

36 hypenifolia & Dichotoma, foliis serratis ovatis oblongis glabris, corymbis
terminalibus, ramis divaricatis Lin. Am. vic. 3. p. 113.

Tithymalus americanus, flosculis albis Com. proleat. 60. t. 10

Tithymalus erectus aëris, parietalis foliis glabris, floribus ad cauli-
um nodos conglomeratis Roan. hist. 1. p. 197. t. 126

Euphorbia inermis foliis ovatis oppositis hinc serratis uniformibus,
ramis albernis, caule erecto simplici Hort. Ups. 143.

Habitat in India Occidentali & India orientali forte perennis

Facies hypenifoliae. Caulis basi lignosus vase, uti tota planta
ramosissime minus diffusus glaber. Folia petiolata opposita pollicum una subtrenna
Dichotomia herb. 4. ^{partus} glaucis virens serrulata acuta altero latere
obliqua. Stipula minuta ovata membranacea. ^{caulicis} Pedunculis
li terminalibus ramulorum et ramulorum axillaribus ^{pluribus}
Petala obovata alba. Capsula laevis

~~Totum de eadem vix nisi varietas, differt modo stule
superiore et foliis superioribus pelosiusculis~~

Cum maculata conjungit ha. Mark

alba & Dichotoma, foliis serratis ovatis acuminatis, pedunculis capitata
 & axillaribus, caulibus pilosis Lin. Am. acad. 3. p. 114 & Swob. p. 196
 Tithymalus Botryoides zeylanicus, cauliculis villosis Burm. zeyl. 7
 223. t. 104.

planta in Epulo spiculenta Rumph. amb. 6. p. 54. t. 23. fig. 2.
 ramis herbis Euphorbia inermis, foliis oppositis ovatis serratis uniformibus,
 pediculis ^{in america} ^{swob.} capitatis axillaribus Lin. fl. zeyl. 147. ^{in india}
 tota glabra ^{habitat in} ^{India} ^{& ramis herbatis} ^{axillaribus} ^{capitatis}
 Caulis ^{erectus}, ^{subramosus} ^{terres}, ^{pilosus}. Folia ^{petiolata} ^{opposita}
 lanceolata ovata, utraque acuta, altero latere obliqua
 angustiora basi altero basi rotundiora, ultra medium serrata
 villosa ovata glabra, pollicaria, petioli brevissimi. Pedunculi
 axillares seminum quicquidales floris minuti in capitulis
 globosis aggregati. Fructus magnitudine seminis truncati pilosis
 Chamocysse majori ^{in india} ^{utriusque} ^{Personi} ^{Peter.} ^{mus.} ^{no.} ^{752.}
 capitata La Martini dicitur qui ^{compellitur} ^{conjugat}
 lanceolata ovata

cum pilulifera conjugitur a La Mart. sub nomine C. capitata.

59 pellicifera & Dichotoma, foliis serratis ovali oblongis, pedunculis bicaputatis
axillaribus, caule erecto Lin. l. V.

Tithymalus botryoides erectus, florum capitulis conjugatis et longioribus
pedunculo capitebus Pet. gar. t. 80. fig. 14. Burm. Zeyl.

224. t. 105. fig. 1.

Habitat in India

Similis hirta at capitula gemina in fragulo pedunculo
non vidi

non vidi

bracteata E. ramosissima dichotoma foliis ellipticis - oblongis oppositis,
ternatis, racemulis terminalibus La Mark.

Habitat in Kroplea.

affinis *thymifolia*. Caulis herbaceus 0-10 pollicares rubicundi.
ramosissimi paniculati paucum villosi. Folia basi inaequalia
juniora supra villosa caulina 0-glandulosa longa. Flores ex apice
ramulorum superne, calycis purpurei, petala alba interemi-
ma.

gudureoides L. subdichotoma, foliis linearibus cuneatis integris, glabris
subspicillatis caulis ramulosque terminantibus glabris, ~~glabris~~
~~subspicillatis~~ La Mart.

habitat in Ind. orient.

Caules 6-8 pollicares debiles prostrati, glabri, folia obtusa, cum
mucrone lineas 3 longa interdum dentibus 2-3 ad apicem
appula glabra.

an Plukh. Tab. 446. fig. 2.?

30 *hyssopifolia* & *Dichotoma*, foliis subserratis linearibus, floribus fasciculatis terminalibus, caule erecto. Lin. S. V

Euphorbia dichotoma erecta tenuis, foliis linearibus, floribus quasi umbellatis terminalibus Brown. Jam. p. 235

Habitat in America

non vidi

£

Kimsonna Lin fl Zeyl.

Habitat in Zeylona herb. Herm

Caulis herbaceus, erectus, glaber, simplex. Folia opposita, ovale oblonga
vix semipollucaria, avenia, glabra, extusum vix serrata. Pedunculi axilla-
res, uniflori
Diversa indetura reliquis

27.
Eucymodea E. enormis herbaecea ramosa, foliis subcordatis integerrimis petiolo
brevioribus, floribus solitariis. Len. 1. V

Euphorbia inermis foliis sub cordatis obtusi integerrimis pe
tiolatis, caule ramoso erecto Royen. Lugdb. 199.

Habitat in Campechiis herb Royen.

Tu es Euph. cotini folio folio parvo. herbaecea. folia caulina alter
na ovato cordata, obtusa. ramuli bi dentati. folia opposita
rhombos subrotunda, unguiculata. Pedunculi in densis, uniflo
ri uti petioli capillares

Speacuantha & Dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus
unifloris folia squarantibus, caule erecto Len. Ami. Acad. 3. p. 187
Tithymalus flore exiguo viridi apicibus flavis, antequam folia
emittit florens Gron. Voy 50

Habitat in Virginia Canada & ad Bras

Caules perithamidi, erecti. Folia opposita, infimi uno alterove
albescens, cetera longitudine intermedium. Pedunculi
axillares solitarii uniflori, longiori longitudine foliorum
flosculi duplo longioribus hinc

Caules glabres, dichotome ramiferae. Folia remota, opposita, breves
petiolata, angustulanae obovata, integerrima. Pedunculi in
dichotomiis, elongati & esquis pollicari, filiformes, uniflori.
Capsula longe pedicellata herb. Mus.

portulacoides E. Dicotoma, foliis integerrimis ovalibus retusis, pedunculis
axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto. Am. acad.

3. p. 117. †

Tithymalus perennis portulacoides folio DC. peruv. 707. 8. 2?

Habitat in Philadelphia h. 7. Dorsis pinnatis edua infida
Caules erectus pithamouus vel pedalis. folia glabra magnitu
dine portulacoides vel majora (inferius uno vel altero
obtusis) obtusa obsolete marginata. Pedunculi longi
ut in Anacuanha

parviflora & subdichotoma, foliis serratis oblongis glabris, floribus solitariis,
caule erecto simplici alterne ramoso Lin. t. V. p. 450. x
Tithymalus erectus, floribus raris, foliis oblongis glabris cate
gni B. Burm. zeyl. 224. t. 105. fig. 2.
Habitat in India C

non vidi.

similis longata et annua et folia serrata

39 Peplis Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis semicordatis, floribus
axillaribus solitariis, caulibus procumbentibus Lin. S.V. pag. 450
ant. bot. 2. p. 544
Peplion Dalechampii Hist. pag. 1659.

Euphorbia dichotoma; foliis oppositis, integris, lanceolatis, sessilibus
Distr. desic. pag. 93.

Caules pedales; procumbentes, glabri, uti tota planta, articuli
latus: articulis sesqui polliciaribus. Rami alterni, dichoto-
mifere divaricati

Folia opposita, petiolata, ut unguis ulanae, ^{crassiuscula, avenia,} altero latere angustiora
et basi versus breviora, altero longiora latiora basi in auriculam
sepe denticulatam, dilatata

Capitula glabra

Peplis Clus. Hist. 2. p. 187. Cam. epist. 920.

Peplis mantemina foliis obtusis Bauh. pin. 293.

basi altero latere subaureis
oblongis obtusissimis

Dulcis Euphorbia umbella quinquefida bifida, involuicellis cordatis
dentatis, foliis lanceolatis subferrulatis subintegerrimis
Thymalus nemorosus alter foliis latioribus et firmioribus Barrel.

+ 4c. 340

Caules glabri erecti, simplicissimi.

Folia parva sessile ^{prolixiora} linear-lanceolata obtusa, f. minutissime
ferrata fere vix nisi oculo armato videnda.

umbella quinquefida bis bifida, pedunculus unus alterve
superne bifidus

Involucri pentaphylla ~~fructura~~ foliorum caulis. Involucella
diphylla nervosa, dentata dentibus inaequalibus

Petala trionea

et filiatione non negrexit in

+ Euphorbia dulcis umbella quinquefida bifida, involuicellis
subovatis, foliis lanceolatis ~~rotu~~ obtusis integerrimis Lin
L.V. pag. 452.

40 canescens E. Dichotoma, foliis integris subrotundis pilosis, floribus solitariis axil-
laribus, caudibus procumbentibus Len. Spec. pl. pag. 652 x
Thymalus exiguis villosus, nummulariaefolio Tournef. t. h.

H. 87.

Habitat in Hispania, Barbana

Diffusi Caules plures, filiformes dichotomi, teres depresso procumbentes.
Sensu pilosi, pithamoi. Folio brevissime petiolata, se mucroni
Culano, opposita glauca, vnda, emarginata, vix pilosa
albescens latere obliqua. altera fere obscure denticulata. Capsula men-
to pilosa
Solia a pilositate caulis pilosa opponit si probe sensu alt. ead. surgle
bra.

obsoletae crenata
emarginati obscure dente subintegerrimus
Caulibus procumbentibus pilosis

41 Chamœsyfe E dichotoma, foliis crenulatis subrotundis glabris, floribus solita-
ris axillaribus, caulebus procumbentibus Am. ac: 3 p. 115, Frank. 393.

Chamœsyfe Clus. hist. 2. p. 107. Bauh. pin. 293.

Euphorbia inermis, foliis oblique cordatis serrulatis uniformi-
bus, ramis alternis floribus solitaris axillaribus, cauli-
bus procumbentibus Hort. Cliff. 1404

Habitat in Europa australi, Sibiria, Mesopotamia arida O
modo crescendi et toto fructu senescenti, differt modo
caulebus ^{glabris} glabris, foliis ~~crenulatis~~ serrulatis saturate viridibus

subrotundis, floribus
glabris

goliana E. suffruticosa ramoprima, foliis oppositis rotundatis glabris
basi inequalibus, floribus moniciis axillaribus et terminalibus
La Marti.

Habitat in Insula Bourbonica.

Affinis E. Chamocyste ramoprima Caulis crassus perennans
nunc peripollisani articulatus rami nud: ~~alt. mi foliof.~~
folia parva rotundata utraque fere glabra minutissime serrula
ti flores minuti albi subplei subsolitari interdum 2-3.

42 polygonifolia E. foliis oppositis integerrimis lancicollatis obtusis, floribus
solitariis axillaribus, caulis procumbentibus Lin. Am.
ac. 3. p. 116.

Euphorbia minima ramosissima angustifolia Raj. suppl. 431.

Habitat in Canada, Virginia (C. DeRoi & R. Kuhn)

Statura et facies E. chamoecyper ad basin ab altero
latere lobo prominent, sed lancicollata, squarrosa, obtusa

~~Caules proci~~

Caules herbacei, subramosi, pedales, trifidi, rari dichotomi, rami
inferiores alterni, duo
planta Borcia sub hoc nomine descripta

24-25. granulata Euphorbia dichotoma, foliis oppositis oblongis integerrimis,
47
floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus
Euphorbia granulata; foliis oppositis, obovatis, subsessilibus, inter-
geminis; floribus axillaribus solitariis Boiss. Desf. pag. 94.

Habitus Euph. chamaecypis.

Caules plures, lignosi, filiformes, diffusi, dichotome ramosi,
purpurascetes, vix pilosi.

Folia breviter petiolata, duplo minora quam in chamaecypis,
opposita, ^{perinean. o. blongia} ~~transversula~~, ~~ovata~~, ~~oblonga~~,
oculo armato pilosa, altero latere
basios angustiora.

Flores pedunculati, minutissimi; pedunculo folio duplo
brevis

Capsula semine sinapicos minor, pilosissima

^{Dichoto}
Bombensis E. *Dalotoma* foliis oppositis integerrimis oblongis obtusis mucronatis
floribus axillaribus solitariis, caule prostrato laeque prostratis. p. 151.

non. vid.

44 humifusa E. foliis lineari oblongis serrulatis glabris capsulisque glabris, caulibus pro
ambulantibus alternis ramosis. ^{ambulantibus}

Habitat in India Orientali? Thunberg.

Habitus E. granulato. Rami alterni ~~teretes~~ ^{angulati} glaberrimi, ubi tota planta
ramuli alterni pollicares ^{supra} saepe minoribus ⁱⁿ ~~ambulantibus~~ ^{ambulantibus}
basi, pili aliquot minuti ad articulos: an modo ~~vane~~ ^{granu-}
lata. folia ovata amato vix conspersula rugulosa subtus
nervi ^{extrosus} serrulata.

Euphorbia belgradica caule erecto, ramis alternis dichotomis, foliis opp.
positis: caulinis oblongis serratis superioribus semiviviparis, omnibus
sessilibus capulis solitariis, axillaribus tuberculatis *Boiss. Desf. p. 211.*
Habitat ad Belgrad

nichi ignota

46 maculata L. Dichotoma, foliis serratis oblongis pilosis, flombus axillari-
bus solitariis, ramis patulis Lin. Spec. p. 652⁺ Jacq. hort. 2. V. 106.

Thymalus f. Chamisyse altera virginiana, foliis crenatis et macu-
la fusca eleganter notatis Planch. alm. 372. V. 65. fig. O.

Chamisyse f. yce Rosenh. 1. p. 190.

Habitat in America O

Caules plures procumbentes. Folia lineari oblonga tri-
nervia, altero latere maxima parte integerrima, altero
adhuc planta notata macula fusca. Flores sat parvi,
calyce nullo. Fructus pilosus

Si planta a Robinson sub hoc nomine missa hinc folia glabra
sunt uti et specimen a Kunth missum

45 prostrata E. D. uhotoma, foliis ovalibus obsolete serratis, pedunculis axilla-
ribus subtriplois, caulibus diffusis glabris Hort. Kew. 2. p. 1394
Habitat in India occidentali & O

Caulis herbaceus, prostratus, teretes, ramosi,
nerviis. Folia opposita, brevia petiolata, obtusiuscu-
la glabra, obsolete trinerviis, subtus glauciflora,
in lineam. Flores breviter pedicellati super ternis in
sedum solitarii petala purpurea Hort. Kew.

rofea E. foliis ^{serulatis} serrulatis glabris oppositis oblongis superioribus lineari-cuneatis apice denticulatis, inferioribus terminalibus congestis.

Euphorbia rofea dichotoma foliis obovatis basi obliquis apice denticulatis, caule depresso diffuso. Retz. obs. 4. p. 26.

Habitat in arena mobili India orientalis

Caules plures diffusi procumbentes purpurascitis subvellosi vel glabri. Dichotomi foliis opposita semunquiculata altero latere obliqua breviora inferiora apice rotundata margineque altero serrulata superiora subrotunda denticulata. Petala ^{exteriora} alba ^{exteriora} duo superiora longiora linearia oblonga inferiora rotunda.

† Petala 2 exteriora

semihastata altera orbiculata minus data unguiculis peltatis

varietas foliis angustioribus petalis rofeis

Chamaecyp. maderaspatae foliis majoribus S. 13. S. 47
herb. Mus.

Adiantum *hirsutum* L. ramifera: ramis alternis filiformibus dichotomis, foliis
ovatis et rhombis subrotundis, petalis pedunculisque capillatibus

Lin. Mart.

Habitat in Penn.

Racis ad caput mensur. Caulis pedalis. Folia glabra in caule pri-
mariis ovata, reliqua majora subrotunda opposita parva, rhom-
boides. Pedunculi solitarii, flori terminalis vel in dichotomia
ultimis. Calyx brevis calicatus, gemmae velles.

nudifloro L. ramiflora: rami alternis subdichotomis feli formibus
foliis ovatis petiolatis pubescentibus; pedunculis ebracteatis tomas
Habitat Castagna.

Caulis herbaceus glaber pedalis, folia 9-10 lineas longa. Capsula
glabra.

non vid.

microphylla E. remotissima diffusa, foliis oppositis ovatis integris
floribus axillaribus sessilibus aggregatis caulibus filiformibus ra
marum.

Pluken. ~~alt.~~ Malh. 207. t. 446. fig. 5.

Habitat in India orientali.

Caulis filiformis remotissimus diffusus villosus 3-5 pollicibus spi
culo persistente ad articulos, folia parva opposita villosa, facies
hermano.

indica E. foliis ellipticis serrulatis glabris pilis, capitulis axillaribus
subpedunculatis, caulebus simplicibus ha. Mon.

con. Thymaloides etc. Pluk. ~~Bot.~~ Bot. 272 t. 113. fig. 2.

Habitat in India orientali O

affinis Thymifolia non villosa, caulis non ramosus, folia parva
reticulata quadruplo majores quam in Thymifolia subtus
villosa. capitula florum, pedunculata, axillaria alterna
glabripili. 4-5 pollicibus

pallida L. foliis oblongo-subrotundis subintegerrimis ^{caulibusque diffusis} caulibus glabris, floribus
terminalibus pluribus.

Habitat in India orientali Rottler
Caulis plures filiformes simpliciter prostratae, digitales

Stemba subsessile glaucis-viridis saepe medio macula purpurea
crassifolia vix versus apicem denticulata, opposita, subseriata
mucrone ^{sub} minuto terminata. Flores ⁱⁿ apice caulis vel ramulorum
plures minuti: Petala alba rotundata
affinis conspiciendi et thymifolia

40 Thymifolia L. Dichotoma, foliis serratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus
glomeratis subsessilibus, caulebus prostratis. Lin. 1. V

~~Tithymalus Indicus annuus dulcis, floribus albis caulebus
siccantibus et rubentibus Pluken. alm. 372. t. 113. fig. 2.~~

β. Tithymalus humilis ramosis semis hispitis, foliis thymi serratis
Murm. reyl. 225. t. 105. fig. 3.

Habitat in India O

Talio Chamocysos et folia majora magis ovata opposita ^{vel oblonga}
altero latere tantum serrata semunquiculata ore acuti
trinervi. ^{et pilosi} Rami pubescentes
variat foliis glabris ^{et pilosis} et pilosis ramis pilosis et pubescentibus
Caules prostrati diffusi ramis semipedalis herb thymum

fructibus pilosis

Figura Pluken. cum mea haud bene convenit

Dichotoma E. pubescens, foliis oppositis sessilibus lanceolatis integris, floribus axilla-
ribus sessilibus ^{longis} Desf. pag. 69 3.
Habitat in Egypto.

mihi ignota

punctata L. caule simplicissimo foliis, foliis ellipticis subtus rubro flavore
punctato hook. fl. lesp. 2 pag 97

mehi ignota

peplodes E. cymosa, foliis obtusatis acuminatis integerrimis floribus axillaribus
solicitariis, gemmulis ovatis acutis giovan. fl. Menap.

Tabernom. ii. 597

Euphorbia polygonifolia Forst.