

Euphorbia
umbella & rotunda
umbella trifida

Euph. e Monana ded. Thomin. Caulibus pluribus ramosis, umbellis trifidis

in Euphorbia petalum est involucrum pro flammeo fragilo fragulum hinc
monora monandra Rich

Damila Euphorbiarum a Rhamnus distinguatur, quod flamma in centro ex-
centur, non vero ~~verso~~ ^{verso} peripheriam descendet in Rhamnis. Coroneae duabus
Capitulis, vel ³ appuram nam aut unicum ad est ab centro vel duo 3
capitula evadat ut unicum vel alterum absit. Richard

germinalata Euphorbia fruticosa exsty ramosa, foliis va-
lebris ferratis inferioribus hyalinoibusque oppositi

Osteg. Sc. pag 104

Habitat in Cuba

Folia intermedia alterna. Pedunculi terminali

De hotomi

nm v.d.

obtusifolia E. umbella trifida involucello liliis condato obtusipennis, foliis linearibus obtusi mucronatis caule glutinoso
Habitat in P. b. freii herb. Schum: 5
Tolpa rugosularia, festilea

32. Aboto E. foliis ovatis integerrima umbella terminali. Tost. prodr. n. 207.
Habitat in Societatis Insula.

Folia opposta, uti cauli glabra, breviter petiolata, pubnervosa
semipeltinaria in

Rami tereter ternati. Sola pedata, semi peltinaria, oblonga
globerrima, aenaria, exerria crassifolia, integerrima. Peduncu-
li axillari: et terminali, ter vel 4 dichotomi. Semina parva
grisea. a Tost. mis. in herb. mis.

28a figura foliorum

cum umbella terminali ac hujus ordini

obliquata E. um bella de hotoma trifida, involucello foliordati oblongo
foliis sparsis linearis lani carni formibus retusis subemarginatis
Forst. descr. pag. 93
Habitat in Ogypto

Michele Agnelli

47 imbricata

90-31

Eichornia:

Euphorbia umbello bifida, involucello puberulento mucronato; foliis
obovatis imbricatis fermatis, cuneo-petiolatis

Habitat in Portugallia

Fridiculus palmans vel planum ultra, basi ramosis: rami teretes, dentes

Cotyledones ex apice foliorum, glabri uti tota planta: a foliis denti
solio seplexa, conferta, ^{utique} imbricata, cuneata, nerva, bilinearia, superne

Dentata, inferne integerrima, mucronata,

Umbella terminalis, bis bifida. Involucra pentaphyllo, oblonga
integerrima. Involucella diphylla, robustiora.

Petala integerrima.

Stamina numerosa: filamenta albida.

elliptica s. pubescent, folio alterno ovato- elliptic & subdentato
petiolati : summa oppositis umbella bifida. La Marck.

Habitat in Peru C

Caulis per quinque aliis simplex extendit ramos fructus, superne
pubescent, folio pubescens, foliis juniora pollicaria superne
opposita: florula basi maiore purpurea. Capitulo glabra

non vidi

55 Tuberofa & umbella trifida, involucro tetraphyllum, caule nudo, foliis oblongi emarginatis hinc. l. v.

T. Thymalus agnus castus humilis, foliis latioribus oblongis Tuberofa radice. Chrys. suppl. 433.

T. Thymalus humilis, folio caputthi Bac. Burch. cent. 2 p. 27.

V. 23. T. Thymalus Tuberofus ciliatus, foliis oblongi crenulatis et planis Burm. Afr. 9 v. 4.

Habitat in Aegypto et Othopeia t. herb. Gus.

folia radicaria, sanguinolentia, ovato-oblonga, obtusa sinuata, crenulata. Petiol. extrosum sensim crenulata, bipinnata, apice velutina. Scapi longitudine foliorum superne incana. Involucelli 2, longitudine floris, subrotunda incana. Umbella 3-pda. Involucra 2, levissima oblonga est Aegypto?

non vidi

50 obliterata L. umbella trifida; foliis oblongis ^{oblongis} ~~trapeziformibus~~ ferratis pube
scientibus; altera basius parte obliterata s. pro r. pag. 76.

Euphorbia obliterata Gaige - host. 151. 5.

Habitat en Jamaica 5.

non vidi

toncifolia L. umbella trifida simplici. Et infra pedunculo alter
nis unifloris foliis angustis linearibus bracteis puberulatis la-
mari.

an *Tithymalus cyprius* Baen. Hist. 3. p. 663.

Habitat in Delphineti

an varietas L. pines. Paules plurimi simplices pedales, folia glabra
involucra linearia, petala lutea bicoloria.

— laterilibus unifloris

non vnde

Dracunculus es. E. umbella trifida, Duthotoma foliis frangi lineatis con-
gi integerrimiis involvulis involucelloisque foliis similibus ha Mook
Habitat in Apula Francie.

Tota glabra. Caulis 6-8 pollicares, simpliciter, folia bipinnata
umbella trifida. vel bis bifida, flores in Duthotoma fuscis; petala
minutissima semilunata.

51 *Peplos* L. umbella trifida: dichotoma, involucellis ovato, foliis integrernis obovatis pediolatis Lin. Am. ac ad. 3. p. 1177

Peplos Dod. pempt. 375.

Peplos f. *Efula rotunda* Baum. p. 292.

Peplos minor Baum. h. 3. p. 670.

Habitat in Europa cultis oleaceis ♂

Ramis erectis, palmari vel fruthariorum subramosis, glaber, ut tota planata. Folia caerulea, alterna, angustulana vel minora integrernis involucra involucella oblonga, involucella inferiora oblonga, apex
ra acuta capitulo levata

rest. determinata

frathulata L. umbella trifida dichotoma foliis pinnatis alternis oblongo
frathulatis subpenatis La Mart.

Habitat in monte id est.

Glabra, caules pedales ramulis paucis alternis, folia pinnatae vero
pollicariae umbella trifida Ver dichotoma involucra ovato-
oblonga. Cappula glabra.

non vidi

acuminata. E. umbella trifida subduotoma involucello cordatis mucronato
foliis oblongo-patulatis acuminatis capsulis conoidatis longis lar-
mari.

Pepli annua foliis acutis flore multifloro mississ. Boni sp. 24. t. 13
fig. 1.

Habitat in Helvetia

Caulis 6. 7 pollicaris glaber superne ramulis pauci floriferis
stellatus. Capsula glabra

non vidi.

5⁴ exigua & umbella trifida, dichotoma: involucellis lanceolatis, foliis linearibus
Amaras 3. p. 110² subcordato
Acuta a Epula minima Tragi Dalech. hst. 1656.

Tithymalus. Epula exigua Baub. p. 291.

Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella uni
versali trifida, posticabut dichotomis diphyllis Hort. Upf. 143^x

edup. B. Tithymalus. Epula exigua foliis obtusis Baub. prod. 133. p. 291.

Exigua V. Tithymalus exiguus. Sottotolis Baub. prod. 133. p. 291.
ge San. 4. 5. 32 / mai. monspel. 2. 59. Habetat in Europa et Barbana a in Collebus. p. 3. in pratis

V. relegui minor vix palmeni, basi ramata uno altero glaber
uti tota planta. Folia ut in relegui alterna inferiora obtusa
minora superiora rauiae clarae acuta. umbella galericulata
quadrispida simile rami propterea involucella ade
nata. B. Caules plures semipedales vel minores. Bas
ramosus folia per sum versus semper majora foliis arcu capar
inferiora omnia apice et basi delatata. Basit inferiore versus
semper per sum versus majora retusa superius minus cum acumi
ne longiora.

aliam in barba regi habita diversa foliis copiofionibus inferioribus
ut in p. superioribus attenuatis dentis bsp delatae bepolli
cavibus rame gloriperi potest illis supereris. Tertiis pedales
petae in omnibus bewormis.
Plos in omnibus bewormis

Dentigulata

E. umbella trifida bifida, involucello cordatus mucro
nati foliis crenatis cuneatis superioribus linearis acutis
mucronatis
Lege et Barbara

Caulis pluus vel bafi monoplo rami ascendente bent
glabri, a crestis in ferme ex operati. Dolia inferio
in confertiora obliqua baya rugosa angustata mucronata
in novis fructibus superiore rotunda, angustiora cuneana in mucrone
confertiora attenuata, omnia glabra, rugosula, integerrima
involucello fructibus folium. involucello cordato
acuminata. radice bis bifida folia pubes glauca
Euphorbia mucronata Capite latus glabro folia uti involucello obtuso
la macte armata ferrulata
fide et Gaius Pl. Austr. tab 120.

matine offens foliata ad caule ex ramique erectionibus nec diffusa
foliis rufioribus glauco viridibus involucello ex foliata
umbellis rami erecti

~~facto~~
ad diffusa vel
~~terracotta~~ ~~vase~~ pleata vel profilla Euphorbia Dolia vel
quod excedo ex vase caput vel foliata haec quamvis involuc
culla utramque fere
ex calce

289 *municata* E. umbella trifida; bifida, involucelli cordatis foliacei lanceolato-feminae
vix capsulis mucinatis

Habitat

Paulis exectis pedalis & Taber folia fasciis alterno polliciana. Umbella
lateralis bifida. involucra fructuosa foliorum modo minora.

an' silvae germanica? forte platynphylla

Caperis Q. caule volubili; foliis ovatis obtusis petiolatis integris Lin. Suppl.

peç. agt. 432. S. V. pag. 895

Habitat ad Capo Speci

56 Dwanéata C umbella Trifida v. quadrifida, caule fructuoso Trichotomo l. v
p. 451. Gaegu coll. t. p. 58.

Habitat.

non vidi in eadem asperula lota

iputid folia E. umbella subquadrigeda, bifida, ramulis floriferis numerosis atellanibus involucella subcordatis, foliis oblongis obtusis pinnatis integerrimis La Marck

Tithymalus platyphyllas Clus. hist. 2. p. 190

Platiphyllum hispanicum Lob. c. 361.

Habitat in H. Francia

affinis cum hibernica sed confundatur. Diffit capilli non versus copio, involucellas non ovatis sed cordatis umbellis minus durpi, caule uti foliis glabri

encoderis E. umbella subquadrigida bifida parva, folia linearibus
margini revolutis grayi minutis reflexis, lacinias cordato-reniformi
mibus la mark.

Habitat in Cap. b. p. r.

Caulis ramo uno vel altero simpliciterenti, pedalis. Dolus par
va cespitosa; umbella trifida summa bifida, involucella reniforme
emarginata, flava purpureo-scentia.

in eadem or. ~~terris~~ folia in herbar. Schum.

non vidi

obtusifoliae E. umbella subquadrigida duhotoma, folia alterna crenatim
cuneiformibus retusis mucronatis caule fruticosa La Mart.

Tithymalus hispanicus, folio longiori cordiformi Tournef. Cor. 7.

Habitat circa Cadiz

Pauli crassitrix penne asperina, 6 pollicans rami laterales
flexiles. Sola polliciana involucello ovato, acuto, petala
biornata.

non vidi

Eryngium *nigri-* umbella quadrifida bifida
foliis linearibus micranthos involucellis ovatis aiutis
globose fructuosa.
Habitat in montanis Schloss for. 5
Specie nigra folia pallidiora. Pedunculi laterales
uniflori capitulo lobes petala canata.

called ~~at~~ ~~in~~ ~~part~~

affinis ~~Thymefolia~~

90 terracina l' umbella quadrigida. Dihotoma, foliis alternis cuneiformibus
retusa mucronatis. Lin. Spec. pl. p. 654

~~Tithymalus mancinus, folio, cusp., Terracinae Brasil. 9. 653~~

Habitat in Hispania et Italia, Barbana C

Paulo basi ramosis rami adscendentis, semi pedales festigatis.

oculo armata
ferrulata uti
involucella
glossa

glabri simplicifoli. folia superiore altera pollucens exponit
versus inferius minor ^{et manus cuneata} Umbella quadrigida
Involucra struita foliorum modo minus cuneiformis interdum ^{obtusa} amar
minus retusa. Involucella cordata mucronata rada bipedi

Capsula glabra petala bicornia
rami laterales uniflori

Euphorbia cuneiformis allom.

— marginis simulato fabri

scite

anula fundata

^{6o} diffusa E. umbella quadridida vel quinquepida dichotoma, caule diffusissimo
^{57.} foliis ^{alteris} cuneiformibus ^{margine comis} integrissimis ^{alternis} s. v. pag. 451. Goëtje Mijel

^{p. 311} Tethymalus manni folio retuso, Terracinae Barrel. cc. 833
Habitat abit, in Italia Barbera
familia in omnibus Terracina diversa fere locorum foli ferati
foliis involucratis acutis.

~~notarii~~

hoc notarii nomen ^{Vernae no mescitur cum revera}
^{ad Terracinam exst. alter ad}

7 Apicor C. umbella quadrifida - bifida, involucellois reniformibus: pri
66 mis obcordatis lin. S. V. pag. 451. &
Tithymalus tuberosa radice Pluf. hist. 2. p. 190

Tithymalus tuberosa gyneriformi radice Baub. gen. 292.

Habitat in Creta

Rami flexiles. Folia linear-lanceolata, obtusa: floriferi subtota
ovata. Umbella quadrifida bifida nec ultra. Involucrum
universale tetraglymmum, foliolis subrotundis recte acutis. Flores
tella prava foliolis obcordatis posteriora reniformibus
vix mucronatis

non vid:

57 Lathyns E umbella quadrifida dichotoma, foliis oppositis integerrimus

Lin. aon. Acad. B. p. 1194

Lathyns Cam sp. 968.

Lathyns major Baeh. p. 293.

Habitat in Gallia, Italiæ ad agronum magne. ♂
Rami laterales floriferi. Solia lanceolata. Involucrum univerfa
le Tetraphyllum portulaciae. Phyllo cordato lanceolato typic
o. Ano glabra. umbella radice brevi vel ter bifida; ultimi fun
gines. Petala biloba obtusa. Cappula globosa cori glabra

recte

61 Cota E. umbella quadri vel quinquefida: bis duhotoma, involucellis ^{nimis} ~~presso~~
oblongis; superioribus hombeo puberulatis, foliis lanceari - lanceolatis
submarginatis integerrimis Hort. Kew. 2: p. 141. *

Habitat

Tota glabra. Caulis fruticosus, teres levigata, folia grossa, scabria,
sed quinquefolia. Involucra univeralia foliis immobilema
Involucella prima duhotomia ovali-oblonga, submargini-
nata, foliis dimidiis breviora; involucella secunda duhotomia
et floralia elliptico-puberula, emarginata. H. Kew

~~name~~ recte

Differentia justa longior