

Euphorbia

Euphorbia

Chamaesyce maderaspatana foliis minoribus Petw.

Habita in Is. Franco Commer. herb. Guif.

Pauci-plexus, spt. thamoi, dichotome diversi, galiformes; inferne teretes
glabri, apice villosuli. Solea Euph. chamaesyce dimidiata, subrotunda,
vel ovalia, apice serrulata, subtriangularia, supra glabra, subtus rare
ciliata, basi altero latero obliqua. Flores in ramos brevibus attillatim
nudis, attillares, conferti cum foliis. Capsula parva, levata, pulchra, profer
tim anguli.

Aliud specimen sicut female, diversum modo foliis planum majoribus.

Euphorbia thymifolia L. Munk

7-22
No & inter Commer.

humuli Euphorbia

Habitat in Cipro herb. ^{intermixta} Leb. p. 100.
Caulis longitudine digit. ^{erectus}, simplic., basi ramos uno vel altero pelopincolas.
Sola inferiora unguicularia, cuneato, superiora semipollucaria, s. longa, omni-
excepto costa glabra, obtusa, extorsum versus pubina qualiter ferrata, basi
versus integerrima, ferratur acuti. Umbella radii 4 or bifida. Involucrum 4 phyl-
lum, structure foliorum, modo parum majora. Involucello cordata, fina-
ta. Capitulo glabre.

Spathulata Euphorbia.

Habitat.

herb. Thoreni

Caulis herbaceus, erexitus, glaber. Solio cuneato, spolia, ferruginea, obtepsaria
apice ferrulata, dividenda, glabra. Umbella lateralis bipida, terminalis triu-
toma, duobus rotunda. Involucra triphylla, facie folium caulis involucellorum
duo. Cappelle parvo, glabro, lutes-

Ventata Euphorbia

Habitat in Carolina Herb. Rich. C

Paucis erectus, fructuosa, pilis raro apice frequentibus adpersa, pubescens
apicem, basi ramosa. Rami simplices. Folia opposita, petiolata, rotundata
pollicaria, extremitate obtuse serrata, basi acuta supra glabra, pubes pallidus
raro, nervis villoso. Flores in apice aggregati, exenti foliis non nullis mag-
nitudine inaequalibus. Capitulo glabro, leviter

purpureata Cyp horten

Cephaelis purpureata Thunb

Habitat Pan-pi herb. Rich.

Caulis pedalis, simplex, glaber. folia sessilia, remotas, lanceolatas, subtruncatis,
integerrima, inferiora obtusa, superiora acuta, pollicaria. Umbella latera
lis bifida; involucro lanceolata quinque. Radix quinque bis dichotomae. Iuxta
cuciella condita, ut orique glabra, obtusa. Capitulum glabrum, mucicato

multicaulis Euphorbia

Thunberg

Habitat Parf. herb Auton

Caulis simplex, glaber, adspicens. folia pinnata, lanceolata, superiora oblonga, via
semipeltinaria integerrima, crassi-pula. Involucra plura, cordata. Radii 8, bifid.
involucella cordato-fibrotunda. Cappulo glabro, convexo. Petala levata, bicoloria.

pubens forma Euphorbiae

Habitat in Carolina herb-Rust.

Paucer-pubes, spathamoi, apice br. dentatoni

habes

meruni alina Euphorbia

Habitat in Carolina test. Ruth.

Caulis herbaceus, ascendens, pubescens, apice trifidus. Sola seplex, opposita, semi-
pollicaria, ovata, integerrima, margine oculo armato irta, obtusa, aerea
tenua, pubescentia glauca. Pedunculi in apice ramorum, solitarii, uniflori, breves.
Capitula globosa, lato-

Euphorbia

Tithymalui americanae pro dulci

Habitat in America herb. Mus.

Caules plures, herbacei, glabri, dichotomi, diffusi, foliformes; fructus terminali - Capsule
an gulis pilosis

Euphorb. 162 2. notes in collectione

patula Euphorbia

Tithymalus orientalis patulus et humilior salicis folio villoso Tournes. Cor.

Habitat in Orienta herb. mur.

Pauli terer, superne villosus. Sola oblongo-subiuncata, villosa, integri
ma. Umbella trifida, tridichotoma, radice villosi heretibus. Involucra
et involucello fructuosa foliacea, mucronata. Flores sexplesi. Capsula cana
ta

Euphorbia

Tithymalus orientalis latissimo folio villosus flore aureo segmentis rotundis
ribus Tournes. Cor.

Habitat in oriente herb. mag.

Paulis erectus, simplici, villosus. Folia petiolata, basi acuta, l. f. 3 pollia
no, apice obtusa supra acuta, integrimma, subtus profectione villosa.
umbella laterales bifida, terminalis bifa, bifida. Involucra oblonga,
acuta. Involucella cordata, acuta, integrimma, glabra. Petala orbiculata. Capsula mucronata

botryoides Euphorbia

Tithymalus indicus annuus Iulis botryoides geniculatus Herm. prodr para.
Bat.

Chamaesyce americana major floribus glomeratis cymosum numerus folio hispido
Breyne prodr. 237. ?

Caerulea brasiliensis Erra de Cobre Lusitanie Marigr.

Tithymalus erectus serratus floribus in capitulum longo pedicellis in
fidens congestis Plum.

Habitat in America herb. Mus.

Caules plures, diffusi, alternati ramosi, purpurei, glabri. Solea petio
lata opposita, oblonga vel ovato-lanceolata

possideo

Dracunculus Euphorbia umbella trifida dichotoma, foliis involucris involuc
los que linearis lanceolatis

Habitat in insula francia Commer. herb. Mus.

Tota glaberrima. Caulis herbaceus, erectus, semi-pedalis, terco; rami in primis oppositi.
Solia fascia, int. etiam bipinnaria, ^{interiora minora} alterna, avenia, obtusipinula. Umbrella vernalis. Involucra trinphylla. Flores fasciati dichotomias et apice.
Capsule magnitudine Conaidri vel parum maiores; pendentes, glabrae, oblongae, le
ves.

crenata Euphorbia foliis ovatis pilosiusculis crenato-serratis, pedunculis terminalibus
solidanis unifloris

Habitat ex horto Panj. herb. f. us.

Paulus herbaeus, erectus, striatus, rare pilosus, superne dichotome ramosus. Sola
pedicellata, opposta, nollicana, id quinque pilis ranimis obtusiusculis vel acutis
ad medium obtuse serratis, suprema integerrima. Pedunculi ex dichotomis su
perioribus apice, filiformes. Calyx illiosi, uti germe. Capsula semina laevioris
panch majora, glabra, loria.

cicatnata Euphorbia folia linearibus.

Habitat in Canariis herb. Aug.

Rami teretis, pauci ramos, cicatnati, subproliferi. Dolia frequentia, linearia
lanceolata, angusta, cespitosa glabra, acuta, integerrima, versus apicem nano
num, bipinnularia. Pedunculi ex apice, plurimi, bifidi cum flore in d.
vixera. Calyx urceolatus, intus pilis longis vestitus. Pedicellus germinis
unguicularis. Capsula indepta, glabra, levigata. Semina levigata, globosa

multiflorum? Euphorbia

T. Thymalus erectus - serratus; floribus in caputulum longo pediculo insidente con
gestis. Plum. prev.

Habitat in America herb. frus.

Paules adspersi peli roros. Tola petiolata, mollisaria, alata, ex & versus serrata
trapezium, supra glabra, subtilis rarae pilosa. Pedunculi ali astillares; foliis bre
vioribus, apice bifidi, mani dichotomie breves; congesti in capitulo. Capsula
pilosa inservit. Vanae foecunditate villoso flavo, vallis articulatis ut in
herba.

Lophogonium Cephaelium

Cephaelium Lophogonium in Mart.

Habitat hieb. fuf.

Ramis prothamnoides, inferne versus attenuatus, glaber, loris; superne squamis con-
pressis crinitatis, serratis, laevis acutis, pungentibus. Dolia in apice, lanceolata
mica, petiolata, 6-7 pollicaria, obtusipinna, emarginata, coriacea, avenacea,
glaberrima. Pedunculi ex apice, foliis brevioribus, Verdichotomi. Involucrum
laevis, colorata: foliis inferne angustatis et dorsum dilatatis, semi-
rotundis.

goleana Euphorbia glabra, fruticosa, foliis subrotundis subseriatim, pedunculis axillaribus terminalibus unifloris
Euphorbia goleana Lamk.

Habitat in insula Bourbonia Commerif habb. Gasj

Trunculus spathaceous, costituta per recte columnas, teres: rami fragilissimi, dichotomi, ramulosa. Seto non nullo articulata. Petala rotunda data.

ophthalmea Euphorbia foliis trapezoides oblongo-serrulatis, capitulis terminalibus.

Habitat ad Ries juncos Commes herb. fusc. O

Dales - Euph. herpestis. Pauli Duhesmei; pilosa - subhispidus; statim a radice ramosus: rami patentissimi. Sola petiolata, opposita, angusti-ovata, finitima glabra, plumbeo maculata, subtus pilosa - ciliata, avenia, bifida altera latere obliqua, altero rotundata, apice serrata usque ad basin ferrata. Scleror in apice ramorum conglomerata in capitulo magnitudine pugnacii pedicelli brevissimi. Capsule minutae longe ovulari sunt latiori, contendunt in eis Ries juncos ^{oculorum} ~~vixum~~ dependentes vixum restituere bene quoque ophthalmica esse videtur uti ales Euphorbia Eulicis-

Euphorbia foliis concatenatis puberulis et corpus serrati, umbelli Veronensi
bus bifidis, capsulis villosi

Habitat in Cima Dombey herb. Gus.

Panus herbaeus, prostratus, diffusi, dichotome ramosissimi, villosi: rami
flexuosi, pedales, exsicca teretes. Folia opposta, subopposita, semi-pinnata
vel minora, basi subrotata, obtusa vel eruta, peniora utriusque vi
cis roris, etate glabra, altero latere siccis usque ad basim altero tantum
versus medium serrata. Flores terminalis, Pedunculi bifidi. Calyx
hirsuti. Capsula magnitudine seminis Sinapeos; loculi

adanthodes Euphorbia foliis caulinis rhombico-oratis, ramorum stoma seu puberulum;
pedunculi terminalibus foliarios unifloros

Euphorbia adanthodes L. M. Knob.

Habitat in Peru herb. Guss.

Caulis erectus; ali velque partes plantae glaberrimi, Ariat; teretes, scutigera

caulis, rupestris. Rami altiori, divaricati, pilosissimi, distantes, alter ex altero
tumiditatem deorsum, ciliatae, patentia. Folia lacinia, alter ex altero,
lanceolata, subrhombico-orata; indecurrens in venas, venae peririma obtusa,
de cunctis rami: ramorum appetita, semiunguisularum, ^{rhombico-subrotundarum} pedunculae
structura foliorum ciliatae. Petioli capillares, ramorum, ~~per~~ alter
pascua longior, alter brevior. Pedunculi capillares. Calyx orbe ciliatus. Capsula
ex magnitudine Coriandri, lata; subvellosa.

Da

nudiflora Euphorbia foliis oblongis integerrimis vellosulis pedunculis terminalibus duthotis
mo elongatis

Euphorbia nudiflora L. Mart.

Habitat in Peru herb. f. sp. O

Caule herbaceus, glaber, inferne teres, superne trigonius, dichotome divisi; erectus;
semi-pedalis. Folia petiolata, opposita, semi-peltinaria, rhombo-oblonga, utrinque
acuta, utraque pagina vculo armato rare villosa. Pedunculi ex apice, plurimi
dichotome divisi. Petala rotundata. Capsula semine finaeos parum major, lani
glaber.

Euphorbia

Habitat in post praelin Commer. herb. Aus.

Caulis suffructicosus, Yerei; ut: tota planta glaberrimus. Ramae opposte, pollicinae, oblongae,
breviter petiolatae, apice rotundatae, avenae. Pedunculi Vermunales dichotome di-
visi. Capsula glabra

Sæcæs Euph. Descripta in Symbolis ex Ind. Orient.

Euphorbia

Habitat herb. Desfont.

Paulis herbaceis, erectis, Verso. Folia flescas, alterna, sesquipolluana, linear-lanceolata, integriflora, acuta. Umbella trifida, bipinnata, trivolvula et tri-
volvula linear-lanceolata. Flores flescas in dichotomia et apice.

Euphorbia umbella trifida, bifida, foliis obvatis, involucellois obvatis

Habitat in Syria Herb. Desfont.

Planta pupilla, longitudine digiti minimi, glaber, ramosus. Sola alterna, brevi
ter petiolata, magnitudine fol. Thymi serpylli, glabra. Petala biornea, cor
nua setacea

Euphorbia

Habitat in a Damafini Lest. Desf.

Pauli eretiv, teres, stratus, simplici, vellosus. Folia sessiliae bi. Tripollianā,
lanceolata, attenuata, acuta, id nī que vellosa, profectim pectinis, serrulata, basi
sericea integriformis. Umbella laterales 3-4 fida; terminalis octofida, quadri
fida. Involucra oblonga, acuta, glabra, mucronata, margine fimbria. Involu
cilla cordata, glabra. Calyx ex vellopi. Petala subrotunda. Capsula lanata

Euphorbia

Habitat in Syria Desfont.

Paulo fimbriata; Teres, glaber. Folia sessilia, pollicaria, glabra, margine prolabia
in ferore emarginata, supero in obtusiuscula. Umbella 5-que fida, bifida. Flores
in 5-phylla: foliola lanceolato-oblonga, glabra, fere pollicaria, in volucella
subrotunda, glabra. Capsula glabra, lata.

elystria Euphorbia ^{polycapitata} foliis oblongis glatni serratis, caule pelosifculo, foliis floralibus colo-
rato
Euphorbia elystriae L. var.
Habitat in Peru Auct. Guj. O.
Caulis simplicis, erectus, peduliciferus; pili rari adspersi. Folia petiolata,
rarae qui pollinaria, alterna, distantia, supremo florale opposita, confusa
4-5: acutae, a medio ad apicem serratae, supra glabra, subter pili rari sp-
arsis. Flores in apice modo Euph. heterophyllo, umbellati: umbella bifida.
Pedunculi pubescens. Folia floralia basi persuspirantia.
confer cum Euph. est hoste Dr Cels.

+ tomentosa Euphorbia tomentosa incana, foliis oblongis, floribus axillaribus con-
gestis

Habitat in Senegal. herb. fusc.

Tota villosa, incana. Caulis, ramos, herbacei, frustamei, erecti, recte,
alternat in ramis, per parafentes. Tola angusti ulana, subfusca,
apice dentata - ~~lato~~^{lata} - serrata, altero latere basi obliqua. Capsula in
cand.

microphylla Euphorbia

Euphorbia microphylla L. M. Knob.

GB. T. & K. Malabar pars vicin ad orientis herbariorum foliis.

Chamœcyte vnd. erecta ramuli et foliis confertis sparsis Plakka.

Habitat in India orientali herb. fus.

Semelis Euphorbia 182 at tota glabra, foliis subrotundis, integerrimi, apice subemarginatis vel oblique tridentatis venosi. Capsulis glabri lentic.

B. Differt foliis plenis que duplo majoribus.

Euphorbia

T. Thymaleus americanus serpylli folius.

Habitat herb. fuf.

Paucis prostrati, superne dichotome divisi, filiformes, palmatis dultro,
superne, ut i foliis subtus pilosuli. Tolia linearis - oblonga, obtusa, acuta / pena
ta, parva. Olores in axillis foliorum rameolorum axillarium brevissimum,
resister. Capsula pilosiflida.

linenifolia Euph. umbella multifida, bifida, umbellis cordatis, foliis linearibus
lanceolatis

Euphorbia Linenifolia L. Mart.

Habitat herb. fusc.

Praeferit e capitulo foliorum muniti, ut tota planta glabri. Sola fructuosa, pro-
quenteria, bipinnularia, acuta. umbello laterale bis bifida, terminata
post fido, interdum 12 fido, bifida. Involucrum lanceolato-oblonga. Involucella
cordata.
ni fallor eadem est ac Gerardiana.

Euphorbia

Habitat in Canada herb la Manche

herb la Manche

Euphorbia

Habitat in Peru herb Guipioi

Caulis herbaceus, erectus, teret, glaber, ramosus: rami alterni, dichotomi, patens
ter. Sola petiolata, opposta. Petiolis capillares. Tolum petiolatum in iug-
ri onbus dichotomis, in ultimis pedunculis solitarius, uniflorus. Cappa
lo ope lenti, pilosa supra. Sola caerulea inferioria ovata, obtusa
prope rotundata colliganda

Dad I. Aupio

India Euphorbia

Habitat in India orientale herb. Linn Martius

Praes pluvia, erecta, simplicia, rix frithamii, glabri, villosuli. Sola pe
tiolata, unguiculata, oblongo-ovata, altero latere bafos; angustiora, obli
qua, fimbriata, orulo armato villosula. capitula astellana, peduncula
ta, an pelulifera ha

mucronata Euphorbia

Habitat herb. ha Maritimi

Caulis basi rotundifl, opposi, putthamensis

encodae Euphorbia

Habitat herb. la Manthii

Panzer monogr.

Tomentosa Euphorbia

Peplum Rauwolf. Hodoep. I. cap. 9. pag 117

Euphorbia enemis sub hispa, foliis oppositi ovalibus crenatis

Habitat Halepe herb. Rauwolfie

Caulis pedalis. Rami alterni, dichotomi, apice Tomentosi. Dolia petiolata, opposita, unguiculata et paucicilia, crata, obtusa, denticulata, aenaria, enervia, bafi squamia, Tomentosa, glauca supra glabra. Pedunculi in dichomia, foliatae, une flor. Trichus nubans, incanus, Sem. Conandri granum major.

tuberosa Euphorbia

Tithymalus africanus Tabernp., folio myrti Boerk.-Lugd. t. pag. 257

Euphorbia inerme, foliis oblongis obtusis emarginatis Rögen fl. lugd. prodr. pag 99. no

³⁰
Habitat in cap. b. sp. herb. Rioyenni

Radix fusiformis. Sola radicula, petiolata, bipinnaria, basi acuminata, apice
emarginata, glabra avenia. Petiolis folio longiorer. Scapus radiculis, longitudine
foliorum. Pedunculus ¹ et ² inferne et 3 in apice. Involutum triphyllum, oblongum
pedunculi uniflori. Bractea die subducta, magnitudine florae

Ler. habet et addit. Syn. Raj et Burm.

pubescens Euphorbia

Habitat in Cap. b. free herb Provençal
Endet spathaceous. umbella squarrosa

enicordae Euphorbia

Habitat in Cap. b. sp. herb. Argentia &

Individulus erectus, pedalis, ramosus, teret. Rami parsi, pauci, simplicios, erecti. Dolos
frequenter sima, sessilia, semienguiularia, leneana, deflexa, arcuata, angustispinis
revoluta, apice bidentata, dente usque intermedio parum longioris; nitida, glabra.
Umbella trifida, bifida, cum ramulis 3 brevibus ad basim. Involucra orata, alle-
nuata parva. Involucella cordato-reniformis, magna, colorata.

revoluta Euphorbia.

Euphorbia revoluta foliis cineris gemitosa, ramis simplicibus, foliis lineari bus. Baum
prod. fl. cap. pag. 14.

Habebat in Cap. 6. sp. herb. Royenii t.
Rami sparsi, elongati. Umbella simplices, triradiata. Involucella rhombica.

picofolia euphorbia

Habitat in Cap-h-pri herbaceous

Rami inferne a capo foliorum denticulati. Dolor frequentissima. Umbella 5 fida, bifida
cum ramis lateralebus ultimus excedatibus. involucro oblonga. involucella
cordata-reniformia.

Vestita Euphorbia

Habebatur Cap. b. p. i. heb. Royenii 5

Caulis angustus, ramosus. Rame vestitus, sparsi, glabi. Tolia frequentes, immissas, unguiculatae, scissae, lanceolatae, oblongae, integriformes, subimbricatae, mucronatae, basi versus paucimis angustatoe. Embello trifida, bifida. Thumba et thombe subrotundatae: ex velutella pulvri formae
capitatae glabre, levigatae.

glauci folia Euphorbia foliis cordatis obtusis integerrimis

Chamdrysa maderaspatana maculata major Ret. 47.

Habitat in India orientali herb. Mus.

Ramei herbacei, diffusi, fin plios, glaberrimi, illi tota planta. Tola breviter petiolata, angustulata, glaberrima, glauco-viridis supra macula purpurea. Flores superne in axillis ramulorum, brevissimorum, Capsule glabra.

Euphorbia

Euphorbia Icenes Parva.

Habitat. heb. maf.

Paulo herbaeum, basi ramosa, palmaris. Rami diffusi. Solia cuneiformia, glabra, submucoata, angustularia. Umbella trifida. Anvolucellis cordatis, acuminatis.

Lepidium

Tetragonus sativus angusto folio glabro Boerk. ind. alt. 1. 256. no 11.

Habitat herb. mus.

Radix annua. Caulis erectus, pedalis, ramosus; rami simplicios
alterni, uti tota planta glabri. Tolla frequentia, vsq; pollicaria, lanceolata,
obtusa, integerrima. Umbella laterali bifida. Terminalis, o radiata, bi-
fida; radice frondosa. Involuta fructuosa foliorum, minora, mucrone brevi
terminata. Involutella cordata, integerrima, mucronata. Petala lunata.

Capsula glabra

Euphorbia

Tithymalus characias foliis minonis folio. Monif. hort. reg. Blasj.

Tithymalus lithopermi majori folio Magn. bot. Mons p.

Tithymalus penea Lob. 4c:

Tithymalus cyparissia affinis, lato Leucogii folio erecta non ramosa Boiss.
mag. 30. t. 15.

Habitat. herb. May.

Paulus herbaceus, erectus; striatus, pubescens, ramosus: rami simpliciflori.
Solia linear-lanceolata, sparsa, sessilia, 2 pollicaria, acuta, integerrima
pubes pubescens. Umbello laterales bifidae, terminalis 10 fidae, bifida.
Gloriosa in fructuosa foliorum; modo minora, aristae brevi terminata.
Involucella cordata, angusta, integerrima, semi-pollucaria. Petala
lunata. Capsule glabre, lvae.

Euphorbia

Euphorbia orientalis latissimo folio villosus, flore crenato. Tournef. Cor.

Habitat in oriente heb. Tournef. Mus.

Ramis herbaceis, simplici, villosus, Versi. Sola petiolata, bipinnaria, oblonga
ut inque acuta, integrerrima, villosa, propositum pubes, bipinnatis. Umbella
laterales bifida, terminales quinquefida, bifida. Involucra fructuosa folio
num. Involucello cordata, acuta, glabra. Petala subrotundata. Capsula
municato, glabra

Cryptothrix

Strophocarpus nemoriferus

flexuosa Euphorbia foliosovata - laniolatis caulinis serratis basi est roriferi dilata
tri dentatis, ramis integerrimis, caule erecto flexuosa
Habitat herb. mus.

Tota glabra. Caulis fruticosa. Rami teretes, purpurei, leves. Solea oppositae,
caulinae pollicoria, remota serrata, altero latere breviora, altero gibba; rami
rurum angustulana, integerrima. Flores in ramulis, axillares, salitarii. Cappula
minuta, glabra, levigata.

Euphorbia

Tithymalus nemorosus villopus mollior Barrel f.

Tithymalus montis pollinis amygdali angustior folio pallido hispitoso host.

Part. S. S. ^{Circeea australis}

Habitat Reb. Mus.

Paulis herbariis, crevatis, simplici, teres, glaber. Folia lesplia, bipinnata, an-

cam colata, obtusa, integerrima, villosa. Umbella laterales bifida, ver-

mentales quinquefida, trifida, bifida. Involucrum structum foliorum.

Involucella oblonga, villosa. Capsula canata, laces.

Euphorbia

Tithymalus hispanicus folio longiori cordiforme Tour. G. A. H. 87

Habitat in Hispania herb. May.

Caules ascendentes, frustam di, glabri, ut tota planta, Veretei. Folia sessilia, pectinata,
polliciana, semiloba, retusa. Umbella trifida, biserrata. Involucra orata. In
volucella cordato-orata

brazilienfis Euphorbia

euphorbia bracteosa Le Manh

Habitat in *Baccharis* (Commeif.: herb. fusc.)

Baileya fruticulosa, Verne, glaber, glomerata, opp. 1-2, leg.

unguiculana vel *renum* ultra, oblongo, ferrulata, obtusa pima, gravis vix
Florae in astellis foliorum ramicolorum. Capsula levata, pilosiflora, globosa, minima

90

^{to} altero latere obliqua, trinervia, basi sericea integerrima, state nuda.

Polygonatum glabri

haben

cespitoso Euphorbia folioe cuneiformibus fuscis; floribus axillaribus Vermi-
nibus que foliariis

Euphorbia cespitosa La Marsh
Habitat in Bonaria herb. ^{Correspondens} truf.

Paulus herbaceus, ramosus, diffusus; palmaris et ultro: rami gracili, ut: tota
planta, glabri. Sola uncinata alana, integerrima, panem emarginata. Pedunculi
foliarii, uniflori, longitudine foliorum. Glandulae 5 que in calyci. Petala
calinota. Corolla fastigata. Capsula glabra, lata, angulis acutis. Semi-
na oblonga, trigoneta, nivea

Pyrifolia Euphorbia

Euphorbia pyrifolia L. Mart.

Habita in insula ^{Commissif.} Tuni et herbas.

Caules plures, glabri, pedales, erecti. Sola petiolata, aggregate, Tripollaria oblonga, obtusissima, mucronata, inferne attenuata, integririma. Pedunculi superne, solitarii, alterni, approximati, uniflori, bipinnulares.

uniflora Euphorbia foliis puberulis integrerrimi glabris, floribus terminalibus
folitanis.

Habitat in Boemia monte video Com mef herb. muf

Caulis herbaceus, puberulus; palmarum, glabri, rubentes a latera folio Com
mejor. folia frequentia, sessilia, lanceolata, semi pollicans, glabra.
Flores in apice, atro purpurei.

sordida

nummulana Euphorbia foliis oblongis integerrimis glabri, caulebus apice trifidi.

Habitat in Bonaria herb. mag.

Planta digitalis, basi ramosa, diffusa, glabra. Folia angustulana, crassula, avencia. Umbella 3 fida, cum pedunculo uniflora in centro, subbifida. Involucra et in volucello structura foliorum. Capitulo nutans, glabro.

prof. Deo

rubens Euphorbia umbella squalida, trifida, bifida, involucris oblongis, capsula
municato glabris, foliis lanceolatis integrernimis glabris.

Tithymalus characicus 4. Dod pempt. 3. p. 360.

Tithymalus characicus radice pyramidalis Monf. h. reg. Blas.

Tithymalus characicus rubens germanicus P. Baeh.

Habitat in Europa Herb. Mus.

Ramis teres, erectus, glaber. Sola basi attenuata, integrima marginie
lancea, glaberrima, & qui pollicaria. In volucra ^{et involucello} aborata. Capsula
rubens, crustato mucinato.

Laurcolefolia Euphorbia glabra, umbella multifida bifida, in involucro oblongo involu
cellis cordatis, foliis oblongis

Tithymalus lugdunensis laurcolefolio Pat. hosti regii Parif.

Habitat lugduni gallorum. nob. Mys.

Radix repens. Caules erecti, teretes, fulcatis, glabri, superne parum ramati:
rami simplices. Dolia sessilia, bipinnata, oblonga, inferne subcuneiformia,
integerrima. Umbella laterales bis bifida; terminale triplacida.
Involucra polypodialia, pinnata: in volucella obtusa, semipinnata
integerrima. Petala lunata. Capsula glabra, pendula, levigata.

glauca Euphorbia. umbella multifida, bifida; involucelli oblongi involucellis cor
data; folia ovato-oblonga integerrima

Tithymalus orientalis latifolius, folio glauco et glabro Tournet-Por.

Habitat in oriente herb. mif.

Tota glabra. Caulis erectus, simplex, paleatus, crassissime panno argenteo. Folia
sessilia, alterna, bipinnata, obtusa, simpliciter venosa. Umbella late
rata bifida, terminalis & radicata. Involucra utr. pinnata: involucello
obtusa integerrima. Petala lunata, purpurea. Capsula glabra, levigata.

Euphorbia

Habitat in Canario Herb. Desfont.

Paulis herbariis, erectus; teres; glaber. Folia sessilia, pollicaria, linear-lanceola-
ta, frequentia, acutis, glabra, margine scabro. Involucra pentaphylla, foliolis
structura foliorum. Umbello 5que fido, bis dichotoma. Involucella ovata, acu-
ta, margine scabro, atri folia e denticulis minatis opere cantis videntis. Pappi
la magnitudine Coriandri, glabra, lacer.

Cuphorbia

Habitat in Hispania fratre. herb. Mus.

Plantes plus oī, erecti, ad scindentes, herbacei, glabri; Veret ex; fructus; simplicissimi. Flores linearis paniculata, pro quo quod illa annua, glaberrima, annua, sparsa, coriacea, integrerrima, avenia. Flores in dichotomia et a rara
lespiser. Capsula glabra, levigata

1823 inter plantas est Mus. herb.

Leptophylla euphorbia umbella complex tuberosa glauca, foliis involucris que lancea
bus, caule fructuosa.

Tithymalus leptophyllas Math. 1256. Engd. N. 1317

~~Habitat in Italia. herb. May.~~

Tithymalus supinus maritimus lini folius percorri Capitanus Turnef. G. R.
Herb.

~~Habitat in Europa australi. herb. May.~~

Planta semipedalis, ramosa, glabra. Rami parsi. Folia supera, lancea, feni polli
canis, acuta, integerrima, glabra. Involucra 5-phyllo, structura foliorum.
umbelle radice 4., pollicares tunc 5^o intermedio brevissimo, uniflori. In
volucella diphylla, lani colata, unguicularia. Capsula pendula, glabra,
cavata.

ifatidifolia Euphorbia umbella 4fida, bifida, foliis involucrisque lanceolatis, involucella
cordata.

Tithymalus latifolius hispanicus C. B.

Euphorbia ifatidifolia La mank

Habitat in Amazonia Herb. Guy.

Paulis eretrix, simplici, semi pedalis, pinatis, crassitri digiti intermedii; simili
Euphorbia. Folia fessilia bi-tripollaria, sparsa, lanceolata, obtusipinifula,
integerrima, sordes apicem obfolete crenata, glabra, crassa, avenia. Um-
bello laterales bifidae, terminales quadrifidae, bifidae. Involucra figura foliorum
Involucella cordata, acuta, latera crassipinifula, avenia.

Euphorbia

Habitat herb. Desfont.

Caulis ericaceo, ramosus: rami grasti, Terete, glabi. Solia breviter petiolata, oblonga
glabra, unguiculata, integerrima. Umbella 4 fida, bis bifida. involucra et involu-
cella oblonga. Petala semiorbiculata. Capsula mucronata.

puta Euphorbia

Habitat herb. Desfont.

Paulis dichotomus, erectus, quinquangularis, herbae cur. folia ovata, pubescen-
tia, petiolata, acuta, integerrima. Pedunculi in apice ramosi, solitarii. Cap-
sula glabra, lata.

Spathulata Euphorbia umbellis Lateralibus Vermi nobisque bifidis Dicotomis, foliis
lanceolato-subtriangulari fimbriatis, involucro oblongo.

Habitat in monte video Commer. herb. Rus. O

Paulis cruxstria fere penno anterino, herbae eu, erecta; Veres; glaber, simplicet. Solan
pollu' anà, alterna, desplia, utique glabra, altero latere ad medium usque
fimbriata, altero latere panum ^{usque} infra apicem obtusiuscula. Pedunculi latera
les alterni, terminales Verri, per dichotoma divisi. Involucra et involucel
la oblonga, mucronata, unguiculata, sensim minora glabra, flosplia, seminata
pedicelli in Dicotomia apice, foliarii, uniflori, brevissimi. Calyxis glabi.
Capsula breviter pedicellata, erecta, glabra, loris, globosa, triloba, magnitudi
nem seminis Pon' andri

Euphorbia

Tithymalus hispanicus Lefrancois. Folia longiori coniforme f. g. r. h.

Euphorbia retusa L. March.

Habitat in Hispania herb. Gus.

Folia pollicaria, lanceolata, basi versis parum & sensim angustata, sessilia, mucronata
margine scabria & ferratis mucronatis spinis. Involucra & involucella cordata, bernstein
Euph. Euph. hisp. revocat L. March quo Tamen omni modo vera planta est. An
Euph. foliata Linn? Caulis apice interdum dividitur in ramos tres vel quatuor, deinceps
Dichotomia

obtusifolia Euphorbia

Euphorbia obtusifolia L. M. R.

Ithymalus annuus minus foliis obtusis cordiformibus Tournes.

Ithymalus satativus minus foliis cordatis.

Habitat in Cenetijs Pantioch herb. Guy.

Paulis longitudine Digihi menimi. Sola per silva, parva frequentia, emarginata, integerrima. Involucra cordata, mucrone acuminata,

reliqua vide in ha. March Diet.

Euphorbia glaberrima, foliis lanceolatis ferratis petiolatis, capsulis glabri coriaceis.

Habitat in Antilles heb. Ges.

Planta Digitali, Dichotome divisa. Caulis purpureo-viridis, filiformis. Sola opposita, bifida subirata, ~~remote~~ ^{acute} ferrulata, acuta latera unica usque ad bifurcationem altera ad medium remote ferrata, acute. Pedunculi in dichotomis d'apice, solitarii, capillares, breves. Petala orbiculata. Capsula minuta.