

Euphrasia

1. latifolia E. foliis dentato palmatis, floribus subcapitatis
2. officinalis E. foliis ovatis acutis dentatis lineatis et dentibusque
3. tricuspidata E. foliis linearibus superne utraque unidentatis et integerrimisque
4. odontites E. foliis lanceolatis scabris omnibus serratis
5. cuneata E. foliis subuneiformibus remote inciso serratis, lobis superioribus gibbosis,
6. lutea E. ^{fimo} foliis linearibus serratis, ^{subpetiolatis} superioribus intercorimis foliis floralibus quo
7. linifolia E. ^{propitiis} foliis linearibus integerrimis, calycibus canis alteris nisi foliis floralibus ^{caulis lani} alteris
8. viscosa E. foliis linearibus, calycibus glutinoso ^{viscido} ~~viscido~~ ^{viscido} glutinoso
9. conyziflora E. ~~corolla tubo filiformi longa~~ ^{staminibus corolla brevioribus}

Longiflora Euphrasia Euphrasia pubescenti-viscosa, foliis lineariibus integerrimis, corollarum
tubo filiformi.

Euphrasia vermiculato folio hispanica Barcl. ii. 1204. haud opt bona.

Euphrasia longiflora: foliis lineariibus integerrimis, corollarum tubo tenui calycis
multatibus longiore Loe Mark. Encycl. Tom. 2. p. pag. 398.

Legi in Aragonia 3 milliana a Casas Augut in via Tiner versus Huesiam \odot

Cauly erectus ^{tenuis, hirsutus} ~~frondosus~~, simplex vel superne rami 2-4. Oppositi caule bre-
viores, inferne versus aphyllus, uti tota planta, pubescenti-viscosus
Folia sessilia, opposita, lineari pollianaria, sursum versus sensim minora
linearia, crassiuscula, integerrima, obtusiuscula.

Floer superne in caule et rami, sessilis, alterni, secundi, lutei, pollia

Calycis ^{res} laciniis quatuor lineari; obtusa.

Corolla tubi filiformis, calycis duplo vel triplo longior, superne parum am-
plicatus. Labiium superius oblongum, ^{erectum} ~~frondosum~~ concavum, emarginatum.
Labiium inferius superiore longiore, planum, ~~frondosum~~ ^{bilobum}.

Stamina ~~filamenta~~ ^{filamenta} 400 longitudine corollae, apice sub galea corollae curvato.

Andher ^{trifidus} ~~trifidus~~; laciniis divaricatis mucronatis.

Capsula oblonga, calycis dimidio longior, simili Capsula Euphrasia officinalis

veste

(Dignoscitur corolla longior quam in reliquis speciebus)

Euphrosia

Pedicularis orientalis annua pphyllifolia, flore flavescens Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus. O.

Caulis spithameus et ultra, simplex vel subramosus.

Cyrtosperma

Habitat in Barbana herb. Desfont.

Caulis erectus, sesquipedalis, teres, glaber, uti tota planta. Folia lineari,
integerrima. Spica terminalis foliosa. Flores approximati, solitarii, rubri

Cupressa?

Pedicularis orientalis annua Psyllii folio flore flavescente Tournef. Cor.

Habitat in Oriente herb. Guss. O.

Caulis erectus, villosus, palmatis, canescens. Folia unguiculata, opposita, linearia, integerrima, villosa. Flores axillares superne, scapales, solitarii, villosi-rufi.

Euphrasia

Euphrasia podensis grammene folio Tournef.

Habitat

herb. Desfont

Caulis herbaceus, pedalis, erectus, ramosus, teres, glaber, nitidus. Folia usque
lana, linearia, integerrima, glabra: floralia opposita. Flores axillares, solitarii,
remoti. Calices remoti, folio longiores, sespiter. Calyx striatus, glaber

rubra E. foliis cordato-ovatis acute serratis, calycis obtuse dentato
caule ramoso Hoffm. bot. Kaptenb. 1791. pag. 215

Amel. cynosa

verna Euphrasia folio ovato lanceolato dentato, bracteis flore longioribus
Bellardi observ. bot. pag 50 app. ad fl. Pedem. pag 33.

Habitat inter segetes Pedemonti
vix nisi varietas Eup. dentatæ

armata 4.

Swartz

Siabra

8. foliis lineariibus ^{terrestribus} caule integerrimis caulaque siabris calycibus
oppositis ^{et glabris}
Habitat in Maricao Schousboe
affinis lutea. Caulis lignosus ramis teretibus punctis minutis
elevatis siaber rami oppositi frequenter decussati remoti capis
res simplicis sumi digitales superiores parum ramosi foliis
lineari unguiculatis crassiuscula ramorum minorum angustiorum
floralia opposita parum latiora flores pedunculati oppositi,
superne in ramis folio florali longiores stamina corollae
oppositibus

Latifolia & foliis dentato palmatis, floribus subcapitatis. Lin. l. v.

Euphrasia purpurea minor Bauh. pinod. III. pen. III. Magnol. Monsp.
95. 7. 94.

Euphrasia pratensis latifolia Italia Bauh. pin. 234 Monsp. herb. 3.

p. 430 f. 11. 7. 24. fig. 0.

Euphrasia vestita latifolia pratensis Col. exph. 200. 7. 202. fig. 2.

Manuel. c. 276. 1-3.

Habitat in Agg. Italiae, Montpelii Barbana

Caulis simplicissimus vel basi ramosus digitalis interdum palmari
erectus, tetragonus versus apicem purpurascens, villosus superne
in f. opus. Folia opposita, sessilia oblonga, dentibus utraque 2-
3. profundi obtusi in e. sa margine revoluta, supra f. na unica
pro serrula dente, subtus nervis totidem elevatis, villosa.
flores oppositi, sessiles axillares inferiores remoti superiores conferti
in apicem, folia florales fructuosa caulicorum. Calyx tubulosus
lineis sive viridibus elevatis. Deat mucro antherarum v. n. n. n.
ope lentis conspicua

Pediculoni Eretico anima maxima floribus vix conspicui Tournef
cor. 9. herb. maj. del. 4

officinalis Euphrasia varietas dissecta Hall: hist. pl. par no 303. d

Euphrasia de nucifera dissecta foliis, angulato Boiss: mus. 2. p 54.
Tab. 60. Tilli hort. Pfl: pag. 59.

Caulis palmans, erectus, pubescens, ramosus. Rami simplicissimi, filiformes

Folia sessilia, opposita, semineque vicularia, lanceolata, ^{basique} utraque ^{apiceque} acuta, lineata utraque bis tridentata: dentibus in medio folii, superioribus brevioribus, inferioribus longioribus, apice utriusque folii seta terminata seta flavescente longitudine ipsius plant dentis

Flores axillares, solitarii, oppositi, sessiles.

Corolla Euphrasia officinalis.

An pro specie distincta habenda? ^{enim} cum ab officinali differat foliis lanceolatis, dentibus omnibus foliis sub et floribus omnibus oppositis nec solum inferioribus, figura foliorum.
In reyno Neapolitano non vero, in nostris vero regionibus nunquam observari

officinalis L. foliis ovatis lineatis argute dentatis lin. L. V.

Euphrasia Cam epit. 767.

Euphrasia officinarum Bauh. pin. 233

B

Habitat in Europa posius aridis O

Planta digitata simplex vel ramosa, Caulis tetragono velloso
rami simplicissimi. Folia opposita ^{ternata utriusque 2-3} parva nervosa, calycis
oppositi sepales inferiores remotiores, superiores confertiores

Tricuspidata & foliis linearibus tridentatis Lin. l. V.

Euphrasia angustis et tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis
Plukh. alm. 142. T. 177. Fig. 1. Zan. her. 110. T. 76.

Habitat in Italia C

Caulis & extrusculus rari veltifus. Folia sesplices, opposita, polliciana,
versus apicem utraque denticulo minuto. Flores in axillis
supremis sesplices oppositi diffiniti foliis brevioribus
Corolla longior quam in aliis odoratide ^{et conjungit} exceptis.

odontiki E foliis lanceatis: omnibus serratis Lin. S

Fl. Dan. 4655

Euphrasia altera Dod. Pempt. 55

Euphrasia pratensis rubra Bauh. pin. 234

β. Euphrasia sylvestris major purpurea latifolia Col. Euphr. 1. p. 201. 7

202. fig. 1.

Habitat in Europa arvis pascuisque sterilibus ^{retrospum pilosus}
Caulis erectus, fruticulosus, uti folia, scaber, inferne ramis simplicibus
mis oppositis folia scapula lanceolata polliciana vel inaequa
remote serrata, 7 in nervia flori axillari sub brevis pedicellulata
sub opposita vel alterna a medio caulis ad apicem secundis

lanceolatis scabris omnibus serratis

verna
~~fruticosa~~ Bellardi non differre videtur nisi tempore florendi

cuneata Euphorbia foliis subcuneiformibus dentato-incisis, caule fruticoso

Euphorbia cuneata foliis subcuneiformibus incisis Cost. prodrum p. 43. n. 234.

Habitat in nova Zelandia Tabernaem.

Stem ^{caulis} ramosus. Rami teretes, vix villosi.

Folia opposita, vix semiunguiculata, ovata, basi cuneata, glabra.

Racemi pedunculati ex apice ramorum et ramulorum, sesquipedicellares. Locis opposit.

Corolla labium superius gibbum, fissum.

confer. specim. ex herb. Lund

cuneata Euphrasia

Forster

Habitat herb. Musf.

Caulis semipedalis; ramosis; rami oppositi; subsimplices; glabri. Folia petiolata, minuta,
glabra, cuneata, apice utraque dente. Pedunculi axillares; solitarii, oppositi; uniflori.

Cuneata E. foliis ^{remote} peltatis serratis, lobis superose
gibbosisimo
Euphorbia cuneata, foliis ^{sub} cuneatis serratis incis. Forst. prodr.
Habitat in nova Zelanda.

Lutea E. foliis lineari-bifurcatis: superioribus integerrimis Lin. S. V. Gaerq. fl.
auct. 4. 7. 390.

Euphrosia proteropifolia Bauh. pin. 234. Monf. hist. 3. p. 432. J. 11. 8. 24.
Fig. 16.

Euphrosia lutea montana angustifolia major altera Colum. Euphr. 1. p.
204. 7. 203.

Habitat in Europa australi montosis aridioribus

Caules erectus pedalis ramis paniculatis perspicuis glaber
tetragonis utrinque foliis exsertatis ope lentis vellis raris adpressis
rami oppositi folia linearia angusta remote paucis prostrata
subpetiolata raris a floralibus alterna. Racemi terminalis
ramorum solitarii elongati. flores distincti alterni foliis floralibus
li ^{longioribus} ~~terminalibus~~ calycis campanulati stamina corolla longiorum

Anifolia E. foliis linearibus. omnibus integerrimis, calycibus glabris Lin S.V.

Euphorasia foliis lini angustioribus. Baub. pin. 234.

Euphorasia Anifolia. Pol. eiphr. 2. p. 60. f. 69.

Habitat in Europa australi ☉

off. ^{une tetragoni}
~~vix exist~~

Caulis ramosus glaber costis cuneis paniculatus. rami
oppositi filiformes. folia angustissima ut unguicularia
villis tenuissimis pubescentibus. folia floralia opposita
Flores subsessile in spica brevi cinctae semper triflorae
vix ex folio florali brevioribus. Calycis oblongi et pilis
minutis depressi canescentes. antheris villosis

lobis oppositis

lobis ^{primis} alternis ^{secundis} foliis floralibus

viscosa L. foliis linearibus, calylibus glutinoso-hispidis Lin. Mant. 26 * P. 11, 50
Pedicularis annua lutea tenuifolia viscosa pomum sedolens Gand.
an. 351. 4. 70 80

Habitat in Galloprovinciâ et Hispaniâ glareosis peribetibus ☉

~~Caules erectus - spithamou superne ramis vel 4 or oppositi
etis minutis glutinosi pubesca cetero pubescens. Calice
sespila, integerrima unguiculata omnia opposita ubi
calycis villosi - glutinosa. Calyces alterni, distantes, seim
o. Corolla tubus filiformis calycis triplo longior
Corolla flava~~

Differt a lutea foliis linearibus lanceolatis nec striatis linearibus
calyibus villosis viscidis nec glabris corollis clausis nec stami
ne brevioribus.

non vidi