

Evolvulus

1. nummularius E. foliis subrotundis, caule ^{procumbente} repente, floribus ^{at} spissis siccis.
2. punctata E. foliis subrotundis emarginatis subtus pubescentiis punctatis, pedunculis
^{viret w proiec.} ^{et} ^{et} ^{longitudine foliorum} caule repente
3. gangeticus E. foliis cordatis obtusis mucronatis vellosi petiolatis; caule diffuso
pedunculis ^{Infloris}
4. multiflorus E. foliis oblongis utrinque glabris, caulebus diffusis pedunculis
^{Infloris}
5. aceroides E. foliis oblongis subfencis, pedunculis unifloris, caule diffuso
6. senecio E. foliis concoloratis subtus fencis, pedunculis brevibus unifloris
7. linifolius E. foliis lanceolatis vellosi spissibus, caule exerto pedunculis
^{Infloris}
8. ~~soldanella~~ ^{E. foliis reniformibus planis integri subtus subfencis pedunculis} ^{Cauli unifloris. Capsula 3 dymo}
9. emarginatus E. foliis reniformibus undulato puberulatis utrinque glabris,
petiolis coriaceis, calyxibus pulpos

10. mucicatus E. foliis reniformibus repando, petiolis mucicatis.

aureo ²erect Corollaria pilosus; foliis ovato lanceolatis acutis pubescentibus, caule pro-
cumbente.

Habitat in guinea Thonning

Caule filiformis, ramosus; latere, piloso subliseretur: rami flexuosi,
simplices. Solia brevissime petiolata, ^{distantes} ~~non~~ bengallaria, pubescentia
Pedunculi attillares; folio duplo longiores; capillares, ~~anæflori~~, raro bflori.
Bractea tua versus apicem pedunculi, parva, persistente, subulata.

Corolla rotata, plicata, semiqueaque fida, aureo, magnitudine Anagallis
cerrensis. Styli 4. Stigmata simplicia. Capsula carnosa, magnitudine
Conandri, subglobosa, subtiliorum: loculis deprimis.

~~Scoparius Convolvulus~~ cf. nitidus erectus glaber, rami virgatis, foliis sepalibus-linea-
ribus, rame terminali; pedunculis subtifloris. a. Suppl. p. 135 - L.S. V.

p. 203.

~~Habitat ad oppidum N. Cruz. t.~~

~~Rami teretes fere~~

~~rami~~ ~~spiciforme~~ genito. Caulis teres glaberimus. Rami simplici spini exenti
angusta et polluta ~~racemos~~ ~~racemus~~ terminalis ~~racemis~~ ^{et} remotis, pilosula, ereta
et parum metra triflori rarius uniflori, bracteati. Corolla extus ^{longior} ~~longior~~ alba. Lignum
flos intermedio ~~superiori~~ ^{longior} l. c. ~~longior~~ L. C. ~~longior~~

~~Scoparius~~ ^P foliis lanceolatis petiolatis, pedunculis subtifloris calyculatis,
cæsi ovatis acutis, caule fimbriatis, rami virgatis Hort. Kew. I. p. 213.

~~calyx~~ ^{imbricata} oblonga subcrenata

multiflorus Evolvulus foliis oblongis utrinque gabnis per caulebus diffusi pedunculis

latis Ynfloris

Habitat in India Occidentali

Caule basi ramosis, rami simpliciflori. foliis Pedunculi longispmi
capillares & f. s. pollicares in flor. Pedicelli etas pones laterales longi
ores bitractati. Similis alpinoides differt foliis quadrangulo majori
bus et tenella tantum subtus pilosa, adultiora utrinque glabra.

tridentatus *Evolvulus* foliis linear-cuneiformibus tricuspidatis basi delatatis denta
10^o pedunculis unifloris Lin S.V. p. 2902 Burm. fl. Ind. t. 16. fig. 3.
Lendera Gladi Rheed. Mal. II. p. 133. t. 65:
Convolvulus minor procumbens; acetoplo foliis tricuspidatis ad eum quatuor
no: summe apice tricuspidatis Blatt. man. II. t. 167. fig. 5.
β. *Convolvulus indicus barbatus minor*, foliorum apice lacinulatis Blatt. alm.
II. t. 276. fig. 6.

Habitat in India
volubilis
Caules per ^{volubiles} umbellales; foliiformes striati. folia ^{opposita} alterna, glabra
inferior breviora superiora vix angusti ciliata, non oblonga, medio apice
retusa, tridentata, dente intermedio brenore, medio levigata, sibi utique
aunculae dilatae: aunculae tridentatis. Pedunculi astillares
foliis duplo longioris uniflori, supereme crassiores bracteate, fructuiferi
reflexi

fot. Convolvulus specieis

emarginatus Erodium foliis reniformibus undulatis, subrepandi utrinque glabri, petiolis
longis calycibus pilosis.

Erodium emarginatum: foliis cordatis emarginatis, floribus solitariis Burm.

Ind. 77. tab. 30

Habitat in India

Similis ~~res~~ mucronato, at folia minora. Petioles pubescens; calyces pilosi

~~mucicatus~~ ~~emarginatus~~ *Evolulus* foliis reniformibus ex repando petiolis mucicatis ^{emarginatus} Linn. Suppl. p. 106. S. V. p. 299
Evolulus emarginatus: foliis cordatis emarginatis, floribus solitariis Burm.
fl. Ind. 77 t. 40

Habitat in India ^{repens}
Caules feliformes ^{repens} proambentes simplices, simplices petiolati.
inferiora pollucaria superiore minor, supra glabra, subtus venis fabrici
fimbuli, undata, emarginata. Petoli longitudine foliorum subtruncata.
Flores axillares solitarii pauci. Pedunculi longitudine ferre petiolorum petolo
frumenti, Calycis glabi ciliati

Holdanella *Evolvulus* foliis reniformibus planis integris pubescentibus pedunculis
unifloris

Habitat in Bonaria

Caules serpentines similes emarginata at folia nec emarginata nec undulata
subtus pilis raro rigidis, petoli latoe pilosi. Pedunculi petolo brevi-
eris uniflori, pilosi ut i calycem. Capitulo tri-glabro

Turcic Steriphia

an Steriphia

punctata. Evolutus foliis subrotundis emarginatis subtriangularibus
punctatis pedunculis longioribus folionum caule repente

Habitat in Fadia

Officinali nummulantio diverso caule repente foliis hypra glabri subtriangu-
pili nitidi raroibus luteo utrinque glabri, punctis numerosis impressis
oculo ornato virens caulebus glabris pedunculis
pedunculi secundi

Cyparis . *Evolvulus*

Le Monk habeo.

microphyllus *Evolvulus*

Habitet in St. Domingo herb. Desfont.

Caulis gneticulatus, villosus, utri tota plantae, ramosissimus. Rami diffusi, feli formes, rigidi. Solea sessiles, minores, interdum vesti semine rugosae latae, oblongae, integerrima, incana. Pedunculi astillares et terminalis, folio parum longior, uniflori. Corolla plana, radice quunque villosa, stellata radicata, parva. Style duo

Crotonetum

Habitat in Domengo herb-thus.

Ramulis glomeratis, erectis, ramosis, teres, fructiculosa, vellosa, subcancerosa. Dolia
lespiscaria linearia, ut semipollucaria, acuta, pubbris vellosa e pili ad presis, supra
glabra. Pedunculi axillares, solitarii vel gemini, folio triplo breviori, uniflori. Ca-
lyx pilosus; laevius cancellatus.

hispidae & volvulus foliis ovato-lanceolatis angustis
bus peloso cespitoso, pedunculis pubescens florib.
la Mont. en c.
3. p. 516. t. 216. fig. 3.

Convolvuli minima spicaria bengalica hispida Alpes.
folio Blutn. Alm. 116. t. 9. fig. 1.

Anagallis hispida minor, foliis alternis, floribus soli-
tanis Burn. Reg. 11. t. 6. fig. 1. st. t. 9. fig. 1.

Habitat. in India orientali

4-5
Peregrin. Erolorulus foliis lanceolatis, petiolatis, pubetatis, sericeis, pedunculis brevibus unis
floris. Sch. prod. p. 55.

Ponrorolorus erectus herbaceus subhispidus, foliis linearibus; pedunculis brevi
bus Brown. Jam 183. 3. t. 10. fig. 3.

Habitat in Jamaica

Ramis basi lignosi. Rami Vernei alterni. folia linearis lanceolata
acuta supra glabra. pedunculi axillares, florae nutantes

Nummulanus Convolvulus foliis pubetundis, caule repente, floribus subfusilibus - Lin. S. V. p. 299
Convolvulus minor Tepens, nummulanis foliis, flore conato Sloan. Hist. I. p. 157.
t. 99. fig. 2.

Convolvulus herbaeum & *repens*; foliis pubetundis, floribus singulans axillaris
Brown Jan. 153.

Habitat in Jamaica, Barbadois pratis

Caule procul bendito pilosi panum flexuoso. Folia breve petiolata, emarginata
petiolis rotundiora quam in alpine noide nec subsinuata. Pedunculus uniflorus ex
longitudine petiolae pilosus.

—
pilosus
procumbente — folitus

varietatem foliis glabriornis oblongioris floribus albis nuf. de Weit et
Inula St. Croix

emarginatus. Folios veniformibus undulato subrepandi ut angue glabri, petiolis
combust calyculis velosi

Evolvulus folius cordati emarginati, flombus solitariis Burn. ad.

77. Tab. 30

Habitat in India orientali O

Pauci foliis repente ope lenti velopufiuli. Folia petiolata
ta remota unguiculata fimbria nervosa venosa. Petiolae
pilopufiuli pollicares. Stems subspinosi ac illares folia
ne.

soleanella E.

alpinoides *Convolvulus* foliis oblongis pubescens, pedunculis unifloris, caule diffuso
Vitru. - Cladistheod. Mal. II. p. 131. t. 64.

Convolvuli minima speciebi *nagarica* hispida, alpine folio Pluti. alm. 116. t. 9. fig. 1.
Anagallis hispida minor, foliis alternis, floribus solitariis Burm. zeyl. II. t. 6.

Fig. 1. Et Tab. 9. fig. 1.

Convolvulus alpinoides: foliis obcordatis pilosis obtusis pilosis petiolatis
caule diffuso pedunculis 1o flori sive. S. V. pag. 299.

Habitat in India Orientali

Caules plures simplices spathamoi, pilosus capillantes. Folia petiolata
semiangustulana, mucronata. Pedunculi axillares solitarii, foliis
duplo longiori filiformes, medice bracteis geminis calycis pilosi
subfasciati uti sequentia planta. Soliola lanceolata. Corolla corona
nervosa

Culta foliis glabris

Convolvulus minimus vellosus hecathe mi folio Plini?

pena
floribunda
inflesta

Clinigolus *Convolutus* foliis lanceolatis villosis fuscobrunneis; caule erecto pedunculis trifloro.

Lin. Am.-Ac. 4. p. 306. n. 122. * P. V pag. 299.

Convolutus herbae eretrix, foliis linearibus, pedunculis longis venustissimis
bibracteatis alatibus Brown. Jam. 192. t. 10. fig. 2.

Habitat in Jamaica

Paulis hospitiis filiformi. Sola utrueque acuta, pollicaria, mucronata.
Pedunculi foliis dimidiis longiorib[us] triflori. Soliola duo sitacea ad virgineam
et uno in pedicello altero longiore pedicelli fructiferi nutantib[us] calycis
villosa subpresso. Hyl. 2 braser. Stigmata duo longissima Richard obte-
sa linearis Ruh.

ganges i. u. Evolvulus foliis cordatis obtusis mucronatis villosis petiolatis, caule diffuso, ne
dunculis trifloris her. Am. 4. p. 306. n. 121 * S. V. p. 299

Habitat in India

Caules procumbentes ramosi bipedales. Folia cordata rotundata opp. latiora, obtusa
cum mucrone, petiolata: tenella folia et flores hispidissimi. Pedunculi capilla-
res breves her. Am. l. c.

nun vidi

multipliciflorus E. foliis oblongis, pedunculis elongatis puberulifloris

Habitat in Thria orientali.

Caules filiformes procumbentes velli minutis ~~ad profissis~~. Folia petro
late angustula via utrinque obtusa ~~opice~~ ^{maior} supra glabra pubescentia
centi punctata puberulosa. Pedunculi capillares folio duplo
longioris 12. vel triflori. Gluca dura minuta lanceolata per pedicellos
lis. Calyx foliolosa lanceolata acuta vellosa

viretai forte alpinordis

Hederaeum E. foliis cordatis repandis, neoumulis subtriang. Burm. ad. tab.

30. fig. 2

Habitat in Java.

Complicatus cum Conv. vel Evolvulo mucicato
multi hood labii cognitio

municatus

E. Polia condensis obtusifinis glabris petiolis mucinatis, calyculis

veluti

Habitat

Pauci filii formae elongatae procumbentes - petiole ranunculaceo
presso folia follicularia nervosa venosa utraque gla-
bra subtus ope lente minute punctata. Petoli non longi
tudine foliorum ad pressi spinulis minutis. Pedunculi
axillares brevissimi sub triflori. Calyx foliolo ovato

Confundatur cum convolvulo mucinato