

Frankenia

- caulibus & ciumbentibus glabris
1. cori F. foliis linearibus confertis ~~leaf ciliatis~~, floribus lateralibus terminalibusque
 2. hispida F. caulis hispida, floribus lateraliis terminalibus
 3. pulvrenula F. foliis obcordatis vel subtriangularibus pulvrenulatis

Primo restat
caulas unius speciei diffisi subffuturam.

Corymbosa Franckiana

Habitat

hab Desfont

habeo

2 hirsuta Franchia Caulebus hirsutis floribus fasciculatis vernaleibus Lin. S. V. p. 344.

Polygonum creticum Hymenophyllum Baum. Lin. prodr. 131. Pl. 1281

Spiraea mertensiana superba multiflora candida, cauli bus hirsuti grayi ver
niulatis Mich. gen. 23. t. 22. fig. 2.

Rothnia capensis Berg fl. Cap. 1774 t. 1. fig. 2.

Habitat in Apulia, Creta, Cap. b. Gray

Caule prostrati sili formae pubescentes superne dichotomi. Sola quaterna
villoso subia ^{bifurcata} ^{cuneata revoluta}. Ramuli folia et flore in apice raro
repentio, mollicia non fasciculata. Ramii sub dichotomi
margine revoluta

, Lovi Frankenia foliis linearibus sessiliis confertis bafi ciliatis, floribus laterali
bus terminalibusque

Polygonum alterum pufillo vermiculato Scopellifolio Lobel. &c.

Polygonum maritimum minus folioli serpylli Baum. Pl. 28.

Raf.: vermiculari manico non desimuli planta Baum. Pl. hot. 3. p. 803

Polygonum fruticosum pepinum encoides cinereum Thymifolios, hispanidum
Bazz. subf. 1. p. 7. t. 11. Barreli. t. 714.

Frankenia maritima figura fasciatis glauca encoides impervicens, flore
purpureo Mich. gen. 23. t. 22. fig. 1.

Frankenia levigata foliis linearibus confertis cili bafi ciliatis ad S V. p. 344

~~Frankenia revoluta~~ Baph. Difer. p. 85

Habitat in Europa australi et Afriæ borealis litoribus maritimis,

Paulo prostrati ramo fruticoso; op ramo sive nivali levante

Rami oppositi breves sive tantum solleuci. Folia vesticella
de 40 cum radimento ramorum foliis et omnibus articulis lato
lata revoluta, ultima bafi pubicata. Flores sparsos solitarii

aliam a Schenckie canule exerto ea illa canulae dividitur
nothomia

nodiflora Brachenæ.

Habitat

De la Manz

Nothria Frank. folia vaginis foliorum ciliatis caule decumbente
glabro Thunb. prod. pag 58. floribus terminalibus. Latem
Nothria cas repens Berg. Cap. pag. 171. ubusque

Habitat in Cap. b-frei

Similis Frank. locis. flore terminali et laterali foliata
ni vel

Thunb. Rumen foliis sagittatis obtusis, caule curvato-erecto Thunb
prod: pag. 87. Rumen tuberosus
Habitat in P. b. spec.
an tuberosus den

non vD.

3 pulvrenula *Tranckenia* foliis obovatis retusis subtilis pulveratis Lin. s. v.

Anthyllis marina narbonensis altera *Chamocystes* facie Lab. G.

Anthyllis marina valentina Cluf. h. 2. p. 186.

Anthyllis marina Chamocystes similes Benth. Pl. 207.

Sane a marina quadri folia puparia, Chamocyste foliis et facie
Mich. gen. 23.

Habitat in Puglia id, Europa Australis, Barbaria Cittoribus. O

Planta palmaris bafi ramosissimis diffusa. Rami pedicellati, adi-
culeti, sericei, pulvreni, liliiformes. Oblia quatuor
ad pedunculum articulatum parva. Flores in dorsi ramorum vel laterales
solitarii spissi. Calyx tubulospissimato angustus. apice folia et flori
aggregati

revoluta Fr. foliis lanceis oblongis revolutis, caule floribus axillan-
bus solitano

Frankenia revoluta caule glauco-piceo de hirsuto, pri-
thamali, foliis ovatis margine revoluti, floribus
axillaribus suspicibus albedo rufescens, stigma
infido Toscanae dep. pag 75

Habitat Alexandria

Tota planta, sicutem in scissis speciminebus, pulvere griseo
glauco-piceo obducta, habet folium crassum
quam in reliquis et raro latiora minus aiunt
rum: sparsi vel oppositi.

affinis loci

Spannacea?

Habitat ad Senegal herb ⁴fus.

Pauci-diffusi, ramosi, villosi. Tiliae opophtas, fessiles, ferrue ^{larix} ~~grisea~~, oblonga,
ferrata, villosa: & ad imita^{re} rameulorum in attilio. Clorae axillares, super geni
ni, breviter pedunculati.
Calyx 5que partitus, 3 bracteatus. Petala 5. Styles 1. Trifidus ^{vel mucrona} ⁴fus.