

26 *Trastinus.* *Polygonum.* *Salic.*
Cal. 0, 4-partitus. Cor. 0-4-petala. Cap. 2-locularis, ~~superior~~
~~foliacea composta.~~ Sem. paucia, pendula. Gostn.

juglandifolia *Trastinus* foliolis elliptico-ovatis obsoletis serratis, subtus glaucis,
~~stellis~~ subtus pubercentibus, rami glabri, floribus apetalis.
Trastinus carolinianus; petiolis

juglandifolia *Trastinus* foliolis elliptico-ovatis obsoletis serratis, subtus glaucis,

rotundifolia & foliolis puberulis acutis foliis duplicata levata: subsp. plebeia
floribus corollatis Hort. Kew. 3. p. 445.
Frattinii aleppensis Plechin. alm. 158. f. 182. fig. 4.
Habitat in Italia

non vidi.

ornis 1. *Trastinus* foliolis lanceolatis attenuatis petiolatis serratis, floribus corollatis complexis

Trastinus florifera botryoides mons. prol. 265. Hort. Angel. 33. t.
g. ~~De Hamarb. t. n. 4. l. 101~~

Trastinus paniculata, foliolis lanceolatis glabris, floribus
paniculatis terminatibus Mill. Diet.

Trastinus ornis; foliis serratis, floribus corollatis Lin. Spec. pl.

1510

Lat. folia β. foliolis ovalo-oblongo serratis petiolatis, floribus corollatis
Hart. Kew. 3. p. 445

Habitat in Europa australi & in montibus circa Petrin ^{hab}
& coriolo in museo Quibidi ^t
Ram. peniores purpureo-antej. ad ultiores cinerei. Foliola b. ^s

In pollicario triuga, utriusque acuta, basin versus integerrima inqualiter
serrata basin versus integerrima, pedunculi axillares, foliis
bx. subtus ad basin villosa. Pedunculi axillares, & solitarii,
foliis brevioribus: pedicelli ultimi capillares, solitarii vel plus
res ex eodem punto. Polyx tetraphyllus. Petala quaduor, linearis
recte

ornus. Fraxinus folioli lanceolatis attenuatis petiolatis serratis, floribus
corollatis

Fraxinus florifera botryoides Mons. pl. 265. Hort. angl. 33. t. 9

~~#~~ Fraxinus paniculata Des Ham. arb. 1. p. n^o 4. t. 101.

~~Fraxinus orni; folioli serratis petiolatis, floribus corollatis~~
Lin. Spec. pl. 1510.

~~Lati folio folioli ovato-oblongi serratis petiolatis, flor~~

~~deformis pendula, floribus luteis~~

~~oblongis foliis lanceolatis 20 cm. longis 8 cm. lato~~

~~all~~

rotundifolia 2. Braxinus folioli subrotundis acutiusculis dupliiato-serratis
subsessilibus floribus ~~nudis~~ ^{racemos} ^{cordatis} Hort. hew. 3. p. 445-

D.P. 49.

Braxinus rotundifolia foliis Baeh. pin. 416. f. B. hist. 1. p. 2. p. 177.

Braxinus rotundifolia, foliis obovatis petiolatis ^{minutis} ^{8ime} dentata-
tis basi inaequilibus, terminali obtusiore ^{Lamark} ^{bot.} La Mart. Diet. 2. p.
546.

Habitat in Palabria et Oriente. 5

Braxinus ale Rami juniores et adultiores et in procedente. foliolo quinquepuncta-
pensis Herm. Lugd. 261. Pluhs. extima vix pollicaria, anterior rotundiora, acute serrata et
f. 182. f. 4. inopinaliter serrata, glabra basi cincta, glabra. Flores purpurei
rei. *

Figura Pluhs. magis huic convenit quam parvifolia Wild.

~~ornus T. foliolis serratis, floribus corollatis~~ Lin. Spec. pl. pax. 1510 &
~~Trastrinor humilior s. Altera theophrasti, minore et venuo folio~~
Bauh. pax. 476.

~~Trastrinor venuo et minore folio Bauh. herb. 1. p. 177.~~

~~Habitat in Europa australi t~~

~~Rami ut in Traz. ex celso unci ap. audi, juncoe purpurascens
folia petiolata alterna pinata cum impar triplex
foliola opp. folia petiolata per ultimum pedunculo oblongo
serrulato lanceolata bisp. versus integerrima, bipinnata ana
pedunculi costellatae, pedicelli ultimi capillares foliari vel
plures et eodem punctis petala cuneana~~

lanceolati

~~Habitat in montibus circa Petria herb. Guisard~~

americanae 3. Drastinus foliolis petiolatis ellipticis - ovatis integerrimis (Subtriangularibus)
glaucis.

Drastinus americanus; foliolis integerrimis, longe acuminatis petio-
lis levibus Lin. Spec. pl. 1510.?

Drastinus acuminata; foliolis integerrimis, longe acuminatis petio-
lis subtriangularibus glaucis Lamotte. Diet. bot. 2. p. 547.

Drastinus americana; foliolis petiolatis oblongis acuminatis
integerrimis Subtriangularibus glaucis Wied. arb. ber. 116

angustifoliae. Drastinus carolinianus, foliis angustioribus utrinque acumi-
natis pendulis Cat. Car. 1. p. 80. t. 80.

Habitat in Carolina, Virginia *

Rami glabri, cortice frisco-fusco. Solidula bi ad quinquejuga-

Habum inata inter I nerval quodripollicaria, pollicis duo lata, firmas, ^{inter se} ~~sub~~ venosa
dum attenuata, Subtr. pallidiora, Venae inter se ^{venosa} venis majoribus subtilioris
Petiolas teres, supra Buleo Venerii *

extipsum obtuse
serrata

Bra In Ross habui qui eam in Carolina cevit conseruit Cum figura
in Catalogo folie bipinnata, vix pollicem lata, attenuata, [#] Subtr.
verte

pallido, venio majoribus subvillosis, somato pollicans elliptico lato rotato utringue
~~alte~~. num hoc Lin. americana, vel acuminata la ^{manthii} ~~manthii~~. difficile di-
stingue. ~~Photynma~~ null Mill. dict non citari, cum dubium mihi sit et non num
huc per ^{Dr.} novo anglia vel d. caroliniana huc pertinent, vel ad bambusifolia
vel ad carolinianam Lanthanii. Nam in hac specie quam in reliquo
de tunc specie Wild Synonymia est Wildenovis ^{tunc} ~~est~~, cum mihi omnes
sit amicis & imis communicari.

Quamvis etiam de loco natali occidit esse loco natali

Quamvis

platycarpa 4 Tratinus foliolis subsesiliibus lanceolato extrorbum serratis samaris
que elliptica lanceolata ellipticis.

Tratinus platycarpa; foliis ad summum trigonis, subsesilibus,
ovalibus, serratis: capsulis lato lanceolatis. Mikanst. Flor. bor. Am.
2. p. 256.

Habitat in Carolina. Bosc.

Solia biplicaria, pollicem longa, attenuata, subtus pallida, venis
majoribus subvillosis. Samara pollicares, uncinque acuta.
an Gatesb. Tratinus carolinianus &c. 1. p. 80. t. 80. huc pertinet?

qua drangulata . 5 Taxinus foliolis subsessilibus lanceolato-ellipticis serratis
subtus pubescentibus, Samaris utrinque obtusis. +

Taxinus quadrangulata; ramulis quadrangulatis: foliolis ad 8 mm =
mum quadrijugis, subsessilibus, ovali lanceolatis, anguste serratis,
subtus pubentibus: capsulis utrinque obtusis. Michaux fl. bor.
Am. 2. p. 255.

Habitat in Kentucky et Tennessee

epiptera 6 Brastinus foliolis ell. lanceolato-ellipticis subseriatis, ramis cuneatis
apice obtusis emarginatis basi rotundatae inferne verticibus
Brastinus epipyrenus; foliolis ad summum quadrijugis, oblongo-ovalibus
acuminatis, subintegris, capillis obverse lanceolatis, apice obtusis
emarginatis, ima parte verticibus aplatis. Michaux fl. bor. Amer.
2. p. 256.

Habitat in Carolina et Virginia. Bot. 5

juglansifolia 7 *Braxinus* foliolis elliptico-ovatis dentatis, subtus glauco-pubescentibus,
tibus, ramis glutinis, floribus apetalis.

Tiatrixus juglandifolia; foliolis septenis dentatis petiolatis subtuso
pubescenti-glaucis, ramulis petiolisque glabris ^{franc.} La March Diet.
bot. 2 p. 548

Dosimus cassinianus petiolis tapetibus, supra planis ciliis;
foliis quinque et septen. sub petiolatis lanceolatis acumi-
natis, obsolete

Bratianus puglandifolia; foliolis petiolatis ovatis opacis dentatis, pubescentibus glandulosis, axillis venanum pubescens tubo; rameulis glabris, floribus calyculatis Wild. ab. ber. 117.

Subintegerrima B. Trinitatis caroliniana; petiolis Veretibus; supra planis foliis
foliolis quinque et septenatis subpetiolatis lanceolatis acuminatis,
obsoletae serratis, subtus pubescentibus. Den. Ror. Hab. d. 2. 1 p.

~~400~~
Habitat in America Septentrionali 3

Solidago ~~hirsutissima~~ triplinervia et ultra, attenuata, subtilis tenuis tenuissima, villis ad 3 per sa, prosser in in axillis resonans. Petiolis teretibus. Racemi penduli. Polyg. quadridentatus *

Bupre sulco tenui
estatai

nigra f petrolis Verdibus folioli noveni fessilebus caniculato - oblongo
acuminatis serratis, subtus villosi. De Pro

non vidi

rambeufolia ♂. Trastinus foliis ali sessilibus ellipticis lanceolatis serratis
aristis pubescentibus

Trastinus Ramburii folia; foliolis septentrionalibus serratis sessilibus; rami
punctatis ^{la monte} La March. Dicit. bot. 2 p. 649

Trastinus Ramburii folia; foliolis sessilibus ovato-lanceolatis serratis
nigrosa nitidis, aristis venarum subtus villosa. Welden. arb. brev.

121.

Habitat in America septentrionali ?

Rami priores virides, nigro punctati. Doliola trijugata, in vel qua-
Dipollica, basin versus integriforma, uncinata, orata
porum nigra. Flores non vidi *

~~At ad hanc C. Trastinus rambeufolia non convenit. Convenit C. trastinus rambeufolia.~~

adscendens. 2. Anemone caule adscendentie, foliis obvolutis subtruncatis
ciliis, capitalis globosis, flonibus tetrandis.

Anemone magellanicum ³ foliis latioribus serratis. La Mart
Illustr. bot. I. p. 76. no 346

Habitat ad fratum magellanicum ^{as; folios} Commerson Thuria 7
Pauli Teretis, glabri, striati, spathulati. ^{lateraliter minora} folia petiolata, 5-7 pecta.
foliola sessilia vel opposita vel alterna, unguiculata, veno
sa, latera altero basi leviora, obtuse serrata, pubes costu
pulosa coeterum glabra. Petiolus inferne dilatatus, membrana
cervi. Capitulum magnitudine ferre Benji. germania apice
petio a or flavis rigido glochidis

caroliniana 9 Trastinus foliolis petiolatis lanceolatis serratis glabris
ramuli que glabri, floribus apetalis.

Trastinus carolinianus, foliis angustioribus utrinque acuminatis
pendulis Catol. Car. I.p. 80 t. 80.

Trastinus carolinianus; foliolis septentri dentatis petiolatis utrin
que viridibus, petiolis subglabris, floribus calycifolis la marath
Dic. bot. 2 p. 540

Trastinus carolinianus; foliolis petiolatis lanceolatis dentatis nit
dis glabris, floribus calycifolis la marath ramulis glabris, flor
ibus calycifolis Wied. ab. ver.

Habitat in Carolina

Foliale triplex, supra nitida utrinque acuta, basis versus
integerrima, supra nitida. Petiolas teres, supra sulco Tenui est

Variet foliis latoibus rotatis. Racemi laxi, per qui pollicares, super gemini et eadem

punctato, compositi: pedunculi parvales oppositi, Bractea

parva utrinque ad basin bisinata: pedicelli plures umbellati

Calyx compunctatus quadridentatus.

Trastinus ex callosior Walt. f. var. 254. hinc forte pedunculus quadratus
apparet a Specimine a Dr. Bosc. oreum communitatum

caroliniana T pedicellis teretibus supra planis foliis foliolis paucis septentri-
subpetiolatis lanceolatis acuminatis levata, subtus pubescentibus
In Pro Hart - B.

entegifolia mox erit redactus ut et ex novae anglie

non redi

pubescens 10 *Trastinus* foliolis elliptico-ovatis serratis subtus petiolatis
ramisque tomentosis, floribus apetalis
Trastinus nigrum

Trastinus pubescens; foliolis subnovenis dentatis petiolatis, ramisque pubescentibus tomentosis, floribus calyculatis
La March. Diet. bot. 2 p. 540

Trastinus nigrum; petiolis teretibus; foliolis novenis, sessilibus
lanceolato-oblongis, ~~et minuti~~ serratis acuminatis, serratis,
subtruncatis villosis Du Roi. Hist. ad. 2. 1 p. 390.

Trastinus pubescens; foliolis petiolatis elliptico-ovatis serratis
Subtruncatis petiolis ramisque tomentosis, floribus calyculatis Wild.
ab. ber. 119.

longifolia 13. foliis ovato-lanceolatis attenuatis subserratis.
catifolia 14. foliis ovatis latioribus.

Habitat in America Septentrionali 5

Rami et apice, uti petioli incano tomentosae Folia tri-

quadrifida, supra glabra. Petioli teretes. Racemi intra foliis
rente

~~pubescens~~ ~~fructus foliolis ovato-lanceolatis subssessili~~
~~subcompositi: pedicelli sparsi, plenumque plures et eodem puncto. Calyx~~
monophyllus, campanulatus, glaber, quadrifidus quadridentatus. *

angustifolia & Dratinum foliolis sessilibus lanceolatis remota denticulatis,
Samans lanceolatis apice integris acutis mucronatis.

Dratinum venatore et minore folio Bauh. h. 1. p. 2. p. 177.

Habitat in Hispania Schousboe 5

Rami coticæ fuscæ-purpurascens. Folio tri-quadrifida,
sessiliæ anæ, angusta facie foliorum ligustrini, glabra,
utrinque acuta. Petioles teretes, supra canaliculati. Pedicelli
culi infrafoliacei, solitarii, biplicares: pedicelli quin-
que vel septem, alterni, distantes. Samara sessiliæ
cavæ, basi obtusa.

Ad Dratinum ornatum redulerunt plurimi botanici, sed am-
vis nihil cum ea communæ habet. Rajas ~~ca~~ in host. plant.

2-p-1703 2 Varietatem drat. ex celsioris esse credit, sed enagit
ha duo inter se differentia, quam plurima species Ameri-
canae hujus generis. Flores non vidi.

Tamarisci foliis ¹² *fruticosus* foliolis petiolatis oblongis lanceolatisque argute
serratis, serratura mucronata

Habitat — in mecum conuenientia a ~~Leib~~ Dr Hornemann
Lect. hort. bot. Harn. qui eam a Dr. La Peyrouse habuit
Rami glaberrimi, cotice fusco. Solida quadrangularis quinque juga
vix pollicaria, oblonga, oblongo-lanceolata vel lanceolata,
utrinque acuta, gla interdum dentate terminali parum elongata
subcuminata, utrinque glaberrima. Petioles teretes. Flores
non vidi *

accedit ad *Tut. rotundifolium*, diversa figura foliorum proscilim
verso serraturis, mucrone flavescente terminali. *Tut. Deux*
fruticosus passifolia la ^{montana} ~~Martin~~ hue forte spectat.

Trostius parvifolia ovatis acutis basi cuneatis dentatis, flori-
bus nudi. Willm. ab. ber. 124. t. 6. f. 2.

Habitat Wild now

Rami purpurascentes, angusti superne Trigoni, glabri. Siliola
quadrijuga, extrema bipollucaria, remota berrata; utrinque
basi integerrima, utrinque acuta, glabra. Pedunculi lateralis,
simplices: pedicelli sparsi; sope Duo vel Tres ex codem puas;

an. La Martini Fr. parvifoliae eadem ac Wild. ? Descriptio La-
Martini in Diet. bot. 2 p. 546, prosectorum si Plein figura
Tab. 102-f 4 ad ^{qui} parviflora L. Martini pertinet, cum Specimi-
ne a Wild. mihi missum minime convenit.

Carpus Paxillus geflektus vario - effigies, versicolor velutinus, from two
varieties, affad. locy. 3. p. 445

or nus

~~Traxines foliolis lanceolatis attenuatis petiolatis serratis, floribus corollatis~~

Ornus Dalech.

~~Traxines tenuiori et minori folio Bauch. Hist. 1. p. 3. p. 177.~~

excelsior 114 Bractinus foliolis pubescentibus lanceolato-oblongis attenuatis per-
natis, floribus ^{nudis} ~~incompletis~~, ramulis obtusis apice obtuso obliquo emarginatis
Bractinus Matth. 135.

Bractinus excelsior; foliolis serratis; floribus apetalis Lin. Spec.
pl. 1509. 8l. Das Coll. pal. Pollich pal. n. 947. 8l. Dan. t. 969.
Pendula B. rami penduli.
parvifolia f. foliolis lanceolatis

Bractinus tenuiore et nictatore folio Baich. Kot. 1 p. 2 p. 177.

Habitat in Europa in Hispania legit Schaubae t.

Rami cinerei, superae alternativi compresi, glabri. Foliola
quadrijuga, ~~per~~ tri pollicaria ad ultimam, aliud serrata. Penduli
plures ex eadem gemma. Pedicelli sparsi, interdum plures ex
eodem punto. Gemmae gemmarum ~~est~~ villosa.

B. glandul foliolis angustis, terminali seque pollicari serrati
ne remotionibus.

nave anglo F foliolos ovato-oblongis acuminatis anterius venatis Moench
Weiss. pl. 43

in varietate caroliniana

non ord.

het crophylla 15. Trasines foliis Simplicibus compositis que dentata berratio

Trasines et calidior foliis plenum que varietate E. foliis plenum que
Simplicibus LaMart.Dict. bot. 2. p. 544. varietas E

Trasines Simplicifolia foliis Simplicibus ovatis Dentatis basi
integerrimis Wild. cob. ber. 121.

Habitat 5. Afghanistan

Lignum et gemma et fr. excelsiore. Folio plenum que Simplicibus

ovato In vel quadripollinaria, ovata, subcordata vel basi
subacuminata, acuta, profunda serrata, utrinque glabra;
intervallum ternata, intervallum quindio pinnata LaMart.Dict.

Pedunculi plus Petiolis supra canaliculati, subtus consecuti;
juniores subtus cavati. Pedunculi petiolo breiores, plurimi;
Pediocelli sparsi. Samara oblongo-angustolata, pollicares;

panum latiores quam in frs excelsior; basi acuta, apice obtusa,
emarginata *

Specimina mea habes et hosto Parisino, a Wildenovoro
et LaMartini, omnia similia.

et celfor f. foliolis ferratis, floribus apetalis s. v. p. fl. Dan.

Fraxinus Lodd. n. sempf. 771.

Fraxinus est Celfor Baeh. p. n. 416.

Habitat in Europa Iepibus?

Rami cunei superne comprespinos glabi. Dolci petiolata cum
impar quadrifida ^{alternata} foliis ^{folio} lanceolato elliptico acuminata
ta acute ferrata opp. opt. suspicai interora minora. Pedunculi
et plures. Pedicelli feliformes prosp. interdum plures
et eodem punctata. Squamo gemmarum velloso

Fraxinus

1. excelsior. f. foliolis ferratis floribus apetalis petiolatis
2. ornius F. foliolis lanceolato-oblongis ferratis, floribus corollatis
3. rotundifolius F. foliolis subrotundis auctiue scutis duplicitato-ferratis subfusiformibus floribus corollatis
4. americanaus F. foliis integriformis, petiolis teretibus