

Fuchsia

1. triphylla F. pedunculis unifloris, foliis lanceolatis pedunculatis
 2. coriacea F. foliis oppositis ternatisque ovatis denticulatis, pedalis ~~ob-~~
^{axillari, flori}
~~vatis obtusi~~
 3. multiflora F. pedunculis multifloris
 4. exornata F. pedunculis axillaribus unifloris, foliis lanceolatis
alternis
 5. ~~cinnamomeorum~~ F. pedunculis axillaribus unifloris, foliis oppositis in
tereminis.
- 2-3. oppositifolia x. foliis oppositis ovatis - lanceolatis glabris denticulatis pedun-
culis unifloris caule frutescente
- ~~23. involucreata x. floribus involucratis~~

XXX geluzia Vandelli huius pertinet Michan

2 coccinea *Euchya* foliis oppositis ovatis denticulatis, petalis obovatis obtusis H. Kunz. p. 2.
Thunb. Gen. et. 3. p. 64. t. 47.

Habitat in Chili 5

Rami per pubescentes pilosi prosterum sub foliis. Solia ad sesquipollia
na pallide viridia attenuata, saepe ternata, petis brevis subtus in costa
ad basin albo barbata, remote denticata. Pedunculi gemini et axillares
fileiformes folio longiores. Flor. nutans coccinea.

— — — — — Ternatisque ovato — lanceolatis denticulatis subtus
nervisque pubescentibus petalis lanceolatis

Entoni, Dorvallei, Nahrysea eadem herb. 9.

altissima Albuca petalis interioribus apice glandulosis reflexis, foliis subulatis
canaliculato convexis Dryander in Act. Holm. 1784. p. 292. Hort. kew. t. p. 435.
Habitat in C. prope 2

Canciolata *Tuehpa* foliis ternatis oppositisque Canciolatis denticulatis, pedunculis
at illaibus unisfloris, caule ^{stipulato} ~~superne~~ subtomentoso

Habitat in St Domingo 5

Rami inferne vesiter, superne subtetragonè. Cortex per tomentosus. folia
breviter petiolata pollicaria retrorsè denticulata subtus palli-
diora. pedunculi longitudine foliorum leviter tomentosus. Cal. flores
pedunculo longiores corollae. Petala ovata

excelsa ~~C~~ foliis ellipticis integerrimis racemis axillaribus bracteis ^{caespit} Cyathiferis
nubibus ^{peristichis} superioribus magnis deciduis foliaceis

3 multiflora Fuchsia pedunculata multiflora L. l. V. pag. 361.
Habitat in America meridionali

quomodo haec species a F. triphylla differt dicitur si Plum. fig.
Lin. triphylla est.

non vid.

oppositifolia ^{vernatis} *in hysa foliis oppositis ovato lanceolatis glabris denticulatis pedunculatis*
solitariis unifloris caule fruticoso

Habitat ad fretum magella vicum Commerçon Thonin

Rami oppositi glabri. Folia petiolata sesquipolliciana arena
glabra remote denticulata, attenuata, subtus pallidiora puber
rosa stipula utraque duo pa minuta. Pedunculi axillares
oppositi folio triplo breviori. Corolla coriacea pedunculo longior
polliciana

c coriacea forte non diversa

11 triphylla Tuckera pedunculis unifloris Lin Spei. 1594 L.V. p. 361.

Tuckera triphylla, flore coeruleo Plum. Gen. 14. Fe. 133. fig. 1.

Habitat in America meridionali ~~in Tetragono Centes Tomentoso uti pedicellis~~
Caulis herbaceus simplicissimus. ~~foliis~~ ^{foliis} ternis lanceolatis septis. Racemus

terminalis erectus ~~caule villosulo foliis glabris supra glabris floribus triplo majoribus~~

racemis terminalibus pedicellis unifloris, foliis ovatis
lanceolatis ternis

ternatis ovatis racemis terminalibus
foliis lanceolatis dentatis, pedunculis unifloris caule super
ne submentoso caule herbaceo
Rami teretes pubescentes. Folia ternis vel quaternis, in ferne breviter petiolato
to, bipollicares, remote, pentato remoteque nervoso venosa, subtus ovata
armato villosulo. Pedunculi superne axillares, solitarii, vix pollicares
pubescentes. Corolla pollicares ope lentissime villosa. Vana foliis
oblongi et lanceolatis. Dedit Richard

character emendatus