

Gaertnera

racemosa G.

Yodura.

Habitat in India orientali herb. Guss.

Radicis teretis, fusae, puritatis. Stipulae opposita, petiolata, 4. 5 pellucida, oblongo-
ovata, attenuata, pubescentia, acuminata, venosa, supra nitida, subtus pal-
lidiora. Racemi solitarii, axillares, folio multo breviores, 9-11 flori. Pedun-
culi compressi: pedicelli distantes, superius per se ipsum incrassati, uni-
flori. Calyx consistens. Ala fracturae cancellata, inaequaliter obtu-
scissimè, pubescentior.

Genus affinis *Goetiaena*
Cappula

Calyx monophyllus

Corolla petalae calycis parum longiora

Stamena numerosa calice petalorum longitudine
anthera minutae

Pistilli rudimenta tria

quam ad fr. herbar. *Urtica lanata*
Dee - *Urtica lanata* (Rosa. Hook. 10. May 163) det. 02
Pistilli rudimenta tria, anthera minutae, non: multa
Pistilli rudimenta tria

Capillaris *Tragia foliis ovatis serratis acuminatis*, ^{petiolo brevioribus} pedunculis simplicibus ramosisque
caule hirsuto erecto

Acalypha supera; foliis ovatis, petiolo brevioribus, amentis axillaribus
masculis, flore foemineo pedicellato, terminatis Boiss. Desf. pag. 1

Pauli herbaceus, erectus, simplex, pedalis, hirsutus.

Folii petiolata, alterna, sesquipollicaria, pelose, juniora ^{retinque} petiole, senescentia
minui, obtuse serrata

Petioli foliis duplo ses longioribus, hirti.
^{stipulo bitinque, papirato, calicula}
Pedunculi axillares, gemini, simplicissimi, vel ramosi ^{senescentia} vel rami

^{capillaris} **Capillaris** **Foli**
si, si li forme longioribus ne petioli
veru, duces pedunculi in pua filiformi tereti pollicari conferti
Flores masculi foemineis intermixtis, seplebus decidui minutissimi. Foemineis
demum pedicellati

Stylus. Stigmata trifida laciniis capillaribus

Capsula magnitudine Inapae

ob absentiam involucri quo certe caret, et inflorescentiam similem mercuriali
potius *Tragia* erit quam *acalypha* quamvis numero staminum ob parvita-
tem florum vix videri hiet.

^{oblongis}
Tragia mercurialis foliis multa angustioribus minoribus ^{longioribus} petiolo longioribus
caule que non hirsuto stipulo nullo vel caduco

Racemosa Gaertnera

Troopteroides

Habitat in India Orientali Vöning 4

Arborcus Rami verdet Cortice fusco, punctis elevatis tamen non scabes divariatis.
Folia opposita petiolo ^{de} patenti elliptica, vel ovato lanceolata acuminata
glabra, integerrima subcoriacea, ^{venosa} tri- vel quadripollicaria. Racemi
terminalis solitarii interdum bini, erecti. Pedunculis pedicelli quatuor modo
f, ^{inferius} pedicelli inferiores horizontales basi utrinque foliolo lanceolato subulato
^{superius} glandula ^{spatula} nigra glabra oblonga ad basin calycis per petiolum ^{separatim} deorsum. Calyx
omnifidus 5 que patitur laciniis oblongis Corolla duplo breviora. Corolla 5 petala petalis extus
relaxis intus glabris una unguiculata unguiculis brevis, ^{latentes} laciniis fimbria
ta. Stamina filamenta 10. unico appendens reliquis major reliqui filiformes
Pistilli 3.

Fructus nux us monosperma alatus alis lanceolatis obtusis duo minores
aer benghalensis laciniis foliis fructu Yergamio, totidem membranulis
ex fructibus; alata Pluch alm. 7 tab. 3. fig. 1.
alio fructus non falcato ut in Bannostenis

est Bannostenis benghalensis

verte

Barristena benghalensis foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis
lateralibus, seminibus patentibus. Lin fl. Zeyl. 176. Spei. pl.

pag. 611

Sida-pou Rheed. Mal. 6. p. 109. Tab. 59

Molina racemosa Cavan. Desj. g. v. 263.

Habitat in India orientali 5

~~racemosa~~
racemosa

Gaednera Schreb. gen. pl. pag. 290.

Gaednera Schreb. gen. pl. pag.

+ Barringtonia benghalensis foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis
lateralibus, seminibus praesentibus Lin. S. V. pag. 427. fide herb. Her-
manni. excluso Synon: Plum.

Molina racemosa Cavan. des. kona tab. 263.

+ Sida-Pou ~~Herb.~~ Alind. Mal. 6. pag. 109. tab. 59