

Galego

maimotachya Galega folio⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹
longissimis, leguminibus tomentosis lineanibus, caule fruticoso.
angustifolia ² ³ ⁴ ⁵ ¹¹ ¹²
Habitat in Guinea Isert

Caulis fruticosus: ramis teretibus, canescentibus. Folia petiolata, 7 8 9 10 11 12
opposita, sesqui pollicaria, brevis sive petiolata, supra subtilis sive striata.
Pedunculus pedalis, striatus, canescens, superne floriferus: pedicelli
breves, iniani, geminati vel plures. Legumina tripollicaria, linearia,
acuminata, utroque marginata

Toxicaria Galega fructu terminalibus pedunculatis, leguminibus. Verticibus pedicel-
latis pedentibus, caule foliisliquo micano tomentoso Sw. prod. pag
1098.

Galega fontifera, foliis feniceis Plum. ii: RB. T. 235.

Indi cum radice pisces inebriant Cujenna L. v. Rodr.

Folia pennata cum impari, pedalia, 16 paja. Foliola petiolata, opposita
bif. tripollicaria, canaliculata, utraque obtusa, apice mucrone
brevis terminata, utraque veluta, profertim subtus; canescentia, areola
vix apparet ~~retro~~.

Petiolus supra canaliculatus, subtus foliato-angulatus, tomentosus: parthales
ut seminiquiculares: Stipula subulata, unguiculares.

Racemi terminalis, palmatis vel paucis ultra. Peduncululi triquetri,
tomentosi, micani. Pedicelli plures, aggregati, uti calyx et vexillum
feniceo. Bractea ad basin juguli pedicelli, subulata, longitudine
pedicelli

Calycis lacinis canaliculato

Numula Galega

^{madagascariensis}
Habitat, dedit la Martini

Solliola cuneata; emarginata. Pedunculi subuniflori

Cinerea Galega leguminibus patentibus fructis pedunculatis racemis oppo-
siti foliis, pedicellis solitariis, foliis subtus vellofis, stipulis lanceolatis
Galega cinerea leguminibus fructis patentibus pedunculatis,
racemis oppositis foliis, foliis mucronatis subtus vellofis. Len. J. V
pag. 679 Am. ac. 5. p. 403. Garya coll. 2. p. 333.

Galega herbacea subcinerea vellofa, foliis oblongis pinnatis
pinis laxioribus ad alas Brown Jamaica. 204

Habita in stipulis amer. mexicana

Caules flexuosi angulati vellofi cinerascens. folium 5- 6 juga
foliola substipulis per opposita cuneiformia interiora minor
terminale unguiculare, mucronata subtus cinerea. stipula
lanceolata obtusata. Racemi folios compositi flexillium extus
vellosum calyx uti legumina cinerascens legumina in hoc
lucano linearia recta.

Capensis G.

Galega capensis Haeyn. coll. 2. pag. 292.

Habitat ad C. b. mei 7

Fruticosa caulis et rami ad Centem villosuli basi ramifus; teres, prostratus, ramis ultimis aspidatis. Folia ^{impari} pinnata, 4-5 pinnis, glabra; foliola oblonga, opposita, obtusa, integerrima. Stipula subulata. Racemi oppositi foliis, gracili, semipedales, pauci flori. Cotolla rubra, legumen ad Centem villosum lineare, teres ad semine tumulosum Haeyn.

Specimen in herb. sub hoc nomine Dubium

Littoralis G. Leguminibus racemosis, tota villosa-tomentosa Len. l. V. p. 679
Vicia littoralis pedunculis multifloris, folioli oblongi tomentosi,
stipulis integris, Leguminibus sublinearibus Gaeyh. herb. 206
-t. 124.

Habitat in Clithageno littoribus arenosis maritimi. ~~7~~ 5.
Caulis erectus ramosus rami apice incani - folia 7 pinnis
folioli vix unguicularia interna minora, aristata utraque
villosa Pedunculi axillares, solitarii longitudine foliorum
villosi 3-4 flori. Calycis villosi Legumen bipollicare
ad singulum seminem linea exsulcata.

Caribaea *G. leguminibus fructis glabris pendulis racemosis, foliis glabris
mucronatis, caule fruticoso* S. V. p. 679 *Trigu. herb. 212. t. 125.*

Habitat in Panbait

Rami parum flexuosi, angulati, apice oculo armato villosi. Folia 11 pinnis
foliola oblonga superius glabra, subtus villis raris, unguiculata, mucrone rigidi
cusculo terminata. Stipulae setaeae - Legumina bipollicaria vel parum
ultra, transversim flecto in articulis quadrangulatis. Distincta herb.

Yusf

foliola seta terminata

prostrata Galega villosa, caulibus ⁶ prostratis, stipulis ⁷ setaceis, leguminibus ¹² linearibus ³ rectis, ² foliolis supra glabris

Habitat in India orientali

Caulis plures, semi-pedales, tenues, uti tota planta villosi. Folia petio-
lata, 3-5 pinnata: foliola cuneata, mucronata, supra glabra, unguiculata
interna minora, subtus canescentia. Stipula parva. Racemi axillares.
Legumina pollicaria, villosa

herb hort

landiani Galeya

Habitat - Dupuis. 5

Armi teretes, canari. Folia petiolata, pinnata, trijuga: foliola lanceolata,
extremum pollicare, interna minora, sinuata, obtusa, basi acuta, villosa, supra vi-
ridia, subtus incana. Stipula lanceolata. Legumina axillaria, gemina, bre-
viter pedicellata, falcata, linearia, patentissima, villosa, incana, bipolli-
cana

Cotyledonia Galega foliis ternatis quinatisque obovatis.

Habitat ad Onchest. Rich.

Caulis fruticosus, ramosus: rami superne angulati; villosi, incani. Folia breviter petiolata: folia breviter petiolata, intermedium ^{ca} fere pollicare
semipollicem ^{ca} lateralibus minoribus, supra glabra, venoso-striata
subtus nervosa, villosa, incana, obtusa, basi acuta. Stipulae parvae
lanceolatae. Peduncululi axillares, brevissimi, terni, uniflori. Calyx villosus
paleo canescens, dentibus subulatis. Legumen patens, bipollicare, acinaciforme,
ope lentis villosulum
confer cum fruticoso.

hespidula Galega

Habitat Herb. Ruth.

Caulis pedalis: Legumina patula villosa, annuata

habe.

Galiza villosa Michaux (non Linnæi)

Habitat in Carolina herb. Nut.

Caulis herbaceus, flexuosus, hirsutus, pedalis, simplex, erectus. Folia 6-7-pa, foliola
lanceolata, obtusa, submarginata, mucronata, villosissima, basi acuta, subtus
nervosa, pallidiora. Stipula lanceolata. Pedunculi axillares, longitudine
folii

volubilis Galeya

Habitat in America merid. herb. Surinami apud Truf.

Caulis volubilis, teres, ydlofusculus. Folia petiolata, quinato-pinnata
foliola petiolata, oblonga, seta terminata, semipollicaria, utrinque gla
bra, minime striata. Stipula pubulata. Pedunculi axillares, solitarii
vel gemini, uni flori, capillares, sesqui pollicares, villosi. Calyx laciniis
setacis. Legumen rectum

Galega

Habitat in Philippinis Commerson

Caulis villosus, pubescentes; uti foliola subtus. Foliola lineari-lanceolata, basi acuta, obtusa, terminale emarginatum. Stipula petalis. Racemi brevissimi. affinis purpurea, diversa Vamen videtur.

angusti folia Galega leguminibus, racemosis linearibus subsalicatis, folioli linearibus
subtus villosi, stipulis sabulatis.

Habitat in Domingo herb. Gusf.

Caulis pedalis, subramosus, superne adpressus villis aliquot oculis armatis viden-
dis, teres. Folia quinque pinnata: foliola fere pollicaria, supra glabra, angu-
sto, versus basin sensim parum attenuata. Pedunculi foliorum longior. Flores
geminati, medioer. Calycis cinerei: laciniis setaceis. Legumina bypocrita
rara, rectiuscula.

prope G: maximam collocanda

Caraginosae Galega hirsuta, folioli oblongis mucronatis, racemis elongatis, legumini-
bus rectis, stipulis lanceolatis

Orobis virginiana, foliis fulvis lanugine incanis foliorum nervo in spinulam
abunde Plukn. mant. 142.

an Oletoria foliis pinnatis, caule decumbente L. v. in Cliff. ?

Habitat in America hab. 4usf.

Tota pilis flavescentibus hirsuta. Caulis teres. Folia quinque ^{foliolo} pinnis, subsessi-
liis, opposita, oblonga, raro subtriangulata, fere pollicaria, nervosa ut in
galega. Stipulae unguiculatae. Pedunculis longissimus, superne floriferus.
Bractea linearis-lanceolata, longitudine fere floris. Calycis hirsutissimi
lobes glabri. Legumina bipollicaria, linearia villosa
an G. littoralis? an virginiana.

humifusa Galega

Habitat prope loc. Dauphine Commerfor Herb. Mus. &

Caules crassitie fili grossiori, flexuosi lignosi, villosi, rami ^{prostrati} ~~pauciflori~~
humifusi. Folia petiolata ^{2-3, supra lobata} ~~quadrata~~ pennata: foliola sesiplica
opposita, basi acuta cuneata, basi acuta, apice emarginata, striata,
subtus villosa, supra glabra, unguiculata. Stipula subulata.
Racemi laterales, subquadriflori, ^{folia breviores.} Flores remoti, Bractea
minuta subulata. Legumina erecta, sesquipedaliana, villosa,
lopa, convexa, extrosum perum sesqui latera

Dalmanella Galega

Habitat

Decumbens Galega

Habitat in Cap. b. spai. Herb. Mus

Caules filiformes, ramosi, glabri. Folia quinquejuga. foliola sessilia,
lanceolata, utrinque acuta, unguiculata, striata, supra glabra, sub
tus villosula. Stipula subulata. Pedunculi terminales, demum latera
les, spithamei. Flores remotissimi. Legumina recta, pollicaria,
acuta, cinerea & centia, patens & dima.

orientalis Galega Leguminibus pendulis, foliis stipulisque ovatis glabris
Galega orientalis latifolia, altissima, flore caeruleo Tournef. Cor.
Habitat in oriente herb. Arab.

Caulis erectus, teres, ceterae omnes partes plantae glabres, a folio ad folium flexuosus.
Folia quinque parya: foliola subpetiolata, opposita, venosa, acuta, pollicaria. Stipula lata, obtusissima. Racemi terminalis, gemini, spithamei: flores compositi
affinis Galega officinali.

Diversifolia Galega herbata, leguminibus axillaribus geminis, foliis obovatis
pinnatis ternatisque. Foliis obovatis, stipulis subulatis

Orobis americanus latifolius, argenteus, flora purpureo Houstoni

Habitat in America herb. his.

Paulis an volubilis? uti tota planta vellis cineris subhirsutis, striatis. Su
lci remota, ternata et quinata-pinnata, ^{foliola puberula vasa serrata} hemipolluciana, interiora mino
ra. Stipula linearis-subreniformes. Pedunculi breves. Calyx hirsutissimus.
Corolla glabra.

An hujus generis vel potius Clitoria species?

altissima Galega foliis ovato-oblongis glabris, racemis multifloris, stipulis oblongis

Galega orientalis latifolia altissima flore coeruleo Tournef. Cor.

Habitata in Oriente ex herb. musci

Caulis erectus, teres, striatus, glaber. Folia pennata, 4-juga: foliola bipollicaria, brevissime petiolata, oblonga, basi ovata, extus sensim attenuata, acuta, mucronata, remota sub nervosa. Stipula oblonga, integerrima, 3/4 pollicaris, basi absque auriculo. Racemi axillares, pitha-
moi. Flores copiosi, ^{parvi} coerulei, penduli. Bractea subulata, longitudine pedicellorum. Calyx, uti pedunculus superne, et pedicelli villosuli: lacini ~~o~~ setaceo.

Difcolora Galega Leguminibus ruscifolii rectis patentibus: foliis oblongis, subter-
senicis, stipulis subrotatis obtusis
Sicilia indico, foliis aversa parte argenteis Vaillant
Habitat in India herb. Vaill.

Rami teretes, villosuli. Sola subsessilia trijuga: foliola oblonga, semipol-
licaria, opposita, interiore minore, supra glabra, striata, utraque ob-
tusa, saepe ~~marginata~~ ^{marginata}. Petioli incani. Stipula parva. Racemi ^{oppositi} ~~axilla-~~
~~res~~, erecti, pauciflori. Flores vesper apicem pedunculati, geminati, rubri. Brac-
tea et laciniis calycis subulata. Vexillum extus villosum. Legumina
bipollicaria, linearia, glabra
Confer cum Gal. cinerea Gaerq.

incarnata Galega villosa, leguminibus racemosis retrofalcatis, folioli lanceolati, stipu-
lis setosis

Croton americanus villosus; floribus ex purpureo incarnato Par. Batav. prod.
359. Plukh: alm. 274

Habitat in America ex herb. Musci

Tota planta villosa subcinerea. Caulis herbaceus, tenuis, superne angulatus.
Folia quinquaginta: foliola pollicaria, supra minus villosa, linear-lan-
ceolata, basin versus sensim angustata, mucronata, obsolete striata. Stipulae
unquidulares. Racemi oppositifolii, 4 pollicares, foliis longioris. Pedicelli
geminati. Bracteo, Calycisque laciniis setosis. Vexillum villosum. Legumi-
na sesqui pollicaria, angusta, linearia, compressa.

monantha
uniflora Galeya Leguminibus foliatis sessilibus subfalcatis incanis.

Habitata Senegal herb La Marche.

Caulis herbaceus an? Rami angulati, canescentes. Foliae petiolata, pennata,
triplicata. Foliola petiolata, opposita cuneata, subtus incano villosa, semipolli-
caria. Stipula setacea. Legumina erecta, bif. tripollicaria

officinalis *G. Leguminibus fructis erectis; folioli lanceolatis striatis nudis*
Lin. S. V

Galega vulgaris Bauh. pin. 352. Monf. herb. 2. p. 91. f. 2. t. 7. fig. 9.

Habitat in Hispania, Italia, Britannia ad vesperas &

Caulis erectis superne obscure angulatus flexuosus glaber
folia 6 juxta foliola int. externa parum long. breviora
sape emarginata cum pta basi acuta. more generis oblique
striata stipula lanceolata hastata attenuata Racemi
axillares multiflori folio longior legumina glabra
bipollicaria recta

Est *Galega* (Plantar. in herb. Guss. *G. off.* maxime affinis diversa stipulis an
modo varietas?)

orientalis
La Mancha
ideoque uti species
sufficiens
Tota glabra. Caulis teris striatus, herbaceus crispis pennis an
fernis. Folia 8 juxta foliola subsessilibus oblonga, mucronata,
pollicaria. Stipula ovato-lanceolata, hastata, attenuata
Racemi oppositi folii, folio parum longior. Legumina teris
Calyx squedentatus hoc aliquid alieni habet

Vincetona G. spicis lateralibus pedunculatis, leguminibus strictis pendulis, foliis
emarginatis subtus villosis fl. ceyl. 3027
Habitat in Ceylona

non vid.

1-2
4 tomentosa Galega Legumini bus fructis ascendebis villosis racemosis, ~~latera~~
~~oppositis foliis pedicellis ter-~~
~~tatis, foliolo lanceolato subtus pinnatis, stipulis subulatis~~
Lathyrus tomentosus; pedunculis uni floris ternatis Boiss. Desf.

pag 135

Caulis villosus subtomentosus angulatus.

Folia 4-6 pinnata: foliola ^{pollitana?} lanceolata, obtusa, mucronata, basi acuta,
supra glabra,

Pedunculus oppositifolius, dorsantalis. Locis remotis, pedicellati
ternis ped singulum dentem. Pedicelli villosi.

Bractea bina, subulata, pedicello brevior.

Calyx villosus

Corolla vexillum extus villosa cinereum.

Legumina bipollitana

(in paucis) ^{serbiat} a cinerea differt, stipulis angustioribus Leguminibus ternis ad
singulum dentem pedunculi. ~~aa patria an modo varietas~~

pollens G. Leguminibus striatis patentibus ciliatis, stipuli subulatis, folioli
(9-11) oblongis acuti, pubes pubescentibus Hod. New. B. p. 70
Habitat ad Q. 6 p. 1/2

non vidi

~~2000~~ 2000

maxima 9. leguminibus fructis adscendentibus glabris, stipulis canaliculatis
foliis oblongis glabris fl. Reyl. 3004
Sicca foliis glabris venosis oblongis, floribus gemellis Burm. Reyl.
220. t. 100. fig. 2.

Habitat in Zeylona

Caulis glaber. superne angulatus. folia 5-juga foliola
utroque glabra emarginata unguiculata interna parva
minora. Racemi terminales pauci flori. Serrillum externum
villosum

Astragalus Palaestensis foliis et stipulis glabris Mus. Bot. Herb. Guss.

foliolisque uniceformibus

plantam in herb. mus. vrb. q. maxima affinis Petw. 613.

Foliorum cuneatis emarginatis, semipollicanibus. Petiolis pedunculis et caule
hirsute pilosiusculis. Stipules setaceis racemis folio longiores. pedicel-
lis remotis fomis geminatis. Leguminibus bipollicanibus, glabris rectis, pa-
tentibus.

an specie diversa?

purpurea G. Leguminibus fructis adscendentibus glabris racemosis terminalibus,
stipulis subulatis, foliis oblongis glabris Lin fl. Zeyl. 301*

Coronella Zeylanica herbaecea, flore purpurascente Baum Zeyl. 57.

Tab 32.

Habitat in Zeylona.

Caulis glaber superne angulatus. folia \varnothing supra. foliola
pollinaria utraque interna minor obtusiuscula
utroque glabra stipula setacea subulata. ^{ornithopodifolia} Racemi ~~caulati~~
in foliis longior pedicelli plerumque terni Calyx ope lentis

velloso ^{legumina bipollinaria}
^{sub nomine per perla} Galegam in herb. Mus vidi cum synon. Petiverii ad maximam allatam
(sic eadem quod dubito) et Ornithopodoides Plukh. Tab 52. fig. 1.

Racemis foliis brevioribus stipulis setaceis caule villoso, differe videtur
a maxima foliis parvis majoribus obtusis cum mucrona ^{sans hanc}
emarginata, in modo videri et ad maxima

folioli
— cu nei formibus glabris

ochroleuca J

Galega ochroleuca Gaerq. coll. 1. pag. 79.

Habitat ~~in~~

Caulis tripedali erectus, ramulosus. Rami juniores pedunculati calycis, petioli et folia
etragie illis mollibus densi tecti. Folia pennata cum impari 3zuga subovata
integerrima obtusa, brevissime petiolata. Pedunculi axillares, foliis longioris, su-
perna incampi. Dentes calycis lanceolata. Corolla ochroleuca: vexillum subrotun-
dum emarginatum potentissimum. Legumen linear glaberrimum compressum
ad semina transverse striatum, fuscum pendulum. Semina compressa atra

Gaerq

45 grandiflora Galega leguminibus retrofalcatis pendulis rucamosis, foliulis lanceolatis,
stipulis ovatis acuminatis, vix illis subtus sericeis.

Galega grandiflora leguminibus patentibus, stipulis ovatis lanceo-
latis, foliulis oblongis medio stipulis aristatis. Hort-New 3. p 70.

Dedit de Bulow.

Caulis fruticosus, teres, ramosus, adpersus pilis minutissimis

[Folia petiolata, palmata, pinnata cum impari, byrsa. Foliola breviter
petiolulata, unguiculata, ^{extrema} ~~superiora~~ majora, extrosum parum latiora,
aristata, ~~muticata~~ supra glabra, subtus ad latera pilosa.

[Litr. G. pag. 35.]

Petiolus vix pubescens

Stipula ovata, nervosa, purpurascens, semiunguiculata.

Pedunculi terminales, erecti, elongati. Flores ad apicem, oppositi
approximati nutantes.

Bractea ovato-oblonga, acuta, purpurascens, decidua.

Calyx tomentoso-sericeus

Corolla purpurea. Sexellum supra glabrum

Legumen compressum, marginibus albedo dense ciliatis.

(Galega Virginiana differt. caule villosa, foliis 10-12 jugis, extrosum
non latioribus, bractea subulata, leguminibus ^{utique} villosis.

arborescens Hypenium floribus trigynis corollis calycibus lobis, ^{glabris} foliis ellepticis
floribus racemis bracteatis caule arborescente

Habitat in India Orientali

Rami superne tetragoni, cortice purpurascente, glabri

folia petiolata, elleptica, paucis acuminata, a venia concava
integerrima, supra ^{nervosa} glauca ~~viridia~~ bypolliciana et ultra.

Racemus terminalis, compositus bracteatus, psithamous

Pedunculus communis ^{et pedicellus} pedicelli quatuor vel
seque ad singulum articulum pedunculorum partialium brevis

Calyx pentaphyllus solidis ovatis glabris integerrimis lobibus nudis

Petala 5 longitudine et figura calycis

Filamenta in 3 phalanges connata fere ad apicem, intus glabri, extus

filisae anthera omnes latera exteriori filamentorum connationem
insidentes et cooperentes.

germen trigonum glabrum ovatum

Habitus omnino Hypenii quianensis et guineensis et
bacciferi ad diversa numerosa justellorum corollis non barbata
in florescente

cum filamentis ad apicem connatis in tres phalanges connata
num quatuor propriis generis at reliqua omnia Hypenii

conspicua
glabra
extus latera exteriori
filisae
anthera
insidentes
cooperentes
germen
trigonum
glabrum
ovatum

pulchella Galega Leguminibus rectis villosis pendulis racemosis, Stipulis subula-
tis, vexillis supra foliisque ^{pubtus} villosis
4-5

Galega pulchella: Leguminibus rectis teretibus, villosis; Stipulis
lineariibus, foliolis plerisque acuminatis: acumine reflexo Simp.
Del. fl. in sub. p. 1. pag. 3. tab. 2.

Galega striata Leguminibus rectis villosis, racemis oppositi foliis,
Stipulis subulatis, foliis villosis oblongis, vexillis supra lineariibus
Hort. kew. 3. p. 70

(Galega grandiflora differt ramulis angulatis villosis uti foliola
pubtus. Stipulis subulatis parvis villosis. Bracteis subulatis

~~triflora~~ Ruellia foliis ovatis ^{lanceolatis} acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus
elongatis bifloris

Habitat in S. Martha

Caulis herbaceus? Tetragonus pubescens

Folia petiolata subsimplicata, utraque ~~acuta~~, ^{prope} ~~prope~~ ^{parum} per
petiolum decurrentia, utraque ~~sa~~ ^{sa} ~~pilosa~~ ^{pilis} minutis adper
sa subtus pallidiora

Petoli pubescentes sesquipollicari

delincentur

Pedunculi ^{teretes} axillares oppositi, longitudine ^{ferè} foliorum pube
biflori. ⁱⁿ ^{ramis} ^{uni} ^{floris}

bractea ^{utroque} ~~ge~~ ^{ramorum} ~~hinc~~ ^{ad} ~~basin~~ ^{pedicellorum} lanceolata ciliata

pedicellis parum longioribus alia ad basin calycis ⁱⁿ ^{apice} ^{pedicelli} ^{equi} ^{quæ}

longitudinis pedicellis proprius brevior glaber

Calyx quinquefidus ^{glaber} laciniis lanceolatis subaequalibus

Corolla sesquipollicaris ^{glabra} basi angustata superne

ampliatus ringens laciniis duobus superioribus rotundatis

Inbus inferioribus parum brevioribus ovatis

Filamenta longitudine corollæ Stylus corollæ longior

viscatona G. Leguminibus fructo adscendentibus subullosis, stipulis subrotundis
lobis subulatis, foliis (11-13) oblongis obtusis subtus pilosis sculis,
pedunculis anticlypeis Hort. kew. 3. p. 71.
Habitat in India et insulis maris pacifici B

non vidi

Penticofo G. Leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis subtus
sericeis, caule fruticoso. fl. zeyl. 303.
Habitat in Zeylona 5

~~Michx.~~ Dedit Brugm

villosa g. leguminibus retrofalcatis villosis pediculis racemosis lateralibus,
folioli glabris lanceolatis Lin. fl. Reyli. 2997

Securidaca madagascariensis, filiqui foliatis fulvis et villosis plurimis
circa ramulo stellatim positis Pluken. alm. 399. t. 59. fig. 6.

β Coronilla zeylanica filiqui fuscis hirsutis villosis; floe albo Burm
zeyl. 78. t. 33.

Habitat in India

Caulis lignosus, superne angulatus, flexuosus a folio 2 folium, uti
foliola subtus, petioli et pedunculi hirsuti. folia 10 jugu
foliola linearia ^{usque angulati} ^{hinc glabra} ^{minus} ^{concolorata}
^{interiora parum} ^{lateralis} ^{seu} ^{lateralis}

Racemi axillares et terminalis. Pedunculi angulati longitu
dine foliorum. Pedicelli gemini bursiformi calyce uti legumina
hirsuta incana. Vt illum. extus villosus. Legumina polli
cana

herb
mus

Adragalus malabaricus. vicia foliis, filiqua falcata lanuginosa Petrus
nil sive indigo spuria Rayi herb. mus

Spinosa G. Leguminibus solitariis retrofalcatis compressis stipulis spinosissimis
bus, foliis cuneiformibus canis, caule diffuso Len. Suppl. p. 335. +
P. V. p. 679.

Habitat in Comand el ad margines agrorum T

Rami canis inferne teres superne obscure angulati. Folium
4 puz. foliola vix anguicularia interiora minora supra gla
bra subtus villosissima subincisatis. Stipulae patentes. Ped
unculi axillares 1. 2. 3. 4.

an eadem ac pentecostis Len. ex herb. Heron. quondam descripta
dein oblita

Daurea sp. *leguminibus retroflexis linearibus pubescentibus erectis*
spicatis, foliis lanceolatis subpetiolatis albo pilosis
Pall. d. 3. p. 742. t. w. 17. 1.
Habitat in Sibira

non vidi

Dubia Gal.

Galeya dubia Gaertn. coll. 4. p. 132.

Habitat ad C. b. per

suffruticosa & caules plures ascendentes. Virescentes villosi, cuneis ramis
semipedales. Folia pennata villosa, in una sesquipedalia. Foliolis
utroque arcibus cum impari oblongis obtusis, interdum lobe emarginati
natis brevissime petiolatis, parvis. Racemi axillares, solitarii foliis
triplo longioribus villosis, superne pappiferis. Calyx profusus. Petala purpurea
strenata. Gaertn.

non vidi

nigra

pubescens Galez. La manthii ex horto Pont. Desimpfi sed sub alio
nomine.

Legumina secund. spec. herb. La Manthii erant rectiuscula, glaberrima
bipollicaria, fusca ad semina transversim sulcata.

Hedysarum sericeum v. Pehr 44 Tetanus
nauciflorum. Glycyne oroleptia

Toxicaria G. fructus terminalibus pedunculatis, leguminibus. Ventibus
pedicellatis patentibus, caule foliolisque incano-tomentosis. In
prodr. p. 100.

Galega frutescens, foliis pinnatis Plum. ic. 126. t. 235.

Cytisus 2. Brown. jam. 296.

Habitat in Andria ora Dentali

Tota villosa. Tota fere spithamosa, 10 ped. foliola sublonga, sericeo
supra villosa vixida. Stipula setacea, seminquilares. Rac-
mi foliis breviores vel aequantes. Caulis erectus, inferne vix super
ne angulatus. Flores interdum 4 5: ad eodem dentem, paucos
fessiles adultiores pedicellati. Axillum extus villosum
Semina dant colorem fidelem lilac herb. Daspi

Genoa Ca. manib. est vel pucatorum vel Toxicaria seu una herb.
fus.
Descriptionem quoniam inter americana

virginiana G. leguminibus retro falcatis compressis villosis spicatis, calycibus lanatis, foliolis ovali-oblongis acuminatis An. S. V.

Picea astragaloides virginianus hepaticae pubescens; floribus amplis subrubentibus Plukh. alm. 103. t. 23. fig. 2.

Polygonum folio pennatis, caule decumbente Hort. Cliff. 4984

Erechtium Michx. Gen. 20.

Habitat in Virginia, Canada

Rami villosi ^{ut petioli} foliola ^{foliola} 12 supra lanceolata vel ovali oblonga ^{est lacinia minor} fere polliciana subtus villosa. Pedunculus angulatus pedicelli plures ut pedunculus et calycis dense villosi. Flores magni vertillum extra villosum.

Caulis purpurascens villosus uti reliqua partes: foliola fere polliciana mucronata.

Coccoloba G. racemis terminalibus multifloris coarctatis, foliis octo ad Decemjuga
foliolois ellipticis, caule scabro Len. Suppl. p. 335. f. 1. v. p. 689
Habitat in America meridionali

non vidi

filiformis Galega

Galega filiformis Jacq. coll. 2. p. 340.

Habitat in Amer. calidior.

Caules gracili virenti, ramis spicatis, ad centum vel plus, 4 pedali. Folia ternata, breviter petiolata, parva: stipula oblonga, obtusa, supra nitida ad centum villosa. Stipula subulata minuta. Racemi axillares solitarii, filiformes, pedali 2-4 pollicares. Flos ternati, binati vel solitarii. Calyx subvillosus. Corolla fœtida vi olacis purpureo-rosea. Legumen ovæ lentis villosum sub pollice vel, lineare, compressum fœtidum, foliatum inter semina stria vasa vespa Jacq.

Longifolia Galega

Galega longifolia Jacq. Coll. 2. pag. 349

Habitat in America calidore

Suffruticosa caulis pluri, volubiles teretes, graciles glabrae & pediculis; ramosi. Folia bipinnata, brevissime petiolata; foliola angusta oblonga, obtusa, integerrima utriusque ad litem villosula. intermedia longior 3 pollicari

triacem aut major solitarii folio longior. Flores gemmati. Calyx villosus. Corolla purpurea. Germen villosum. Legumen bipollicare

sepe villosum lineare compressum, rectum ad semina & sulcatum.

Jacq.

Spicata. G. spica longis Vermiculatis Walt. fl. car. p. 100.
Habitat in Carolina

na nidi