

Garcinia

1. mangostana G. foliis ovatis oblongis, pedunculis unifloris
2. celebica G. foliis lanceolatis pedunculis trifloris
3. cornea G. foliis lanceolatis acutis, pedunculis unifloris cernuis

Cambogiam hinc quoque vocat de la Mark

2 *Celebica* G. foliis lanceolatis pedunculis trifloris Len. f. V.

mangostana celebica Rumph. amb. 1. p. 134. t. 44.

Habitat in India

Decia floribus foeminei solitane sub sessilibus La Mart.

1 mangostana Jac foliis ovatis pedunculis unifloris Lin. S.W.
Ellis descr. of the mangostan and the Bread fruit. 1775 c. tab.
Laurifolia javanensis Benth. per. 461.
Mangostana Rumph. amb. 1. p. 132. t. 43.
Mangostanus Jac. in Act. Anst. 43. tab. 1.

Habitat in Java &

Ram. angulati glabri, spongiosi &. Folia breviter petiolata
opposita, coracea, integerrima, obtusa utraque
glabra supra ^{nitida} ~~nitida~~ ^{subtarnis planis} ~~nitida~~
nervis ^{interstitiis} ~~interstitiis~~ atque ^{adpressis} ~~adpressis~~
nervis ^{interstitiis} ~~interstitiis~~ Petioli rugosi

foliis ellipticis ovato-oblongis (ellipticis)

morella G. bacca 4 loculari, stigmate sicco quadrilobo La. Mark.
Arbor indica gummi guttam succum etc: Burm. Zeyl. 27.
Mangostano morella G. Arn. de fr. vol. 2. p. 106. Tab. 105.
Habitat in Zeylone &

non vid.

mangosar *Garcinia*

H. B. K. f. 1.

Rami angulati, superne flavescentes, glabri. Folia opposita, brevissima petiolata, fere pedalia, elliptico lanceolata, attenuata, acuta, venis fere transversis nervosa, coriacea, glabra, integerrima. Petioli basi crassi, rugulosi, supra basin superne canaliculati, canaliculus per costam excurrent. Calycis foliola subrotunda.

malabaria. G. foliis ovatis obtusiusculis pedunculis ramosis, flore campanulato. La Mart. Encycl.

Panet sijnha maram Aked Mal. 3. p. 45. T. 41

Habitat in Malabaria

non vidi

3 corneum G. foliis lanceolatis acutius, pedunculis unifloris cernuis Len L.V.
Lignum corneum Prumph amb 2. p. 55. 190
Habitat in India orientali

non vidi