

Gaultheria

1. procumbens
repens G. pedunculis axillaribus unifloris, caule decumbente
pedunculis axillaribus, unifloris, multifloris pedicellis racemosis
2. antipodag racemi terminalibus, caule erecto ramosisimo

odorata *Spullthana* foliis obovatis obtusis serrulatis subtus
punctato-fimbriis, racemis terminalibus bracteatis.
Willd. loc. cit.

habitat. Monte Agilo prop. Caracas.

Stem 4 - 6 pedalis. Folia alterna brevia petiolata rigida
obovata subovata obtusa remote serrata, subtus reticu-
lato ~~f~~-venosa, punctis elevatis nigris conspersa, bi-
pollinaria. Racemi terminaliter ~~semples~~ simplices. Pedunculis
filiformibus bracteis ovatis brevioribus. Calycis laciniis ova-
tis acutis patentibus. Corolla alba calyce longior.
Stamina corolla breviora. Stylus longitudine fere
corollae.

Scabra Gaultthera foliis ovato cordatis acutis denticulatis scabris,
racemis axillaribus bracteatis. Willd. loc. c.
habis. ibid

Frutex sex pedalis erectus coriice fusca. Folia altern
na brevia petiolata ovato-cordata acuta bipillicaria
rigida, utrinque punctata supra subter reticulato-
venosa, margine denticulata. Rami, Petiol., Rachi, Pan
cemi atque Pedunculi pilis glutinosi glandulosi obli.
Racemi tripillicares solitarii axillares et terminales
simplices. Pedunculi alterni filiformes, bracteis ob
longo-lanceolatis concavis striatis sulcatis breviores
Calix piloso-glandulosus. Corolla ^{ovalis} ~~alba~~ calyce longior.
pilosifolia.

buxifolia Gauehene foliis subrotundo scabri - ovatis dentatis
subtus punctato scabri, pedunculis solitariis
axillaribus, ramis teretibus erectis. Willden. l. c.
Habit. monte Ajilo prope Curacur.

Truncus quadrisequalis erectus, cortice atro fusco,
ramis ramulisque pilis rigidis albicantibus spar-
sis oblectis. Folia seminucria alterna subro-
tundo-ovata obtusa rigida, brevissime petiolata,
margine remote dentata, subtus reticulato-venosa
punctata, punctis elevatis nigricantibus. Pedunculi
solitarii axillares filiformes breves uniflori, corolla
ovata alba.

Phagnicola Gaultheria

Habitat in amenia herb. Lunan.

Bin. drys frutex duis facie rotundifolia flore corineo Lunan
Rami teretes, glabri: ramuli hirsuti. Folia brevissime petiolata, pollicaria, cor
data, tenuissime serrata, serraturis setigeris, supra nitida, venosa, rigida,
glabra, costa pubes hirta. Racemi terminales, pollicares; Pedunculi hirti.
Bractea lanceolata, colorata, fructu. Calycis foliola lanceolata
an *Eugoa cordifolia* Swartz?

artypoda Gaultheria racemis terminalibus, caule erecto ramopiflo.

Gaultheria artypoda foliis parvis subrotundis serrato dentatis, caule fruticoso diffusis
Forst. prod. n. 196.

Habitat in nova Zeelandia ⁱⁿ ~~partibus~~ ^{facie} ~~partibus~~ ^{Betulo} ~~partibus~~ ^{nano} ~~partibus~~ ^{superne} ~~partibus~~ ^{villo} ~~partibus~~ ^{fuli}
Infructibus erectis ramosis cortice cinereo. Rami teretes superne pubescentes. Folia
petiolata, alterna remota, ovata, vel subrotunda, glaberrima, rigida, ^{utrinque} venis
reticulata denticulato serrata mucronulo ^{terminali}, ~~vel~~ ^{angustulana}
Peduncululi axillares solitarii uniflori ^{et} ~~compositi~~ ^{longior} ~~terminali~~ ^{terminali}.

† Squamose sepium floribus racemosis racemis parvis
minutis ovatis imbr
catis

confer. spec. de Lund.

Spiraea Aioupa. Lour. fl. Cochinch. pag. 276.

Habitat in Cochinchina &

Arbustula 5 pedali. folia ovato-lanceolata, opposita, breviter
et aequaliter serrata, crassa, plana, glabra, opposita. Spica
filiiformes, erecta, terminali. Calyx subrotundus lobis colora-
tus, villosus. Corolla calyce triplo longior tubo 5gono magno
limbo brevissimis. Filamenta filosa crassa, receptaculo inser-
ta. Germen subrotundum, calyce clausum, Stylus filiformis
Stigma inspersulum. Bacca calycina parva globosa
coronata

Gaultheria

affinis *Andromeda*
non vidi

Sphagnicola Gaultheria erecta ramis parvisque foliis herbatis, foliis sub
obtusis cordatis, cernentibus rigidis; semine fetigeni Act. Soc. Par. 1. pag. 109

Eragrostis cordifolia Swartzii

Cestrum *Gaultheria* centena videt Richard cum bancis Eritae