

Gaura

1. biennis G. foliis lanceolatis acutis, cymbris nudis
2. lutea G. foliis lanceolatis obtusis cymbris foliosis

mutabilis Gaura foliis oppositis alternis serratis: petalis orbiculatis acin-
tis Caran. Ic. vol. 3. pag. 30. tab. 250.
Habitat in nova Hispania
Ochetusa anomala Curtis botan. mag.

hexandra Gaum flombus tripetalis hexandri, caulebus ~~xxx~~ via
gulis, pueris Conyosomi Ortega. Dec. pag. 144

Habitat in Cuba 0

Solia lanceolato-lineana ^{sub} pendulata integerrima
~~est~~ nonnulla denticulata. Petala rubra. Nect. trigona
pyramidata.

non vid.

lutea Gauro foliis lanceolatis obtusis ^{integerrimis fere denticulatis} ~~conybrifolios~~ caule superne villosuperculo

Habitat.

Differt a procedente foliis latioribus, ^{brevis} arenis, floribus sessilibus in axillis foliorum ultimorum, flavis majoribus

Rami teretes pallide purpurei superne. Cetera villosa sub canescentia. Folia sessilia alterna lanceola polluciani ^{et ultra obtusa} cum mucrona minuto glandulosa glabra superne ^{na} obscure remote denticulata. Flores in apice ramorum brevissimae pedunculati plures foliolum ad ^{basin} singuli calycis ^{laciniis} lanceolatis mucronato oculo armato villosula ^{flavi} ^{sub} ^{longiore} ^{puberula} ^{exterior} Corolla flava petala obtusata. Germen angulatum unciniferum an hujus generis vel Oenothera fructum non vid. sub nomine gauro luteo ex horto parisiensi habeo. Differre videtur a reliquis Oenotheris

an hujus generis uterque inquirendum

est horto Parisiensis habeo

Chinensis Gaura foliis oppositis lanceolatis serratis, pinnis subtetrameris
bus Lour. fl. Cochinch. pag 225

Habitat Cantone Siamum

Caulis suffruticosus pedalis erectus Yenui, lepidus tetragonus. Folia
pinnata. Flores lutei foliola calycis acuta, incurva, reflexa.

non vidi

biennis *Gaura* foliis lanceolatis acutis corymbis nudis ramis pilosis
Lysimachia Chamaenerio similis floridana, foliis nigris punctis, capsulis
carinatis in ramulorum cymis Ruk. am. 139. t. 420. fig. 2.

Gaura biennis. Act. Holm. 1756. pag. 222. t. 84

Habitat in Virginia, Pennsylvania &c.

Caulis oxygali subramosis ramis teretes pilosi purpurascens. Folia
remota ^{pubescentia} utrinque attenuata sequi pollicaria, minute remote denticulata
glabra. Flores corymbosi sessilibus demum spicati. Germena villosa. Calyx
pubescens.

fruticosa ^{glabra} G. foliis lanceolatis denticulatis, caule fruticoso corymbis aphyllis

Gaura fruticosa Gaerth. coll. 1. pag. 142.

Habitat in America meridionali 5

Tota glabra. Caulis erectus, teres, crassitie digiti, cinereus, 6 pedalis. Folia sparsa subsessili, anguste lanceolata, acuta, glabra, denticulata, subundulata. Flores brevissime pedunculati, sparsim ramos longos aphyllos et sic superis ramosos obsident. Germina lanceolata, tetragonum villosa. Calycis exterioris lobis 4, oblongis, obtusis. Petala 4, alba cuneata. glandula nulla inter filamenta, capsula ovata acuta, 4 sulcata villosa, cinerea.

undulata

hexandra Gaura

Habitat hodie Hafr.

^{sesqui-pedalis}

Caulis erectus ^{per herbaceus}, subramosus, teres, pilosus; folia sessilibus
patentibus verna, bi- & tripollicaria, lanceolata, acuta, serrata denti-
culata, subundulata, glabra puberula. Spica terminalis elongata
^{horizontalis}. Flores distantes parvi purpurei. Calycis laciniis linearibus
longitudine, lateribus medio convexis apice et basi haerentibus.
Petala quatuor ovata versus summitatem, spectantes stamina
superiora tegentia, unguiculata cuneata, duo recta, duo lateralia
superum curvata, intermedia incumbentia

A Palyst pubescens

~~Fructus~~
~~in formis versis~~
~~in formis versis~~
Fructus
nisi id est planta. Bala radicali pediculis, cordata,
caulis plures, erecti, striati, angulati, supra dimidiati, globos
et bala in modo videri fronsis Comensan, Thum
angulata
Fructus foliis radicalibus cordato-angulatis, cordatis linearibus

Pern

~~Helminthostema hispidum²⁰, altissimum, Echii folio, leviter dentato Vaill. 1721. n. 47
resacum altissimum, asperum, uniuersale longifolium sicut unum,
Hemionum altissimum etc: Rapi hist. 3. pag. 145. no 17. polycephalon~~

Habitat herb. maj.

H. cath. 95

~~Caulis bipedalis et ultra, sulcatus, scaber, hirsutus. Folia sessilia, 5 quo pollicaria,
lanceolata, hirsuta, integerrima vel inferne remota dentata, scaberrima,
uti caulis. Pedunculi superne, axillares et terminales, hirsuti, breues, rigidi
um flori, 3. 4. Involucrum nullum. Calycis septicola lanceolata. Pappus
sessilis plumosus. Semina fusca transversim rugosa~~