

Genita

Genista

Cyrtis genista orientalis minima.

Habitat in Armenia herb. Tournef

Fruticulus fruticamentus, ramis: rami, rami flexi. Folia ternata, suprema
simplicia. Flores laterales, solitarii vel gemini,
sanat foliis villosis vel glabris.

habes

marginata Genista glabra, foliis lanceolatis sessilibus, ramis angulatis trique

tri

Genista maritima frutescens, lineifolia, caule alato Tournef. Cor.
~~ex herb.~~ Habet ut ex herb. Vaill.

Caulis teres, glaber, uti tota planta. Rami a margine tenui a basi
foliorum decurrente angustis subtrilobato, apice compressi. Folia
inquinularia, vel pollicaria, simplicia, acuta, mucronata

Stipula seta arenaria. Flores in axillis superioribus, brevissime pedunculatis,
caecae sub spinulo G. tinctoria parum minores. Legumina linearia, pollicaria, supra
sa.
11. 8 perma.

ovata genata foliis inferioribus oblongis superioribus ovato-oblongis ramisque villosis
pilis teretibus striatis

genata ovata; foliis oblongo-ovatis leguminibusque hirsutis, ramis veltibus
striatis Willden. Spec. pl. 3. p. 940

Habitat in Slavonia et Banatus collectus 7

Stipitulus ascendens, semipedalis, vel ultra, ramosus. Folia subsessile,
caei, subtus villosiora, inferiora unguicularia obtusissima, superiora
semipollicaria. Flores versus apices ramorum, brevissima pedunculati
solitarii, folio breviora. Calycis lacinae labii inferiores 3. angustissima
apice patentes.

ovata Genista foliis oblongo-ovatis leguminibusque

anglica genista speciosus ^{genista} simplex bus ap foliosis, ramis floriferis inermibus
foliis lanceolatis

genista anglica; speciosus simplex bus, ramis floriferis inermibus;
foliis lanceolatis lin. t. v. pag

Lactuca
paniculata

Caspi foliis subrotundis novemjugis oblongis glabris emarginatis, glan-
dula pedicellata inter omnia, ^{floribus} ^{opis} racemus ^{terminatis} compositis
Habitat in India orientali;

Rami purpurascens, subangulati, glabri, crassitie fere penna
an penna.

Folia petiolata alterna, pithamea 8 vel novemjuga. Foliole
opposita petiolata, sesquipolliciana, interna minora, venosa
utroque glabra, subtus glauca, ^{obtusa subemarginata} mucrone minuto terminata.

Petiole glabri

Racemi ex axillis ^{foliorum} superioribus, approximati. Pedun-
culi angulati subcarnescentes a base pedicellorum circa
incurvati dentati. Pedicelli primum conferti demum remotius
castriati et pubescentes. Bractea lanceolata

Calyx foliolis oblongis villosis laneficientibus

11. procera

Genista ^{frutis simplicibus axillaribus aphyllis, ~~sempiternis simplicibus~~}
glaber, ramulis angulatis, ^{junius axillaribus aphyllis,}
foliis lanceolatis glabris
^{perista} Martium procumbens, Germanico simile, foliis angustioribus #

Show it.
pag. 11. n.
255

^{lege locustem}
Habitat in Paduina iunctis ~~an~~ ad finem mensis Januarii, habitat
quoque in montolis Barbano #

^{sequi pedalis}
inter bipedalis: Rami ^{infruti} teretes, cortice viridiflavicante. Ramuli
parvi frequentes, ascendentes, simplicis finis, sulcato-angulati,
torti, uti tota planta, glabri ^{ramulorum axillares}
Spinis in ramis et ramulis ^{ramulorum} patentissimis, sesquipedalis caulis, fructu
fo-angulatis, apice flavescentes, rigidi, frequentes.
^{in ramulis}
Folii spinis triplo breviora, distantibus sessilibus, utrinque acuta
avenia,

Stalis minuta
ad basin calycis

Racemi terminales, erecti. Flores distantes, prope. Bractea
setacea ad basin pedicelli. # Pedicelli capillares
breves.

debis, non vero lanceolatis
nec longe flavis

Calycis laciniis subulato, angusto.
Legumen ^{habnum} semiaequilaterum, oblongum, utrinque acutum.
(Differt a G. anglica spinis aphyllis, ramulis angulatis, flori
sensu fructu non inermibus, laciniis calycinis angustis, non ⁱⁿ #

257

~~coriacea Ruellia floribus axillaribus terminalibusque solitariis / s. plibus; foliis
ovatis dentatis~~

~~Barbena coriacea: inermis foliis ovatis denticulatis petiolatis Linn. S. V.
pag. 576.~~

11-12 Sapiculata Genista ramis angulatis, foliis sapiculatis quinis lineari-
spinis axillaribus simplicibus subsessilibus

Habitat in Canariis

Rami purpurascens, uti ramuli, angulati, glabri sparsi:
ramuli simplices erecto-patentes.

Folia circiter quinque, linearia, crassiuscula, glabra, vix ungui-
culata, subaequalia, sessilia, omnia puncto ferrugineo ora-
ta, acuta.

Spina ex axillis ^{superioribus} ^{rigida, pungens} ^{subulata}
sa, apice in ^{floriferam} ~~pannam~~ ~~pungentem~~ terminata, saepe folio
uno alterove vestitur.

Racemi terminales. Flores plures, approximati. Bractea
setacea et 2 ad basin singuli pedicelli et duo alia ad
basin singuli calycis.

Calyx glaber. Laciniae setaceae

Corolla aenea fulva

15 bubalina L. capitulis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis integerrimis glabris
Lin. Suppl. p. 146. S. V. pag. 216.

Habitat in Q. b. p. i. t. ^{superne compressi vellosum}

~~Premi~~ ~~terre~~ ~~glabri~~ ~~et~~ ~~capiti~~ ~~sub~~ ~~foliis~~ ~~parum~~ ~~delatati~~ ~~et~~ ~~capu~~
foliorum nodosi. Folia petiolata opposita, subovata
tripollicaria, integerrima glabra, costa tantum rase pilosa
nervosa, arena. pili parvi copiosi in axillis. Capitula axilla
na breve pedunculata utrinque ^{vel ramulem terminantia} folium petiolatum. Involucra
nolyp ^{nuda} ^{ovata} ^{inversima} ^{acuta} villosa. Laciniis calycis lineari lanceolatis
corolla brevior. Corolla ex his villosa uncinata
capitula circa 4. sexflora
Capsula biloculari

forte potius species Rondeletii

Genista micrantha caulis prostrumbentibus laxis, foliis linear-lanceolatis, flori-
bus parvis punctatis Ortega. Decades pag. 68. tab. 10 fig. 1.

Habitat in Hispania

Caules suffruticosi, pedales, numerosi, prostrumbentes, angulati, inferne ramosi,
intermediis erecti. Rami graciles. Cymae sparsae sessiles, linear-lanceolatae
integerrimae. Flores distantes, punctati breviter pedicellati, parvi. Bractea
subulata, concava ad basin calyx longius bracteis duabus. Corolla lutea. Vexillum extra-
villosum. Legumen breve, bif. 3 spermium Ortega

humilis Genista folus oblongi ramulesque superne villosi, ramis spinoscentibus, & vna
vis, floribus axillaribus solitariis

Habitat in Sjra Herb. Dact. 5

Fruticulus humilis, ramosus, palmari. Rami plures, sparsi, striati, infer-
ne glabri. Sola simplicia, magnitudine fere genista pilosa. Cori brevissi-
me pedunculati. ~~Padua villosi~~ Padunculi uniflori. Calyx quinquefidus
~~et~~ ~~glandis~~: ~~laciniis~~ ~~cineari-~~ ~~lanceolatis~~
Corolla genista pilosa minoris: Legumen lanceolato-oblongum, villosi-
cum, utrinque acutum, monospermum.

microphylla Genista foliis ternatis simplicibusque subtus vix illo cannapae ex
tus villosis.

Habitat in Lusitania Herb. Vaill. 5

Fruticulus inermis. Rami angulati, inferne glabri superne subanestentos
post casum foliorum tuberculati. Folia ternata: foliola parva, genista pilosa
fere minora, oblonga, basi acuta, ^{quae glabra;} ramulorum simplicia, linear-oblon
ga, parum majora. Flores axillares, solitarii, breviter pedunculati,
genista pilosa parum majoris. Calyx quinque dentatus; fo
~~ria a genista pilosa~~ Taxis genista pilosa

falcata Genista spinis compositis, foliis oblongis glabris, pedunculis axillaribus
leguminibus falcatis glabris.

Genista praestans lusitanicum, siliqua falcata. Tournef. F. R. Herb.

Habitat in Lusitania herb. Vaill.

Fruites rigidus. Rami glabri, inferne teretes, superne striati, subangulati,
villosi. Spinae validae, fere pollicares, utrinque basi munitae minore,
quo interdum iterum dividitur: juniorer simpliciter, flexiliores, apice
flavescentes. Folia semiunguiculata, vix petiolata. Pedunculi la-
terales, uniflori. Legumen pollicare, apice incurvum, stylo sub-
lato terminatum.

heterophylla Genista foliis ternatis simplicibusque ^{laevibus puberulis} ~~subrotundis~~ glabris, ramis fere
scentibus spinescentibus, floribus racemosis
Habitat in Portugallia Herb. Turc. 5

Textus rigidus, glaber. Rami sparsi, teretes, senescentes spinosi, ad-
pressi semiunguicularibus patentibus. Folcia in ramulis flexilibus
ternata linearia sessilia, ^{terminalia} floriferorum oblonga subrotunda, crassius-
cula, magnitudine thymi. Flores cincti 6 pedunculati ad apices ra-
monum, folium subrotundum ad singulum pedicellum. Calyx
glaber: laciniis subovatis. Corolla magnitudine Geniste pilosa.
Legumina glabra, locis, semi pollicaria.

parviflora Genista glabra, spinis simplicibus, foliis lineantibus, floribus
axillaribus pedunculatis

Genista spartium lusitanicum minus spicata flore Tournef. G. R. 4.

Cytisus aculeatus lusitanicus flore aureo spicato Gussley.?

Genista spinosa lusitanica flore luteo spicata Gussley

~~Genista~~
Genista

Habitat in Lusitania et mauritania herb. Vaill.

Frutex elegans ramulis omnibus floriferis, foliis glabris. Caulis teres.
Rami patentissimi, bipollicares, adspersi spinis distantibus, patentissi-
mis & unguiculatis vel parum longioribus, axillaribus, apice
flavescentibus armati armatis spinula una alterave minore et axil-
laribus juniorum. Bolla sessilis, ternata: foliola vix semi-
unguiculata, obtusiuscula. Flores frequentes, patentissimi, peduncula-
ti, parvi. Calyx coloratus: laciniis subulatis. Legumen oblongum, aca-
menatum, fuscum, semiunguiculata, dispermum. Semen nitidum
femineum.

Specimen ex herb. gaudet foliis parum longioribus

vernalis Genista foliis lineari-bus glabris, pedunculis & ditaxis unifloris.
Genista pentica humilis verna linaria folio utrinque glabro Tourm.

Por:

Habitat ex herb. Vaillant. 5

Frermis. Caules prostrati; Rami aggregati simplicifoli, striati,
angulati, spithamei, glabri, Tenues. Folia simplicia, angusta,
semipollicaria, utrinque glabra, sessilia. Flores solitarii, breviter
pedunculati, longitudine foliorum, magnitudine G. tinctoria, glabri.

incurvato Genista foliis linearibus-lanceolatis subtus villosis; pedunculis axilla-
ribus solitariis, ramis adscendentibus.

Habitat in Italia herb. Vaillant. 5

Caeser genista Victoris. Endiculus humilis, palmaris vel parum ultra.
Rami ad basin, incurvato-ascendentes: ramuli villosi, subinervi. Folia
simplicia, ^{parva} elliptica, utrinque acuta, apice attenuata, supra glabra, 3 emi pollicaria.
Pedunculi superne, breves subracemosi. Calycis solitarii vel gemini
villosi, uti vexillum et carina extus. Corolla magnitudine Genista huius
Eura.

appalathoides. 9. Folium lineari canicolato puberulo, lamina
pinnatis tuberculatis pinnatifidis floribus axilla-
ribus. Ca. Mark.
Habitat Tunceti.

non eadem cum p. 10.

~~Spicatum Lygost. hirsutum folus ovato-oblongis acuminatis, racemo spicato
terminali, corollis hirsutis La Mart. T. Enc. p. 286.
an Barteria hirsuta Jacq. obj. 2. t. 32. 28 Sufficini hirsuta Plant
amer. p. 4.
Habitat in Cambois~~

Descriptio sive inter Americanam an Prodelethia
~~non ad~~

f. canariensis G. foliis ternatis utrinque pubescentibus, ramis angulatis Lin. P. V. p. 648.

Cyrtopunt. Clus. hist. 1. p. 94.

Cyrtopunt. minoribus foliis, ramulis ternellis villosis Bauh. pin. 390.

β. Cyrtopunt. canariensis sempervirens et incanus Comm. hort. 2. p. 103. t. 52

Cyrtopunt. canariensis microphyllis angustifolius prostratus incanus Plukenet alm. 120. t. 277. fig. 6.

Habitat in Hispania, Canariis.

Rami, uti folia et calycis villosi, sulcati, teretes, ramuli rateres floriferi. Folia ^{parvis petiolatis} ternata, ternata: foliola oblonga parva mucronata basi acuta. Flores ex apice ramulorum uniter squae.

forte Cyrtopunt. lusitanicus foliis rotundioribus Gussley sic: lob. Mus obtusifolium multum
foliola parva, uti rami villosi - Racemi terminaliter 2-5 flori

culta

Clus. Syn. non potius ad candidianam pertinet? ^{Canariensis} limitis inter hanc et cand. vix sufficiens

2 candidans G. foliis ternatis subtus villosis, pedunculis lateralibus subquinque flori
foliatis, Leguminibus hirsutis Len. N. pag. 685 + Am. Acad. 4. p. 284.

Cytisus sylvestris candidans Cosalp. plant. 113.

Cytisus monspeliensis, medicis folio, siliquis dense congestis et villosis
Tournef. G. N. 4. 640.

Habitat in Italia Monspeli

similis Cananensi at foliola majora ovalia subtus pubescentia
utrinque acuta ramuli laterales breves. Calycis trifidi
folia floralia perolata vix minor.

est genista foliolas majoribus non caducantibus, ramis angulatis, villosis, vix
specimen sic: Lyn. Tournef. in herb. Vaucl.

~~an specimen herb. Vaucl.~~

3
4 *Triquetra* *g. folio ternatis*: summis simplicibus, ramis triquetris proceris
bentibus Hort. L. Herb. fr. n. tab. 80.

Habitat in Corsica

Rami e laevis ^{negati alio} ^{duobus} ^{hinc} ^{ad inferum}

angusti triquetris uti ramuli (ramuli
parvi rudes villosi pilosi, exduo pilis, tuberculum compressum oblongum
sub sinu folio inter alas. Folia subsessilia subpetiolo
oblonga cuneata, pilosa, unguiculata mucronata. Stom in
racemo brevi ad apicem ramulorum. Calyx villosus: bractea
setacea ad basi singuli pedicelli

23
dulta

an idem cum *spatio angulato* ?

4 *Linifolia* G foliis ternatis. Fesplibus linearibus subtus serie eio. Lin Spic. pl.

pag 997.

Cypripus argenteus *linifolius*? in *Jelancum* *foetidium* Tournef. 9. R. H. 648.

Habitat in oriente et Hispania,

Rami e lineis decurrentibus fuscato angulati, tuberculati e capis
foliorum ^{foliis confectis} ~~unop~~ ramuli foliosi. Soliola ternata angustissima
dorso e marginibus revolutis folio exarati, olleatana aqua
lea. Racemi ternales. Squamina villosa.

Spontanea

4 Sagittalis G. ramis anisipetibus membranaceis articulatis foliis ^{oblongis} ovato-lanceolatis
Linn. H. Mill. c. 7. 259. Fey. 2. Faicu: fl. dustr. 3. 7. 209.

Chamogeneta sagittalis pannonica Com. hist. 7. 13.

Chamo-geneta sagittalis Bauh. pin. 395.

Geneta herbacea f. Chamo-partium Bauh. hist. 1. p. 393.

Habitat in Germania, Gallis arenosis sterilibus &

Caules decumbentes rami e membrana utrinque decumbent anisipetibus, glabri sparsim frequentes. Folia remota sessilia oblonga villosa obtusapicula flores terminales subracemosi calycis uti pedicelli villosi. Corolla glabra, tractea setacea ad basin pedicellorum.

6
4 *tridentata* G. ramis triquetris membranaceis subarticulatis ^{apophyllis rotatis} foliis tricapi

Datis Lin. Spec. pl. p. 998

Chama-genista peregrina Palest. hist. 177.

Chama-genista caule foliato Bauh. jun. 396.

13. *genista fruticosa* Lusitana angustifolia Tournef. 4. R. 4. 646.

Habitat in Lusitania & sythotome ^{dupli}

Rami glabri, utroque ala decurrente basi respis angustata, super

ne in dentem utroque desinens, uti folia, margine scabra, proter

dent inter laterales ad singulum articulum ab altero latere

al altero latere linea a deate intermedio secundi articuli per

parium inferiorem ad basin usque decurrente, scabra. Folia

nulla ^{si pigniter}. Pedunculi laterales ad articulos alterni et terminales

foliati angulati rudimenti ramulorum ad latera infera qui

est pedicelli circiter quinque pedicelli uti calycis vestellum

et carina extus, Legumen velloso sericeum

herb
mus.

front

Erasmia D.

humifusa G. foliis lanceolatis ciliatis, ramis prostratis striatis vellopi

den. H. p. 645. Jacq. coll. 2. p. 169

geneta orientalis minima humifusa, foliis subrotundis ad oras pilosis

Fournes corol. 44.

Habitat in oriente.

Tinctoria g. foliis lanceolatis glabris, ramis squalibus Verticibus erectis

Lin. 65

Genista Tinctoria vulgaris Clus. hist. 1. p. 101.

Genista tinctoria germanica Bauh. pin. p. 395.

Habitat in Germania, Anglia &

Rami Vertices fructi glabri. Folia sesipila alterna distantia,
lineari lanceolata utraque glabra mucronata, nervosa
pelticaria. Flores ad apicem ramorum sesipili axillares.
Solitarii subsessile. Calyx uti corolla glabra.

Tinctoria g. foliis lanceolatis, ramis Verticibus, ramis foliosis
utraque glabris sesipilibus nervosis
fructu sulcato.

Genista tinctoria latifolia Lucensis G. Bauh. 1. p.

herb. mu.

Differt foliis latius obtusis

varietas forte ex Italia foliis inferioribus parvis subovatis, superioribus
oblongis, humilis villosa

Culta Genista tinctoria luntanica maxima Tournef. G. v. h.
Folia subtus villosa uti calyx et canna. Caulis virgatus folia linearia

Sibirica G. foliis lanceolatis glabris, ramis aequalibus verticibus erectis Lin Mart.
571. x. V Jacq. hort. 2. 8. 190.

Habitat in Sibiria

Habitus omnino *Yunibond* ut difficile distinguitur, folia magis distantia, angustiora. Flores remotiores.

Sibirica G. foliis linear-lanceolatis, ^{enerviis} ramis verticibus aequalibus, racemis foliis supraculatis

12 Cineraria G.

ramis teretibus striatis folisque trilobis nervosis, racemis foliatis

Habitat

Chumather

Sociis genista hirtoris ad rami, prostratis perenne, foliis calycibus
et illis subcanescentibus

Cultra

an humifusa

Senecio Genista foliis lanceolatis subtus feniis villosis, ramis teretibus, striatis
erectis; racemis paucifloris secundis, bracteis calycis longioribus Saigu.
coll. 2. pag. 67.

Habitatio fessuris rupium calcarearum ut montibus inter Segestum &
Tolia angusta lanceolata supra glabra. Flores in racemis terminantibus
libris paucis & subsessilibus erectis, bracteis lanceolatis calycis longioribus.
Petalis fereis. Corolla flavo aurantiaca setillum uti canna
ceteris feniis. Legumen oblongum subcylindricum fuscum villosum
uniculaceo breviter 4-5-6 spermin Saigu.

flonda g. foliis lanceolatis ^{subtus subsericeis} sericeis, ramis striatis verticibus, racemis secundis

Lin. S.V.

genista tinctoria hispanica Clus. hist. 1. p. 101.

genista tinctoria frutescens; foliis incanis Bauh. pin. 395.

Habitat in Hispania

Rami sparsi glabri tuberculum sub ramulis a caepe foliorum.
Solia breviter petiolata mucronata pollicaria distantia
subtus magis nitentia. Racemi terminales erecti. Calyx
et cilia viliis minutis

Taxus g. tinctoria

flonda g. foliis lanceolatis ^{subpetiolatis} subsericeis, ramis striatis verticibus,
racemis aphyllis secundis

genista tinctoria lusitana a Tournef.

Saxif. g. tinctoria. Rami striati, tuberculi, serrati. Solia lineari-lanceolata
contuscula qua latis villis, semipollicaria, enervia subarenia. Racemi ter-
minales, floris alterni g. tinctoria sub mus.

montana Saxif. tinctoria. Solia in tinctoria acutiora et subtriplinaria

10 pulosa *G. foliis* ^{oblongis rotatis} canaliculatis obtusis, caule tuberculato decumbente Linn. l. v
p Jacq. fl. austr. 3. p. 200.

Chama genista prima Clus. hist. 1. p. 103.

Genista ramosa, foliis hypsenis Bauh. pin. 395.

Chama-genista foliis geniste vulgaris Bauh. pin. 395.

Chama-genista montana hispida Bauh. pin. 396.

Habitat in Pannonia, G. Narbonensi; Germania &

Rami striato angulati glabri sparsi & capsae foliorum tuberculati. Folia
oblonga brevissime petiolata subtus vix villosa; semunquiculana
mutronata, tenella corduplicata interdum 2-3 ex eodem tuberculo
flori ex axilli supremi breviter pedunculati, Calycis; uti & ex illum
ad carina extus; villi subnatis paucis adpressi
genista pannonica humilior Tournef. Inst. r. h.
villosior quam *dancia*

1. *Humifusa* Genista foliis lanceolatis ciliatis, ramis prostratis striatis villosis L. S. V.
puz. 645. Gaigu. Coll. 2. p. 169

Genista orientalis minima humifusa, foliis subrotundis ad oras pilosis Tour-
nef. Cond. 44.

Habitat in Oriente. 7

variat foliis latioribus et angustioribus

herb.
mufat
7usl

facies gen. *Humifusa* spontanea. Rami striato, angulati, glabri, ramuli
rari pilosi. Folia unguiculata, sessilibus acutiuscula, glabris excepto mar-
gine. Racemi terminales. 7. 8 flori. Siliqua subglobosa calyce. Calyx pilosus.

Deversam in herb. Flux. un. eodem hunc. Tournef.

Sordidulus humilis. Caulis glaber. Rami sparsi, distichis, rugidi, teretes, sub
striati, un. an. ramuli senescentes spumosi. Folia subovata acuta, un. an.
tomentosa magnitud. Thymi citri odor.

glabra.
12 Anglica g. spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus foliis lanceolatis
lin. s. v. fl. Dan. t. 614.

Genistella Dod. pempt. 670

Genistella aculeata Lobel. ic. 2. t. 93.

Genista major asphaltoides Bauh. prod. 157. p. 395.

Habitat in Anglia ericetis humidiusculis ^{capis foliorum tuberculatis} & tuberculatis.

Rami sparsi teretes, ramuli inferiores spinescentes pollicares. Folia
sessilia in ramulis conferta, imbricata, craspipula avenia, flores ad
apices ramorum axillares

anglica. g. glabra, ramuli spinescentibus foliis, floriferis inermibus foliis
ovatis

Plukm. 454. 3.

ultra

16 germanica G. spinis compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis

Len. S. V.

Genista spinosa minor germanica Bault. per. 395.

Habitat in Germania

ab insequente differt modo spinis simpliciter ramosis in axillis
foliorum ramulorum parvum simpliciter; ceterum ramis striatis
pelosi uti folia. folia parum latiora et longiora quam in hespa
nia a nobis minus ramis pelosa

germanica G. spinis ternatis foliis lanceolatis

Spontanea

Differentia melior, inter hanc et hespanicam: quo rando

13 ¹⁷ ~~14~~ hispida Genista spinis ternatis decussatis, foliis simplicibus lanceolatis, spicis terni-
natis hispidis

Genista Spartium lusitanicum, lanuginosum, aculeis tridentatis; longiori-
bus mucronatis Tournef. Inst. R. H. pag. 645
legi in Castilia seturi

Stem spinosissimus, rigidus. Rami teretes, ^{interne apiculati} supremi hispidissimi, ^{in parte} ~~in parte~~
folia lanceolata, sessilia, hispida, semiunguiculata.

Spica ex axillis, alternis patentissimis, ^{caulis} decussatis, pollicares, basi
apice flavescens, glabra, subtilissima striata, basi utraque spina
brevior horizontalis.

Spica ex apice ramorum, pollicaris, umbellata, hispidissima.

Bractea ternis ad basin floris, ^{calyce brevioris} pilosa, laterales lineares, intermedia lanceolata
acuminata.

Calyx pilosus: lobis subulatis

Corolla sex flava. Vexillum pubes pilosum

Diversa non videtur Genista Spartium lanuginosum longis imis et
ternis spinis aculeis tridentatis mucronatis Tournef. v. l.

18 hispanica G. pini decompositis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus
pelosi Linn. V. Jacq. Coll. 2. p. 165.

Genistella montebelica fruticosa Bauh. prod. 157.

Genista fruticosa minor hispanica villosissima Bauh. pin. 395.

Genistella monti ventosi fruticosa. Bauh. hist. 1. p. 400 p. 400

Habitat in Hispania, Gal. Narbonensi. †

Strutivulus ramosissimus: ramulis ^{interiores} striato angulatis, aliis ^{superiores} aphylli

subramis ^{feris} floriferis ramosissimis variis flexuosis in ramulis spinosis ^{terminis} desinentibus, aliis foliosis, floriferis et cum rudimentis ramulorum
et axillis ^{feris} floriferis glaberrimis spinosis in axillis ^{caulis} subherpatis. Folia
linearia oblonga acuta mucronata seminaequivalana
pelosa. Pedunculi terminaliales herpatis Flores racemosi
pauci Phlyct herpatis

Genistella herbacea seu Chamopadium Bauh. herb. mus

Fruct.

Fructo superiores innocuo

19 *Lupitania genista* caule aphylo, spinis decussatis Lin. S. V. pag. 646
Scopius II. Claf. hist. 1. p. 107. Bauh. hist. 1. p. 403.
genista praetium spinosum minus Bauh. Pin. 394
Habitat in Lusitania, Hispania &

Lupitania caule aphylo spinis decussatis floribus terminalibus.