

Gentiana

xxxx corollis non quinquefidis

41. campestris corollis faucibus barbatis foliis ovatis lanceolatis pedunculis subternis
42. tenella G. corollis faucibus barbatis, caule filiformi, foliis ovatis basi foliatis
pedunculis elongatis unifloris solitariis
43. emarginata G. corollis imberbibus, floribus verticillatis sessilibus, foliis lanceo-
latis ellipticis quinque-nerviis
44. macrophylla G. corollis imberbibus 4. vel quinquefidis sessilibus verticillatis
foliis radicalibus caulem subnudum squaratis
45. ciliata G. corollis ^{imberbibus} marginibus ciliatis faucibus barbatis
46. aunculata G. corollis quadrisfidis quinquefidis que campanulatis villosis
calycinis laciniis alternis cordatis
47. dichotoma G. corollis campanulatis quadrisfidis quinquefidis que faucibus
barbatis caule dichotomo
48. sessilis G. floribus axillaribus, foliis ovatis
49. filiformis G. corollis imberbibus, caule simplici ^{vel} dichotomo filiformi, foliis
subulatis

50. parviflor calycibus obovatis calycis corolla amplioribus, caule filiformi, foliis
oblongis, pedunculis elongatis unifloris

51. heteroclita g. corollis irregularibus, caule dichotomo alato, foliis ovato-peltatis
tundis.

Gentiana vallis Vafedii Tedit Desfont

G. Vergolica Haec quae
visio (sua) Banks
angus (sua) Mack
latratia Jacq
montana Forst
Kond car Louren

angustifolia Vill. varietates
alpina Jent. acicula
minima Vill.
ramosissima Vill. var. castauni

gentiana punctata, purpurea
nannonica et campanulata
a Villarsio varietates esse unam
eademque speciei

India occidentalis

bractea subulata vel lanceolata acuminata.

Calyx quinque partitis laciniis lanceolatis attenuatis margine
membranaceis apice reflexo patulis longitudine corollae

Corollae laciniis lanceolatis

antheris quinque in medio corollae

germen oblongum Stylus 1. Stigma capitatum

India orientalis

bractea lanceolata in acumine non producta

Calyx quadrisfidus laciniis ovatis obtusiusculis corollae duplo

longioribus lanceolatis

antheris linearibus longitudine limbi.

verticillata Gentiana

Trinervis
Dichotome *G.* caule dichotomo diffuso, foliis ovatis, pedunculis atillari-
bus. Vermenabibusque.

Habitat in Insula Niobonisi

Caulis ramifera; rami dichotomi glabris. Tetragonis e lineis
quatuor decumbentibus. Venis.

Folia sessilia opposita remota pollicaria in rami angu-
licularia, glaberrima supra parum acuminata, trin-
eris, arena integerrima.

Pedunculi atillari, folitari ^{foliiformes} folio longiori
terminales gemini. Sape bis dichotome divisi interdum
alter uniflorus alter biflorus folium minus spatium
a basi pedicellorum extendit.

Calyx tubulosus quadridentatus longitudo inaequali corollae.
Corolla infundibuliformis parvi. Gent. Centauni, Tubus membra

nascens; laciniis limbi lanceolato purpureo. *perisperm*
^{ante expleationem contorta}
Anthera quatuor in faucibus tubi

germen oblongum stylus unicus, stigma clavatum
Capsula longitudine calycis bivalvis

an Gentiana an Phlora?

Stans Gentiana caule fruticoso scandente, corollis campanulatis سفیدی,
paniculis elongatis pendulis Lour. fl. cochinch. pag. 171.
Habitata China et Cochinchina. 5

Caulis magnus, teres, per axes scandens. Folia ovata lanceolata
integerrima, glabra, cinerea, opposita. Flores in paniculis longis
lateralibus. Calyx squedentatus. Corolla extus variegata albo puncta
et intus dense pilosa purpurea. Locus obtus سفیدus brevis
Capsula subrotunda biculata

non vidi

albaflora Gentiana corollae campanulatae squesidii laciniatum punctatis. Folis
oblongo-lanceolatis La Mark T.E. pag 483
Gentiana punctata varietas Pall. N. 3. tab. 6. fig. 2.
Habitat in Siberia

non vidi

~~melampyroides~~ *Chenopium* foliis lanceolatis sessilibus, cataribus decumbentibus; ca-
lyce tubo breviora La Mart. T. E. pag 479

~~Habitat in C. b. p. c.~~

~~Limbis corollae tubo longior~~

Quinquifolia Gentiana corollis infundibuliformibus, caule acutangulo, foliis ovatis am-
plexicaulis Lin. Spec. pag. 333. * L. V. p. 269

Habitat in Pennsylvania

Planta magnitudine et statura aphylla. Caulis indivisus, tetragonus angulis mem-
branaceis. Folia ovata, sessilia, amplexicaulia, trinervia, acuta. Pedunculi
oppositi apice ferentes. Flores quinque subpedicellatos. Calycis brevissimi an-
gusti. Corolla infundibuliformis subcincta: limbo parvo, faucibus peris-
taen. Spec. L. C.

Gentiane

Gentiana Centaureum minus cretium, flore oblongo e flavo nonnihil viridescen-
te Tournef. Cor. pag
Habitat in Creta dedit Lujien

~~Ciliata Melast. petioli barbato, foliis ovatis aut lanceolatis minute serrula-
tis et ciliatis nervis laniatis, racemo apice 2-3 fido, floribus bifloratis
sessilibus. Act. Soc. h. n. Par. 1. pag. 109.
Habitat in America merid.~~

merid.

mantima g. styli geminis caule dichotomo paucifloro Lin Mart. 55. 2
P. V. p. 269

Pentaunium luteum prostratum non perfoliatum Bauh. pin. 270.

Pentaunium luteum rorun Column. ceph. 2. p. 70. Tab. 77.

Pentaunium minus luteum latifolium et angustifolium non
perfoliatum Boiss. mus. 2. p. 7. 76. Barr. ci. 460. 469.

Habitat in Italia et Gallia australi maritima C

cauli erecto palmari tetragonis simplex superne in ramos ali
quos simplicibus ^{dichotomis} diversis. folia sessilia ovato lanceolata tri
nervia vix pollicana inferiora octopora. flores ex dichot
omia et apice ramorum subsessili majores quam in speciat
calyx pentagonis interstitiis membranaceis laciniis corolla
ovata acuta. anthera spurales

floribus terminalibus inque dichotomia subsessilibus.
styli geminis ^{vel} caule dichotomo paucifloro foliis oblongis calycibus
5 angulis

exacoides 9 corollis hypocrateriformibus, calycibus membranaceo connatis, cau-
le dichotomo foliis cordatis Lin LV

Pentaunium luteum flore amplo, capsula quatuor alis membranaceis
Plukh. alm. 200. t. 275. fig. 4. Seb. mus. 1. t. 22. fig. 1.

Pentaunium perspicuum, florum calycis membranaceo ventricoso Burn
af. 200. t. 74. fig. 5.

Habitat ad Cap. b. p. p. C

^{tetragonis}
Caulis digitatus vel parum ultra erectus superne dichotome
divisus folia semicircularia acuta vix nervosa
fere unguiculata duo vel tria parum in caule. Calycis
cordato pentagonis laciniis attenuatis semi cordatis. Corolla
tubus calycis longior. laciniis linearibus oblongis

spicata 9 florum alternis sessilibus Lin. l. V

Pentstemon minus album Tabern. ic. 700

Pentstemon minus spicatum album Bauh pin 270 prod. 130 tab 130

Bauh. hist. 3. p. 353

β. Pentstemon minus spicatum, flore rubello Tournef. G. h. 4. 122.

Habitat in Luganeis & Montpellier, & talia pratis humidis umbratis

Caulis erectus glaber lineis quatuor occurrentibus superne
ramosis tam dichotomis quam pinnatis. Folia lanceolata sessilibus
pelticaria vix nervosa, flores ^{et flor.} sessiles alterni ^{minus} dicto
folia duo subulata calyce breviora ad basin singuli, Calycis
laciniis subulata cinnata interstitiis membranaceis corollae
laciniis attenuatis. Stylis longitudine corollae stigma capi-
tatum

Caule dichotomo
lateralibus 6

Stylis unius foliis lanceolatis

Alopecuroides q corollis acutisimis seplibus secundis confertisimis, foliis oblongo lan-
ceolatis univerris, inferioribus subpinnatis
gentiana *alopeuroides* corollis quinquefidis acutisimis infundibuli-
formibus, floribus seplibus secundis confertisimis subpinnatis ha-
Mark. Encycl.

Patna ignota

Caulis 3-4 pollicaris ramis primis dichotomis rigidis hexagonis, flo-
res numerosi ha Mark

non vidi prope speciatam coll.

linanifolia G. involucri sedis infundibuliformibus, stylo longo simpliciter, foliis linearibus uninerviis tamquam

Centaureum

435.436.

Habitat in Gallia

Tote videlicet varietas G. centaurei

Barret. n. 423

peruviana

G. caule dichotomo floribus solitariis terminalibus, foliis lanceolatis uninerviis

Pentaenium minus per peruvianum patulum Tenelle penw. + p. 247.

Tab. 33

gentiana peruviana corollis quinquefidis infundibuliformibus
caule dichotomo, foliis ovato lanceolatis uninerviis La Martini

eriget

Habitat in Chili

filiis G. Centaurii

nope mantem. colloi

Scilloides Gentiana caule unifloro prostrato ramoso, foliis obovatis obtusis trinerviis, corollae infundibuliformibus quinquefidis, bracteis binis Lin. Suppl. p. 175 * S. V. p. 269

Habitat in Anfulis Ceresii

Planta pedalis, tenera, glaberrima: ramis paucissimis. Folia opposita, subretolata, parva: superiora remotiora. Pedunculus longus, nudus, terminalis, uniflorus. Bractea duo infra florem, opposita, subulata, erecta. Calyx linearis. Tubus infundibuliformis, calyce longior. Limbus quinquefidus, planus, imberbis, luteus Lin. L. c.

non vidi ^{ni in herb. Brandpi} maxime affinis Centauro

viscosa Gentiana corollis monogyna, paniculis trichotomis, bracteis perfoliatis, foliis
oblongis trinerviis Hort. Kew. 1. p. 321.
Habitat in Canariis 4

non vidi

umbellata Liana floribus umbellatis, foliis lanceolatis lobatis Lin-Mant.
p. 269.

Habitat in Cap. b. Xuei

Borbonia longata

267 ~~Lychnis folia Gandiana floribus verticillatis, foliis linearibus lanceolatis, calycibus longis~~
~~India orientalis et Arabia a Fortho lae lecta~~

+ ~~Gentiana verticillata: floribus quinque fidis verticillatis orbis Lin.~~

Suppl. pag. 174. Syst. Veg. pag. 269. Descriptio non vero differentia.
Gentiana verticillata Retz. obs. Bot. 2. pag. 15

+ Pentstemon angustifolium, floribus ex alis sessilibus Burm. afr.: pag. 206. tab. 74. fig. 3.

Habitat in India Orientali, in Arabia legitur Fortho lae

Stem lignosus Pauli palmari, vel Spithamei, terrestris, glaber, ramosus, rarius
simplex. Rami oppositi, tetragoni, angulis acutis.
Folia subsessilia, utrinque acuta, longa, trinervia, pollicaria, articulis
caulinis parum longiora.
Flores sessiles, plerumque in omnibus axillis, plerumque octo.

4 Capsula oblonga Calycis quinque partiti: laciniis ovatis, acutis, solum lineare ad basin sin-
guli calycis
Corolla fulva, facie g. centauria modo minoris; laciniis acutis.

Anthera sagittata.

Stylus simplex. Stigma capitatum.

4 Capsula oblonga laciniis em partibus con tristis separatis
laciniis em partibus con tristis separatis

Verticillata Gentiana Linnaei

Americana cum Indis orientalis a Linneo conjungitur, con-
veniunt certe in plurimis, differunt vero in nonnullis et quavis
limites egre definiuntur specie tamen forte differunt. Utrum
que igitur descriptionem hinc subjungo utriusque ad iudicium potest
quibus notis conveniunt vel differunt.

#

Diffusa Gentiana caule ramoso dichotomo divaricato, foliis ovato-obovato
oblongis, pedunculis capillaribus subunifloris.

Habitat in India Orientali

Caulis herbaceus, e lincis decurrentibus tetragonis; glaber. Rami
filiiformes, dichotomi, divaricati.

Folia sessilia, opposita, ovato-oblonga, pollicaria; superiora subcordata,
via unguicularia; omnia glaberrima, mucrone brevi terminata,

Trinervia.

Capitula ~~terminalia~~ ^{terminalia} terminales ramulorum, plerumque gemini, capillares,
Corolla ~~longior~~ ^{longior} biflorus, albes brevior uniflorus. Folium utrinque ad basin
pedunculorum, setaceum.

Calyx tubulosus, glaber

Corolla fere Gent. Centauri

Sarcopenthes
pubescens

Q. foliis ovatis pubescentibus petiolatis pedunculis terminalibus
latis subdichotomis caule suffruticosa ramis subpubescentibus
Habitat in madagascaria Comorense

Caulis teres pubescens dichotomus. Folia unguiculata obtusa.
Pedunculi terminales terni laterales biflori intermedii uniflo-
ri

aphylla Gentiana Corolla hypocrateriformi, caule aphylo Lin. L. V. pag. 269. Jacq. Amer.
VI. hist. t. 60. fig. 2.

Habitat in America

Planta minima filiformis sive ramosa Lin.

Caulis quadriflorus, nudi uniflori, stipulis oppositi remotis ad genicula

Flor. terminali solita sive pallidus erectus Jacq.

Saepe parasitica truncorum patientum in umbrosis ad B. Hard

amarella *G. corollis hypocrateriformibus fauce barbata* L. V

Fl. Dan. 7. 320.

~~Opfantha Benealm. spec. 71.~~

~~Gentiana autumnalis ramosa~~ Bauh. pin. 100.

~~Gentiana pratensis, flore lanuginosa~~ Bauh. pin. 100.

Habitat in Europa pratis ^{pub}

Caulis erectus palmatis ramosus inferne teres superne tetrago-
nus. Folii radicalia lineata, caulium remota ovato-lan-
ceolata inferna obtusiuscula. pedunculis axillaribus plerum-
que ternis lacinis calycino lineari.

Gentiana pratensis flore lanuginosa Cap. Bauh. pin. 100. ^{la Mark et herb}

^{Vallart}
Gentiana octava ^{sive fupax} ^{Blusi} ^{herb} foliis ovato-lanceolatis lacinis
calycinis linearibus lanceolatis pedunculis lateralibus ramis
inter nodis brevioribus

Caulis superne ramosus

Campestris 9 corollis faucibus barbatis Lin. l. V

Fl. Dan. 367

Gentianella acaulis bellidis folio Boic. mus. 144. T. 101

Crythalia Rencaln. spec. 72.

gentiana alpina verna minor Bauh. pin. 100

Gentiana purpurea minima Column. Epiph. 1. p. 223. T. 221. Barr
4c. 97. fig. 2.

Habitat in Europa partibus O

Caulis ^{palustris} digitalis ^{paucis} et ter glaber tetragonus superne subramosus
rami oppositi. Folia radicalia cuneata et caulina basi connata
ovato-lanceolata trinervi vix pedunculata terminalia ramorum
et caulis plerumque terni intermedium longior. Calycis profunde
fissi laciniis duobus parum lobatis ovatis acutis

pedunculis lateralibus foliis lanceolatis
laciniis calycinis duobus ovatis

Fl. Dan. 310. var. rubra
gentianella fugax autumnalis et atior Cantuari
minoris folio Rapi Synops. 2ed. 4. fusca

Tenella J. Tenella corollis quadrifidis faucibus barbatis, caule filiformi tetra-
gono, foliis ovatis basi obtusis Pet. 2. prodr. fl. p. n. 204
gentianella fugax minor Lamour. Traub. hist. 3. p. 527. non nomen
gentiana nana All. fl. ped. n. 360 et Auct. pag. 7.

~~Saxifraga carinthiaca~~ gentiana nana

Guaiqu. misc. 1. p. 72. Tab. 40. fig. 3.

gentiana bractyphylla foliis lanceolatis subtundis brevissimis
corolla infundibuliformi Vill. fl. Delp. 12. p. 520.

gentianella fugax stricta stellata corolla minor Barr. u. 103.
n. 2.

gentiana corollis quadrifidis imberbibus, pedunculis tetragonis
longis terminalibus in caule dichotomo subramosis, foliis
ovatis Fl. Dan. tab. 310.

gentiana 71. pro
gentiana fugax
v. 2. l. hist. 1. p. 315
gentiana floribus solitariis, longissime petiolatis, faucibus
fimbriatis Hall. hist. n. 652.

Habitat in alpebus Europae

pedunculis
terminalibus

laciniis calycis
cuneatis

Caule simplicissimo statim a basi ramorum ramis adscenden-
tibus filiformibus caule alio. Solia radicea unca
ta paucis caulibus duplo majora, caulibus ut semper unguicula
na obtusa. Calycis laciniis ovatis laciniis corolla hypocrateri-
formis laciniis linearibus lanceolatis acutiusculis

digitalis

nana g. crotta faucis barbata, foliis caulinis ovatis F.V. p. 267 - Gaigu. Musciell. 1.

N. 10-fy. 3.

Habitat. ~~gentiana~~ ~~gentiana~~

~~gentiana~~

nigricans γ corollis quadrisfidis cymosis infundibuliformibus; limbo subquadrato
foliis linearibus angustissimis Calman. Edc.

Plantula foliis angustissimis, cauliculis ramosis, flosculis in summitate
plumbis in pedicellis privatis minimis Raj. hist. 3. pag. 253. no 51.

~~Plantula~~

Caulis 6 pollicaris apice dichotomo, Folia fere capellana inferiora
pollicana. Flores numerosissimi apice cymosif. Exsiccatione
nigra

Secund. Specimen herb. Fusch. descripsi sub nomine parvifloro est
vero species Aristoteli forte vanae conferat. cum longifolia garten

cruciata 9 corollis imbricatis, floribus verticillatis sessilibus Lin.
man. 349. Gaep. fl. austr. 4. 372

Tretorbaria Penealm. p. 74. 73

Gentiana minor Cam. epit. 417.

Gentiana cruciata Bauh. pin. 100

Habitat in Pannonia, Apenninorum, Helvetia montosis apricis

ad vasa in senilibus ^{erectis} pedalis

Caulis teris decumbens glaber. Folia basi connata parum

altenuata bi s. tripollicaria, frequentia verticilli

super ⁵⁻² multiflora, inferiores pauciores. Calyx brevis
truncatus peristylatus dentibus sive ^{vel 1/2} fimbriatis

Calyx in praetho modum interdum laciniatus observante

Hallero

1
in spongia nervis

foliis lanceolatis ellipticis

G. macrophylla floribus quinquefidis sepibus verticillatis, foliis radicalibus caulem
subnudum aequantibus fl. Roef. v. 1. p. 2. p. 216. tab. 96.
gentiana floribus confertis terminaliteribus, corollis quadripidis et quinquefidis
lanceolatis, caule procurrente media parte nudo Gmel. fl. pt. 4. p. 104. ~~tab. 52~~ Tab. 52.

et abstat in omni Sibiriā
affinis purpurea et undata

folia radicalia saepe spithamea, caule longiora, lato lanceolata, pollice
latiori 5 nerva, basi vaginantis. Caulis ad latum fasciculi florum natus
declinato ascendens, subnudus, uno alterove par. foliorum, proster flori
in summo caule. Flores in summo caule ad duo paria foliorum verticilla
to aggregati, sepibus. Calyx parvus membranaceus, inaequaliter quadriden
tarius. Corolla parva tubulosa, livido-pallens, limbo obsoletius fere
lanceolis, quadripido vel spido, laciniis brevissimis pubescentis. Capsula
persistente corolla major, semina parva oblonga fusca grisea. Palle

nupella

of corollis sub-clausis quadrifidis, laciniis calycinis lineariibus, caule
ramosissimo dichotomo filiformi La Mart. Encycl
Centaureum palustre minimum flore inoperto Vaill. bot. tab. 166. tab

6. fig. 2.

Habitat Panji

varietas folieg. Centaurei

Centaureum minimum purpureum ramosum Magnol. Monsp
herb. Guo.

Ciliata G. corollis margine ciliatis
4aequ. fl. austr. 2. 7. 113.

gentiana conlea onis pilosifolia Bauh. pin 100

Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad latera pilosifolia
Bauh. pin. 100.

Gentianella conlea limbrata angustifolia autumnalis Column
eiphr. 1 p 222 7. 221. 43. 1.

et onis B. corollis serratis

varietates

Habitatio Helvetia, Italia montibus B. in G. Lendia V. in Canada.
caulis ascendens palmarum tener simplicis spinosus. ^{cineris decurrentibus tetragonis unguibus} Solia remo
ta 3-4 panum in caule linearia pollicaria. laciniis calycis
subulatis ^{aequalibus} corolla brevior. laciniis corollae lanceolatae
14. Differt foliis inferioribus frequentioribus caule basi ramosis.
fere nudis. laciniis calycis ^{duobus lateribus} margine membranaceis corollis
minoribus serratis
V. omnibus partibus major. laciniis duabus late ovatis margine
membranaceis

g. auriculata corollis quadrifidis quinquefidisque campanulatis intus villosis, calycinis laciniis alternis cordatis Tl. Prof. vol. 1. p. 2. pag. 204. Tab. 92. fig. 1.

Habitata locis herbis et paludibus circa mare Ochotsk, per omnem Cham. & Schatcam insulasque versus Japoniam et Americam fiti inque ⁱⁿ America cultus
Caulis subquadrangulus, sub simplex, pedalis vel minor. Folia radicalia minore, ovata, versus basin attenuata. Caulina una pro radicalibus proxima, reliqua longe ab invicem remota opposita, oblonga, quinque nervia, sessilia, superiore subamplexicaulis, magis lanceolata. Color subtus pallidiora interdum violacea. Flores in summo caule interdum parva foliorum quinque longius pedunculati interdum ex alis proximorum foliorum accessorie ramulosis, bis sexiflori pari foliorum instructi. Pedunculi florum subquadranguli. Calyx angulatus infundibuliformis, laciniis duobus alternis latioribus, cordato-rotundatis sub revolutis; laciniis 3 ovato-minores, 2 dilatata. Corolla campanulata tubo albedo, laciniis rotundatis, pallide coenulescentibus; intus basi villosissima. Pal-

4. *Dichotoma corollis campanulatis*. quædam fides quinquefidaque faucibus ciliatis. Caulis *Dichotoma*

pl. Conf. V. 1. p. 2. pag. 221.

Habitat ad fluvium Lena.

affinis aurea. C.

Caulis tenuis, filiformi subflexuosus, 2 dorsalibus subfastigiatus. folia ad omnes *Dichotomias* et in
in pedunculis, ovato-lanceolatis, parva, tenera. Flores terminales, breviores quam in *rupe*.
Calyx angulato-campanulatus, usque ad basin quinquefidus, laciniis equalibus acutis.
Corolla purpurea fere, calyce paulo longior, laciniis equalibus oblongis, faucibus sin-
tuam internis decidentibus et patulis. C. 11.

Lesplis Gentiana floribus acaulibus, foliis ovatis Lin. S. V. pag. 270
Gentianoides flae. lacteo ~~Scrub~~ Penn 3. p. 20. t. 14.
Habitat in Chili

non vidi faciei Bss mayellanae

feliformis \varnothing corollis imbricatis, caule dichotomo *feliformi* Lin. V
Flor. dan. 7. 324.

Pentaurum pusillum luteum G. Bauh. 270.

Pentaurum palustre luteum minimum Baill. Bot. Par. 32.

Tab. 6. fig. 3.

Habitat in Gallia \odot

Caules digitales simplicis fœmus vel ramos uno vel altero
subdichotomo - folia lineana angustissima remota, semper
cylindrica 2. 6 in caule. rami et caulis in pedunculum
semiflorum desinent. Calycis lacini ovata acuta Corolla
nova

feliformi
simplicis vel subramoso, foliis subulatis

^{superne}
parviflora
tuberosa G. Calycibus obovatis corollis calycis angustioribus caule filiformi
foliis oblongis pedunculis elongatis unifloris

Habitat in Lima:

Racis gent. aquatica. caulis filiformis erectus digitali basi in ramos
duos divisi superne bi- & tri-ramosus ramis simplicibus unifloris
aphyllis erectis. folia remota 4-6 in caule obfusa semper angui-
cularia s. pedunculi longitudine planta. Calyx obovatus superum
versus sensim dilatatus truncatus quadridentatus. Denti tres acuti
semper angui-culari, corolla calycis dimidio longior calycis multo
angustior

rad. quadrangulari corollis quadrifidi tubo ventricoso luto, calycis quadrangulari
truncato et quadridentato La Mart. enyel.

Heteroclitia g. corollis irregularibus, caule bracteato Lin. Mant. 560x L.V. p. 270

Habitat in Malabano agris O

Lacis g. Pentauri Calili erectus palmanis vel pithamos
quadrangulans a foliis decurrentibus alato quadrangula
ris dichotome ramis bracteatus. Folia opposita peltata
remota, ~~vix~~ semunquiculana ovata ^{subrotunda} glaberrima obtusa
ve nervosa, obtusa sub rami supremi subulata basi
fima. flores in dichotomia et apice ramorum solitarii
lesiles. Calyx tubulosus semunquiculans angulatus dentibus
quatuor subulatis. limbus bipartitus laciniis bipartitis
et superionibus erectis, deflexis 2. antheram majorem
inferne includentibus. filamentum 4 tum sub faucibus
insertum.

alato foliis ovatis subrotundis