

Geoffroya

1. spinosa G. spinosa, foliis oblongis obtusis
2. inermis G. inermis: foliolo lanceolato-elliptico

redusa Geoffraya

Habitat in America Richard herb. La Mark.

Inermis. Rami teretes, glabri. Folia petiolata, duo suprema opposita, reliqua al-  
terna, pinnata cum impari, quadrijugis. Foliola petiolata, sessilia; opposita,  
sesquipollicaria, internodia minor, oblonga, emarginata, supra nitida, obli-  
que <sup>sub</sup>lineata, subtus venisime villosa, venosa, subcanescentia. Stipulae sessiles  
ad singulum foliolum. Racemi terminales. Pedunculi villosuli. Calyx den-  
tibus ovatis

pubescens Geoffroya pubescens foliis quadripetis cum impari oblon-  
go - ovatis vel obovatis fustis nervis et subalbido pubescentibus  
paniculae floribus fasciculatis Act. f. h. n. P. 1. pag. 111.

Habitat in Am. merid. dicit Rukar

arbor 10-50 pedalis. Panicula pedalis

bracteosa quia scapo et hoc arbore non submergetur

2 *inermis* Geoff. *inermis* folioli lanceolato <sup>elliptici</sup> Sw. prodr. pag. 106

*Geoffraya inermis jamaicensis* Wright in Act. Angl. 1777. vol. 67. p. 572  
-tab. 10.

Habitat in America meridionali et G. et Cambis <sup>petiolate</sup>

Folia pennata cum impari 5 paja. Foliola opposita distan-  
tia integer rima, coria, glaberrima, acuminata bif.

Triplivaria interna breviora. <sup>subvenia</sup> Petiolus puber convexus  
supra canaliculatus: dens setaceus ad singulum petiolum parva

uaguculaser  
com supra gemino ad terminalem <sup>triplo duo lobulato</sup> Racemus compositus  
terminalis erectus patent. foliis parum brevior multi

floris. Pedunculus communis angulatus, Rostales e capu  
foliorum denticulati. Legumen pedicellatum

Andem racemosa ha Martia herb. Guo

1 *Spunofa* Geoff. *Spunofa*, foliis oblongis obtusis Sw. prodr. p. 106

umari Manigr. Bras. 121.

geoffroa *Spunofa* Paeyu.

Lin. t. V.

Habitat in Brasilia 5

Stem pennata cum impari 7 paja: folioli glabris integerrimis. Racemi simplices, axillares 3-4 pollicares