

Geranium

Geranium columbinum majus flore minorae coeruleo Razi her ✓
Ded. & Insper

pelopem G. foliis quadratis subovalibus pelopis enerviis, semine basi pelopis
Hort. Kew. 1. p. 145

rigidum G. foliis verticillatis linearibus supra scabri, paniculis divaricatis,
caule erecto tereti pubescente scabripubulo Lin. Bot. Kew. 1. p. 144.
Habitat --- 2

villosa G. internodiis caulinis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis serratis villosis, cor-
olla galeari crenato incisâ Smith. fl. angl. 2. pag. 624.

Geranium punctatum. foliis radicalibus; floribus umbellatis diandris; petalis
duobus & superioribus. *Paucifloris*; *Sylvestris* *quatuor* Andr. *reposit.* 60.
Habitat in Cap. 6. & p. 2

Geranium elegans; pedunculis multifloris; calycibus monophyllis, foliis orbiculatis, serratis rigidis, petiolis longissimis; caule herbaceo Andr. sepos. t. 2 p.

Habitat in Cap. b. speci

Caulis herbaceus

Geranium fragile; foliis carnosis pinnatis; caulis fruticosus, ramosus; pediculis
linariibus pedunculis erectis Andra rexos. t. 37
Habitat in Cap. b. p. p. 24

Pelargonium similem ni fallor alio loco deperitum vidi an in 4. rar. p. p.

umbrosum Geranium

Habitat in Hungaria Kitabel

Caulis plures, diffusi, ^{simpliciter, superne} dichotome divisi, pubescentes.

latera luce obversa purpurascencia, subtus viridia. Folia plerimum
radicalia, nulla nisi subramificationibus, ^{quae oppositae petiolatae,}
quinq;peda: laciniis ^{inferioribus obtusis superioribus acutis} trifidis, superne ^{tridentati} dentibus
purpurascensibus, glabra excepto margine. Pediculi e dichoto
mia folio longiore bifido. bract. stipula ovata attenuata
bifida purpurascens - apice viridi villosa. Bractea
quatuor dentata Calycis foliola lanceolata, minus
nata corolla dimidio breviora Petala bifida

~~Index Auctorum~~

Act. ac. nat. cur. Acta physico-medica Academiae Caesareae Naturae Curio-
rum Norimb. 1727-1754. 4to

~~Act. ac. Mogunt. Acta Academiae Electoralis~~

Congifolium Geranium

Nurn 67

Habitat in Pop. b. spec. herb. La Martini

Videt La Martini

a splenioides. Geranium

Habitat herb. Guoj.

villosa canescens. Folia radicalia, petiole lato, pollicaria, pennata: pinnis inciso
serratis. Scapus digitalis. Flores umbellati, 4. Calycis foliola lanceolata
mutica, margine perim membranacea

integrefolia Abroma

Habitat in Tava herb. Fusf.

alterna

Rami tomentosi. Folia petiolata, spithamea vel ultra, cordata, attenuata, integra, integerrima, obsolete venosa, subsque nervia, ad altera utraque glabra. Petioli uniani, pedicelli longiores. Pedunculi oppositifolii, longitudine petioli uniani; pedicelli gemini uniani, pedunculo longiore, inferne articulati. Bracteae 4-5. lanceolatae. Calycis foliola semipollucaria, ovato-lanceolata, acuta, canescentia. Stipulae lanceolatae.

Geranium

Geranium columbinum orientale etc.:

Habitat in oriente herb. huj.

Folia reniformi subrotunda, 5 que partita: laciniis inciso; lobi lineares obtusa. Calyx villosus: foliola lanceolata, mucronata,
a Columbino Len. Deser.

Geranium.

Geranium orientale, columbinum flore maximo, Aphodali radice Tournef. Corol.
pag 20.

Habitat Constantinopoli herb. Tournef.

Caulen plures, laxi, semipedales, decumbentes. Folia radicalia longe petiolata

habes

Geranium

geranium orientale, moschatum, Alpinii folio Tournef. Cor. pey. 20
Habitat in armenia Tournef. herb.

Radix crassa. Caules plures, palmares. Folia radicalia bipinnata, longitudine
fere caulis: foliola trifida

habes

agardi folium Geranium

Habitat in Cap. b. spici herb. Royenii

Caulis plures; herbacei, simplices, uniani, digitales. Folia petiolata, approximata, pollicaria, lanceolata, obtusa, inaequaliter serrata, avenia, uniana, mollia, obsoleta nervosa. Stipula lanceolata, patentes. Pedunculi longi, uniflori, uniani, superne folioli 40 lanceolati. Calycis foliola lanceolata, uniana, mucronata uti stipula. Pedunculi infra calycem altero latere crassior. Corolla rubicunda, immaculata.

Astragalifolium geranium

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii

Caules plures, palmares. Solia 3 partita. Stipulae subulatae. Pedunculi triflori. Corolla sanguinea. Calycis villosi, lonicolati

lobes

Geranium

Geranium creticum humifusum, foliis subrotundis laciniatis, acris congestis
Tournefort. Cor.

Habitat in Creta herb. Mus.

Caulis sesquipedalis, teretes, striati, ramosi: folia petiolata, opposita, supra
caulis ^{superiora} petiolum ^{superiora} linearia.
Sepalia. Pedunculi axillares, solitarii foliis congestis, triflori

Diffusum Geranium

Habitat in Brasilia herb. Gusf.

Caulis procumbens, diffusus, ramosi, villosi. Folia petiolata, opposita, floralia alterna, quaeque partita, multifida, subrotunda: lacinis linearibus obtusis, semipollicariis, villosis. Stipulae ovatae, attenuatae. Petioli longi, villosi. Pedunculi semipollicares, biflori: pedicelli fructiferi declinati. Calycis foliola ovata mucronata. Flores purpurei. Capsula villosa.

Geranium[?]

Geranium orientale columbinum, flore maximo, aphodali radice Tournef.

Cor-

Habitat in oriente herb. Musf.

Caulis ramosi, pedales, laxi, decumbentes, subvillosi, angulati. Folia petiolata,
floralia subsessilia, omnia opposita. Petala cuneata, integerrima.

triphyllum Geranium

Habitat herb. Rich. 5

Rami filiformes, glabri. Foliole sessilia, glauca, acuta, intermedium
semipollicare, lateralia vix unguiculata, angusta. Stipula brevifera.
Pedunculi uniflori, medio lobulati. Petala purpurea duo parum lon-

giora
an eadem est herb. Royenii

violaceum Geranium

Habitat in Africa australi

Racis herbaceus, debilis, inanis. Folia alterna, longissime petiolata
subrotunda, ^{reticulata, villosa, canescentia} sive fida: lacinae in cuspis pinnatifidae: lobi lanceolati, inae-
quissimi. Stipulae foliaceae. Pedunculi oppositi foliis, uti calyces inaequi
elongati, biflori: pedicelli angustulares. Bractea subulata, quatuor ad octo
pro calycis. Calycis paleola lanceolata

geranium papillum argenteum, heliotropii minoris folio Shaw t.

geranium guttatum caule prostrato; foliis cordatis, sublobatis, cineres argenteis, subtus venosis reticulatis; pedunculis tri aut trifloris, folio longioribus Desfont.

fl. Atlant. 2 pag. 113. tab. 169

Habitat in Barbaria arenis prope Melide.

Stemis superne pubescentibus. Folia longe petiolata, vix semipollicaria subpinnatifida, acuta, serrata supra remote sublineata, infra usque petioli ad calycem. Stipulae ovatae, acutae. Pedunculi axillares, solitarii tri- triflori folio multo longiores. Calycis foliola lanceolata, aristata. Pedicelli semipollicares. Capsula pilosa.

Geranium arborescens foliis longe petiolatis, cordatis, crenatis, sublobatis; pedum
caulis multifloris; calyce pentophyllo Desfont. fl. atlant. 2. pag. 110.

Habitat in montibus Caffa herb. Desfont. 7

Rami teretes. Folio ad apicem ramorum, longe petiolato, sesqui pollicari, cor
dato, angulato, crenato, obtuso, subinacuo, nervoso-venoso, utrinque glabra
Stipula ovata acuta

Tordyleoides Geranium

Geranium Tordyleoides: foliorum villosis pinnatis; foliolorum ovatis, inciso-lobatis, anguste
dentatis; pedunculis multifloris longissimis; calycibus aristatis Desf. flor. atl. 2. pag.

107.

Habitat in Lusitania inquam at Cantis Herb. Desfon. 7.

ibericum Geranium

Habitat herb. Quoj.

Superne pedis longis hirsutum. Calyces hirsuti spina

botany Geranium

Herb. Qu. J.

Caules prostrati. Solia basi cordata, bipollucaria obtusa

Cinereum Geranium?

Habitat herb. Guss.

Caules prostrati, ope lentis villosuli. Folia margine villosa cinerea, ceterum
subglabra, subtus nervosa. Pedunculi biflori. Stipula villosa. Calyces densos
lato oblongi, aristati. Petala rotunda.

Heliotropoides - Geranium

Habitat herb. Tusc.

Caulis digitalis vel minor, villosi, canescentes. Folia ad radicem aggregata, ovata, obtusa, supra lineata, subtus albida, venosa, semi pollicaria. Pediculi albido pilosi. Calycis foliola cuneata, mucronata.

pulsulentum Geranium

Habitat herb. Grif.

Radice foliorum serrata. Pedunculi tripolluicari. Bractea ovata, membranacea. Calycis foliola lanceolata. Petala craspediata villosa, uti pedunculi subaercentia.

repetere Geranium?

Habitat herb. Quaf.

Pinnula linearis, integerrima, supra incana. Calycis foliola laniculata,
incana.

Geranium

Geranium orientale Columbinum magnis floribus pediculis longis inflo-
rescentibus Tournef. Bor.

Habitat in oriente herb. Turc.

Caulis laxis, ramosi, pilosi. Folia petiolata, reniformi subrotunda, quinquefolia
incisa, utrinque pilosa, subtus canescentia: laciniis obtuse cum mucrone.
Petioli longi. Pedunculi biflori. Calycis foliola villosa, aristata. Petala
magna striata. Antheri villosi. Stylus ovato, parvo.

Lespiliifolium Geranium

Habitat herb. Quaf.

Radix crassa, rix tamen nupi formis. Folia subrotunda, quinque partita: laciniis trifidis, obtusis vel quadrifidis: laciniis obtusis; lobi laterales saepe bipartiti, semipollicaria, villosa, basi squamulis ardis lacincolatis, fuscis. Pediculi breves, uniani, uni vel biflori. Calycis laciniis lacincolatis, villosis, acuta. Petala emarginata.

inc ar natura geranium[?]

Habitat herb. Ins.

Caulis rigidus fere, ciliiformes, erecti, spithamei. Folia sub cordata, vix semi pollicaria, punctato-fimbria, incisiva, dentata; dentibus obtusis fere. Umbelle 3 flora, Pedunculus bipollicaris: pedicelli sesqui pollicares. Sepala 5, aequa

Lupidum Geranium Caran.

Habitat herb. Fusf.

Rami subtetragonis, pilosi, uti tota planta. Folia cordatos oblonga, siccis lobata: lobi lanceolati vel ovato-lanceolati, inaequaliter serrati: serraturis obtusiusculis, mollia, profertim supra, venosa, acuta, lobi laterales et terminales sublaciniato. Stipula ovata, lanceolata. Calycis lacinae lanceolatae.

affinis Ger. bicolor, an a *Lupido* Ger. *Divesim*?

Fruticulosem Geranium

Habitat herb. Guss.

Ramipulosi, scabripuli. Folia pollicaria, pennatifida: laciniis linearibus
obtusiusculis. Pedunculi tripollicares: pedicelli raris hispidi. Calycis la-
cini lanceolato, pilis nitidis adspersa.

articulatum Gernonium

Habitat herb. Fusf.

Squamis radice rotundata, emarginata, aristata, imbricata. Scapi digitales, vertice
rare pilosi, versus medium bractea nonnulla parva, ovata. Pedunculi etaly-
ces villosi.

Ger.

no 1. herb. Tournef
Paules plerumq. d. Hoff.

Scapis paniculatis, floribus pedunculatis L'Herit. eb. n. 3

Tordylodes? 9

Habitat

herb Desert

Folia fruticosa et ultra, pinnata, pinna inciso-pinnatifida. Pedun-
culus longitudine folii. Pedicelli 12. umbellati.

Wahlbomia Thunb. in Act. 4. 1790. p. 216. Tab. 4

Calyx Tetraphyllus, corolla 4 petala. fructus 4. oblongi. affinis Dillenae
post cimitifugam collocanda

Habitat in Java

Rami alterni tetraphylli, cinereo villosi, erecti patuli. Cola alterna
petiolata, elliptico-ovata, acuminata, inferne integra, superne
serrata, supra viridia, subtus pallidiora, parum villosa, patentia
digittalia. Petioli breves. Flores in ramulis terminalibus, subumbella
tis. Umbella simplex et composita, subquadriflora. Petioli et
pedicelli filiformes, villosi patuli

9.

Habitat in monte Hammameluf. herb. Desfont
villosa-viscosum. Folia opposita longe petiolata, semipollicaria ovata
tenu, apice rotundata, acuta, incise-sublobata, crenata. Petiolus folio
longior. Stipula ovata, acuta. Pedunculi axillares, tri-pollicares
nervi umbellati, seni, bi-pollicares. Calycis foecula lanicolata,
seriata, nuda. Specimen imperfectum.

acuta Gustavia foliis amplis subcuneato — ~~ovatis~~ oblongis pubescentibus
his nervis nervis calyce truncato Act. f. h. n. Par. 1. pag. 114
Habitat in Am. merid.
Pungara tetrapetala Aubl.

non red.

sanguineum G. pedunculis unifloris, foliis quinque partitis trifi-
dis orbiculatis Burm. ger.

Geranium v. 11. homatodes Clus. hist. 2. p. 202.

Geranium sanguineum maximo flore Bauh. pin. 310

B. Geranium homatodes Canastienk, flore eleganter striato.

Sell. Esth. 163. v. 136. fig. 163.

Habitat in Europa pratis fœcis umbrosis &

caulis plures caudis diffusis ramis pubescentibus ullois foliis petiola
ra opposita, utraque petiolari lacini lineari, obtusis per
ci. stipula ovata membracea marcescente. Pediculi elonga-
ti pilosi supra medium lobis lobatis. Capsula glabra floris majori
foliolo calycis aristata

foliis orbiculatis

geranium sanguineum, caule articulato rubro, foliis orbiculatis
profunde squae vel tripartiti lacini trifidis, pedunculis solita-
ris longissimis, unifloris articulatis. Caran. disp. pag 195. tab
76. fig. 1.

prostratum y.

geranium homatodes Caniastense flore eleganter variegato
Dill. E.H.H. p. 163. t. 136. fig. 163.

Geranium homatodes flore variegato Tournef. inff. 267.

Geranium s. aquense p. 3 lin.

Geranium prostratum caule prostrato nodoso nodis inflatis
foliis oppositis profunde spartiti lobis trifidis, corollis
roseis variegatis Baran. Desf. p. 196. t. 76. fig. 3

Habitat in Anglia

a Sanguineo via nisi corollis variegatis differit

h. e. p. 163.

~~not to be~~

ranunculoides 9.

geranium africanum tuberosum folio ranunculi florum pallid.
maculis et stella purpurea notatis Boeck-Leydb. 1. p. 263 n.

21.

Geranium ranunculoides; pedunculis longissimis unifloris, foliis
obovulato multifidis radice tuberosa Burm. geran. 1. 4.
Lavan. Desf. p. 197.

Habitat in africa
Benth. herbaricus nomen ditotomi longissimi. Folia inaequaliter
duplata lacunato trifidis intermedia longior Pedunculi
pylthamoi affinis sanguineo Burm

non vidi

Crispum

*G. (Pelag.) pedunculis pubescentibus, foliis distichis cordatis
lobis crispis mucronatis Hort. kew. 2. p. 430 L'Her.*

Gerard:

*Geranium crispum calycibus monophyllis, foliis reni-
formibus crispis lobis plicatis crenatis crispis
lobis, caule fruticoso Berg. Cap. pag. 176.*

Geranium crispum calycibus monophyllis

Lesplethron g. foliis subrotundis septempartitis: latius trifidis, floribus
Lesplethron Cavan. Diss. p. 198. tab. ~~77~~ 77 fig. 2.
Habitat ad fretum magellanicum non pernica
Radix napiformis apice bipartita. Folio radicalia cognoscuntur
longissime petiolata. Petioli basi stipula lata. Pediculi radice
lesperisimi uniflori Calyx villosus latius ovatis acuminatis
nati Cavan

non vidi

Sibnium φ ^{pedunculis subunifloris}
foliis quinque partitis acatis. folioli pinnatifidis
Lin. spec. pl. p. 957. Gaertn. hort. t. 19

Habitat in Sibiria φ

Geranium *Sibnium* caule herbaceo villosissimo, foliis oppositis
quinque partiti pedunculis subunifloris. Casan. disj. pag. 190
Tab. 27. fig. 7. ^{apice subanastom. villosus}

Caulis ramosissimus subdichotomus sulcatus angulatus glaber
Folia petiolata opposita quae vili rari subque bipartita
lacina lanceolata acuta inciso. Petioli apice conespentes
Stipula emarida lanceolata attenuata. pedunculi axillares
folio longiori medio bractea duo subulata filiformes
Follicula calycis lanceolata inaequaliter attenuata. Petala
parva pallide rubra lineis tubus saturationibus. Capsula
villosa

emarginatum pedunculis unifloris, ^{foliis} emarginatis ovatis crenatis
Ken. Suppl. p. 306. f. v. p. 610
Habitat in Cap. b. p. p.

~~quae sunt ad ex. h. v. Kew non vid.~~

ambicum Ger. foliis rotundis incisi, pedunculis brevibus Torr.

flor. arab. p. 126

Habitat in Arabia
^{pelota}

folia sive partita laciniis serratis. Sepala cordata
pedunculi biflori calycis antheris

— foliis sive lobatis serratis, petalis integris
sepalis cordatis

~~melampyrum~~[?]

pilatum
~~latum~~

Geranium foliis 5partitis laciniis incisis lineariibus sensu
pelosi petalis emarginatis

Habitat in Cap. ~~6~~ ¹pei Nova Zelandia

Caulis herbaceus elongatus capus uti ^{opposita} folia planta pilis
rari adpressa. Folia fere ^{opposita} Geran. Dispositi: Stipula
lanceolata. Pedicelli gemini filiformes pedunculo
fere longiores. Calycis ovati anstati

vanum Geranium

caule foliis 5 fidiis.

L Herb. gran. tab 37.
non vidi.

tuberosum g. foliis multipartitis: laciniis lineantibus subdivisi ob
tusi. Linn. S. V. Burm. ger. 9

Geranium bulbosum Lobel. herb. 377.

Geranium tuberosum majus Bauh. pin. 310.

Habitat in Anglia, Italia & Barbara &

folia radicalia plura longissime petiolata, caulina
scapipedales. opposita brevis petiolata 5-partita laciniis intermedii
trilobis latius linearibus lanceolatis subpennatis, pediculis
villofis. Stipulae parvae lanceolatae. pedunculi in di
chotomia et apice pedunculi ultimi biflori laciniis
foliolorum calycis oblongo mucronato, se villosa profertim
marginibus aurata

Geranium tuberosum foliis albicantibus multipartitis
laciniis lineantibus subpennatis obtusi pedunculis
aut binis aut bifloris, petalis emarginatis Cavan. Desf.
May 199. tab. 40 fig. 1.

subpennatis

montanum Ges foliis petiolatis orbiculatis subseptemlobatis: lobis in
capis venosis calycibusque petalis emarginatis Gmel.
id. 4. p. 173

non vidi

Descriptum *G. foliis quinquepartito-tusfidis, petalis emarginatis lon-
gitudine calycis, anillis villosis* Lin. Am. Ai: 4. p. 282x Spec.
pl. pag. 956x Burm. ger. 15. fl. Jan.

Geranium majus foliis imis longis ad usque pedunculum divi-
si Monf. herb. 2. p. 511. f. 5. v. 3. fig. 3. Vaill. parif. 4. 15. fig. 2.

Habitat in Europa australiore O

Descriptum *G. pedunculis foliis brevioribus, foliis sive partibus trifi-
dis, pedalis multiflorisque, petalis emarginatis anillis villosis*
H. Kew. 2. p. 437

Geranium descriptum caule villosis erectis in fuis, foliis
quinquepartito-tusfidis, pedunculis biflori folio bre-
vioribus Cavan. Disp. pag. 199 t. 70. fig. 2.

Caules dichotomi debiles villosi geniculis inflati
Folia inferiora ^{3 pedu} petiolis breviora radiallya renfor-
mia cyfida: caulina profunda partita latiuscula
in lanceolatis acutis villosis. pedunculi biflori
Calyx anostatus.

columbinum \varnothing pedunculis folio longioribus, foliis quinque partito
multifidis, antheris glabris, calycibus aristatis Lin. T. V.

Burm. ger. 22.

Geranium columbinum foliis dissectis, pedunculis floribus
longioribus Vaill. parif. 29. T. 15. fig. 4.

Habitata Gallia, Helvetia, Germania

geranium columbinum caule prostrato foliis oppositis pal-
matis laciniis pinnatis, pedunculis solitariis longis
bifloris Cavan. des. p. 200 Tab. 22. fig. 2.

columbinum pedunculis foliis longioribus, foliis quinque partito multi-
fidis, calycibus pentagonis, antheris glabris At. kew. 2.
pag. 437

Caules plures diffusos palmares vel semipedales pilis raris adpressi-
s. foliis petioli breviora opposita circumscissione subrotun-
da laciniis linearibus, oculo armato raris pilosa. Stylis
subulatis. Pedunculi elongati. foliola calycis ovata
acuta aristata.

incanum q calycibus anfractis petalis integri, anillis hirsutis, foliis sub
digitatis pennatifidis. Am. ac. 6. p. n. 264

Geraneum africanum tenuifolium robertrani diversum Plukn
186. fig. 4.

Geraneum pedunculis bifloris, foliis multipartitis: laciniis
lineariibus Royen. Leqd. 331. Burm. ger. 26. fig. 26

Habitat in Cap. b. p. 24

Caulis tenues procumbentes teretes incani pedales et
ultra ^{ad} articulos nodosi. Folia petalis breviora opposita
subrotunda spatulata laciniis lineariibus incisim pinnati-
fidis supra glabri subtus incanis. Stipula manifeste
multifida laciniis subulatis Pedunculi terminales
et oppositifolii elongati biflori incani. bractea ^{40r} ~~dicta~~
ad basin pedicellorum subulato pedicelli proquollata
vix fructu flexa. calycis foliolo ovato oblongo
angustata incana fructu Capsula incana

Geraneum incanum caule procumbente, foliis palmatis
subtus incanis laciniis pinnatis lineariibus, capsula
hirsutis, pedunculis longissimis bifloris Ravan. det
pag 201. tab. 82. fig. 2

foliis spatulatis ~~lobatis~~ ^{incanis} subtus incanis laciniis pennatifidis

pefillum *g.* pedunculo bifloro, petalis emarginatis, caule depresso,
foliis reniformibus palmatis linearibus. Ger. h. v. p. 610. & Mant
435. Spec. pl. pag. 95. 74. Burm. Ger. 23.

geranium columbinum Tenius? laciniatum. Bauh. pinod. 130
pin. 310.

geranium columbinum humile, flore cauleo minimo Raj. angl.
3. p. 359. t. 16. fig. 2. *Sax*

Habitat in Anglia, Gallia \odot

geranium pefillum caule herbaceo ramoso, foliis subrotun-
do lobatis, lobis trifidis floribus minimis pentandris
caeruleis Cavan. disp. x. pag. 202. tab. D 3. fig. 1

Columbinum majus, flore minore caeruleo Vahl. bot. parisi
p. 79. tab. 15. fig. 1.

Caulis sup. pubescens dichotome ramosus. Folia opposita
inferiora petiolis longiora, 7-9 lobis trifidis
lacinis lineariibus vellosis. Stipula petalis
calyx parvus vellosus muticus. Pappi calycis
vix major. Capsula glabra filamenta 10 alterna
frentia

humile Ger.

Geranium malacoides seu columbinum minimum Park. 707.

Geranium columbinum humile flore comles minimo Rai. Prop.
bnd. p. 359. Tab. 16. fig. 2. Caran. Desj. p. 202. Tab. 13. fig. 2

Habitat in anglia

3-4 pollicari. Folia parva

michi haec nota

~~pal~~matum 9

molleq. pedunculis foliisque floralibus alternis, petalis bifidis
calycibus muticis, caule erecto à sculo nec. pl. pag. 953. 7
fi. Dan. 4. 679 Burm. ger. 21.

Geranium columbinum micis, majori flore et foliis bifidis
Magnol. Monspet.

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis Vail
Lant. Bot. 79. 7. 15. fig. 3.

Habitat in Europa ☉

Geranium molle caule suberecto, foliis orbiculatis subseptem
lobatis trifidis obtusis, caulibus oppositis superionibus
altissimi Cavan. Diss. p. 209. tab. 03. fig. 7

Caulis plures diffusi palmari pedale villosi uti tota
planta. Folia inferiora petioli breviora reniformi
suborbiculata. petala bifida calyx muticus.

pyrenaeicum f. foliis inferioribus quaque parte ^{multifidis rotunda}
tis: superioribus trilobis, caule erecto. ^{Huds. & angl. 1765} Mant. 787 et 257,
Geranium columbinum pyrenaeicum parvum maximum
Tournef. f. R. 4. 260

Geranium pedunculis bifloris, foliis multifidis: lacinis obtusis
inaequalibus, petalis bifidis Burm. ger. 27. Gerard. 3. prov.
434. t. 16. fig. 2

Habitat in pyrenod

pyrenaeicum Ger. foliis rotundatis semiquinquelobis
trilobisve incis, petalis bilobis 4: kew. 2.
pag 436

Geranium pyrenaeicum caule herbaceo villoso, foliis
oppositis subpeltatis orbiculatis: lobis trifidis obtu-
si corollae purpureo violaceis villosa.

Caules herbacei dichotomi villosi. Folia radica
lia petiolis longissimi septemfida: superiora oppo-
sita altera minora: suprema alterna subsessili

terminata petala
o. luteo purpurea
capulis glabris
Inpartita lobis 3 fidi stipulo ovato. Pedicel-
culi a dichotomia, axillares suprema oppo-
sita biflori fructuiferi deflexi. folio-
ca calycis oblonga subsessili minime fusca

cinereum G

Geranium pyrenaicum foliis cinereis radice crassa magna
flor. va. variegata Tournef. Inst. 267.

Geranium cinereum radice crassa, foliis orbiculatis profunde
quinquelobi cinereis: radicalibus longissime petiolatis caulinis
oppositis, flor. magna variegata Cavan. duj. p. 204.
et 29. fig. 1.

Habitat in montosis Gallie meridionali &
caulis vix pedales; duobus oppositis foliorum. Folia
cinerea; lobi obtusi infidi. caulina lobi saepe integri crati
stipula ovato-lanceolata. Pedunculi axillares et terminales
folio longioribus superne bifidi biflori. Calyx tomentosus
foliolorum cratis aristatis, Corolla carnea cineri perspuris
variegata Cavan

~~var. 2~~

Ed. St. F. usher

Lupinoides - 7.

Geranium *Aethiopicum* parvum flore magno candidante, lupini
foliis argenteo-punctis Rai hist. 512. no 21.

Geranium calycibus monophyllis, foliis orbiculatis indivis. tomentosis
lineatis, radice tuberosa Burm. Ger. no 65. Pavan. Desj. p. 204.
an Platin. t. 106 fig. 3

Habitat in Cap. b. p. p.

Folia radicalia longissime petiolata multipartita. Caepi
bifidi. Corolla alba magna. Burm.

non vidi

argenteum 9 petalis emarginatis, foliis subpeltatis septempartitis
trifidis tomentoso sericeis L. Gaiqu. coll. 2. p. 143
Burm. ger. p.

Geranium argenteum alpinum Bauh. pin. 310. Plukh.
t. 106. fig. 3. Longius radiceatum Pon. bald. 341. t. 342
Legu. Ver. 1. p. 471. t. 10.

Geranium argenteum montis Baldi Bauh. hist. 3. p. 474.
Habitat in Baldi summis rupibus 4

geranium argenteum. Radix crassa, foliis subpeltatis
5-7 partitis laciniis trifidis tomentoso sericeis, sicut
per biflori Sav. Desf. pag. 285. t. 107 fig. 3.

Radix hemipedalis crassa superne densa et stipulis aridis
squamosa. Totae planta incano tomentosa sericea.

Folia unguiculata laciniis linearibus oblongis acutis stipulis
-scapis subhis Petioli foliis 3 plo longiores. Scapus erectus digitatus medio
bracteis 4 lanceolatis. Calycis 5 lobis oblongis mucronato
Corolla pallide rubra. Sepala lanceolata

canescens G. foliis subpeltatis quinquepartitis subtus canescentibus.
lobis incisus petalis emarginatis Hort. kew. 2. p. 433. L'Herit Germ
^{Japan}
Habitat ad Cap. b. p. 4

Caules longi ramosi pro umbellatis. Tereti. villosi canescentes.
Folii petioli brevior alterna villosa, pollicari nervosa
venosa. Petali falciformes. Stipula subulata. Pedunculis oppo
sitifolii longi biflori villosi bractea subulata

Bohemium *G. petalis emarginatis*, anillis hirtis, cotyledonibus tri-
fidis, medio truncatis Am. acad. 4. p. 323. Mart. 434. Murr. Ger.
14.

Geranium batrachoides minus annuum purpureo caeruleum
Monf. prod. 267. hist. 2. p. 511. f. 9. t. 15. fig. 1.

Geranium batrachoides bohemium, capsulis nigris hirsu-
tis Dill. Cat. 159. t. 133. fig. 160

Habitat in Bohemia. O

Geranium Bohemicum caule villosis viscoso, foliis
oppositis rugosis glaucis, bifidis filamentis ciliatis
Bovar. Diss. p. 206. tab. 81. fig. 2.

Caules caetotome ramosis. Sola opposita petiolis
breviora glauca rugosa villosa 3-5 fida lobis
incisi 3-entati. Stipulae fibrillatae. Pedunculi
axillares foliis longiores, biflori. foliola calycis
oblonga nervosa aristata. Corolla saturate caerulea
capsula nigra.

carolinianum φ calycibus anfractis, foliis multifidis anllis hirsutis,
petalis emarginatis Lin Mant. 434. Burm ger
24.

Geranium columbinum carolinum, capsulis nigris
hirsutis Dill. Elbk. 162. v. 135. fig. 162.

Habitat in Carolina, Virginia \odot
geranium carolinianum caule herbaceo dichotomo,
geniculi inflati rubescentibus, foliis oppositi 5que
partiti trifidi, corollae parvae capsulis nigris hirsutis
Car. D. S. pag 206. Tab 124. fig. 222

carolinianum φ foliis 5fidis incisi calycibus anfractis, petalis
emarginatis anllis hirsutis Hort. kew. 2. p. 437.
calycibus pyrami
datis

Caules dichotomi, superne subullosi, decumbens
valde ramosus genicula inflata rubescentia. Folia
opposita petiolata infero petiolis breviora lobis subobovatis trifidi
latius tridentatis dentibus obtusis mucronatis
Hirpula brevissime ovata. Pedunculis axillares foliis lon
gioribus biflori. foliola calycis ovata attenuata san
gulo pyramidata anfracta glandula terminata. Corolla
calycis parva major alba emarginata 5tibus 3bus carnis
capsula nigra ~~ullosa~~ hirsuta

Stratum G. foliis quinquelobis: lobis medio dilatatis, petalis bilobis venoso reticulatis
Burm. ger. 6. 4
Geranium romanum vespiolor *f. stratum* Park. parad. 229
Monf. herb. 2. p. 516. f. 5. v. 16. fig. 24.

Habitat in Italia 4

Geranium stratum caule herbaceo decumbente, foliis squelobis lobis dentatis; medio dilatatis, petalis bilobis, venoso-reticulatis *Caran. des pag. 207. tab. 79. fig. 1*

Cauli vellis raris adpressis pubescentibus pedalis. ^{oppositis} folia inferiora petalis longioribus 5 lobis superiora longiora 3 lobis. lobis oblongis utraque angustioribus acuta fere in cuspis inferne integerrimis, subtus in venis ^{pub} villosis. Stipulae subullosae. Pedunculi axillares et terminalis biflori inferiores folii longitudine superiora longiora villosi involucra papiracea 4. foliola calycis raris villosis, lanceolata, aristata nervosa Petala alba venis purpureis capsulae subvillosae

Quintus Botan
magaz

nodosum G. petalis emarginatis, foliis caulinis trilobis integris
seriatis; subtus laevibus Mant. 434 L.V. p. 676

Faique coll. 1. p. 305 Burm. ger. 7.

Geranium s: b. plateau Cliff. herb. 2. p. 101.

Geranium nodosum Bauh. pin. 310.

Habitat in Delphinatibus

Geranium nodosum caule tetragono pubescente erecto,
foliis 3 vel 5 lobis dentatis desuper scabris, subtus laevibus
petalis 5, seriatis Cavan. Desf. pag. 200. Tab. 80. fig. 1

Caules tetragoni glaberrimi dichotomi. Folia radicalia
longissime petiolata, squeloba: caulina opposita super
ma subsessilia triloba: omnia lobis ovatis acutis grosse
obtusis seriatis seriatis mucronatis venosa glabra
Pedunculis axillaribus ^{trifloris} stipulis subulatis. involucri
subulata. foliola calycis lanceolata, angustata nervosa
uti pedicelli ore lentis pubescentes. Corolla micar
nata petala bifida stans tribus nervis.

caulis radicalibus quinquelobis, — oppositis

reflexum G. pedunculis foliisque alternis, petalis reflexis la-
cineatis longitudine calycis mucosi Lin. Mant. 257. t. V
pag. 616.

geranium flore purpureo reflexo lucidum Mart. ii. 39
Habitat in Italia &

Hall. herb. no 46 934.

geranium reflexum caule herbaeo foliis alternis 5-
lobis acutis petalis reflexis lacineatis, basi inter
se haerentibus, calycibus mucosis Cavendish. p. 200
tab. Pl. fig. 1.

caulis sulcatus villosus. ^{remota radice} folia alterna infera
petioli breviora superiora longiora suprema peltata
& 5-loba lobi oblongi grosse crenato serrata serru-
ris mucronatis villosa. stipula lanceolata.
pedunculi foliis longioribus fructiferi ternis. calycis
foliola oblonga villosa petala rubra apice dentata
capsula villosa

ibericum G. caule dichotomo villosa, foliis oppositi quinquepartiti in
petalis 3 lobis medio brevioribus, cuspidato Cavan. ¹⁸⁰⁰disj. p. 209. t. 124 fig. 1.
Geranium ibericum batrachioides minoribus foliis maximo
flor. Tournef. cor.

Habitat in oriente.

Caulis herbaceus bipedalis. Folio inferum longissime petiolata
5-7 lobis profunde dentato-inciso. Stipula lanicola
to, longa. Pedunculus axillaris, folio longior. Foliole caly
cis ovata ansta verminata. Corolla sesquipolliciana Cavan

non vidi

Sylvaticum q foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis, caule
erecto, petalis emarginatis fl. Dan. Tab. 124

Burm. ger. 12.

Geranium 2. batrachioides minus Claph. 2. p. 99.

Geranium batrachioides, folio acroniti Bauh. pin. 317.

Habitat in Europa boreali, Sylvi 4

Caulis pedalis erectus superne dichotome ramifcus piliferus
teres folia radicalia et infera caulis petiolata

sub ramificationibus sessilia, ^{pinis} ~~latissima~~ ^{int. angustis} ~~trifida~~ ^{trifida}
lateralibus iterum bifida ~~et~~ ^{et} profunde serrata, dentibus
callo mucinato purpureo ~~et~~ ^{et} mucinato villosa ~~petalis~~ ^{venosa}

subtus parum pallidiora venis exstantibus. Petioli
tetraedri radicalium longi stipula membranacea laniceo

† Calo inferne solitane superne gemino. pedunculati
ex apice breviter dichotomie ~~teretes~~ ^{trifidi} ~~pubescentes~~
bracteae duae utraque membranaceae ~~longae~~ ^{longae} ~~pedunculati~~

unguiculari Calycis ~~obtus~~ ^{obtus} villosa ~~foliolis~~ ^{foliolis} oblongis ~~angustatis~~
tota interiori margine venis purpurascens

Petala obovata purpureo coenilea integra basi villosa
Antherae coenileae

Jesum *G. pedunculis oppositifolius geminis, caule patulo, petalis*
integerrimis Lin. Mant. 97. L.V. p. 616

Geranium montanum fuscum Bauh. pin. 310.

Geranium phaeum / *fuscum petalis reflexis* Monj. bot. 2. p. 515.

Habitat in Europa australi &

Caulis pilosus folia 5-fido lobata superiora suspensa rari-
us villosa. Pedunculi inferiores gemini superiores plures
terminales saepe unidem pollicares pubescentes sub
canescentes uniflori. Calycis nutantes foliulis oblongis
canescentibus mucronatis corolla minor *G. phaei*
Capsula villosa

conjugitur cum *G. phaeo* a Cavan: ut sine tamen

phorum G. pedunculis solitariis oppositifolius, calycibus subangulatis,
caule erecto, petalis undulatis Lin. S. V. fl. Dan

^{Murm. 227. 11}
Geranium montanum fuscum Bauh. pin 310

Geranium pedunculis bifloris alternatiu cauli integro superne
mediisculo infidentibus Hort. Cliff. 3434

B. Geranium 1. pullo flore Clus. hist. 2. p. 99.

Geranium batrachioides hirsutum, flore atrombente Bauh pin
310.

Habitat in Pannoniis, Helvetiis, Styriis alpebus et Danis
umbrosis 4

Geranium phorum caule herbaceo erecto, foliis alter
nis hirsutis palmato 5 lobis dentatis incisus flori
bus subsessilibus calycibus mucronatis Caran. D. p.

bifloris
lobis 5 lobis palmatis
incisus

per 210. Tab. 89. fig. 2.

Cauli erectus pedali et ultra angulatus pilosus folia
alternatim infera petiolata superiora alterna sessilia 3 pda
lobis serrato incisus utraque punctis minutis frequentibus
pilis feris. Styculo emarcescente ferruginea lanceola

Capsula villosa Pedunculis oppositifolii longi biflori
superne truncata involucra minuta 2 pphylla foliola calycis oblonga
villosa mucronata

Ciridium g. foliis semiseptelobis incis, calycibus simplicibus pilosis,
petalis planis subundulatis Hort. kew. 2. p. 432. L'Herit. Jéron. sub
39.
Geranium foliis semiseptelobis rugosis dentatis, petalis planis fimbriatis
indivisis Hall. hist. 935.
Habitat in Helvetia 4

michi cognoscitur

~~pratense~~
~~maculatum~~ J. foliis subpeltatis multipartitis nervosis acutis,
petalis integris fl. Succ. 610* P.V. Burm
ger. 16.

Geranium 3 batrachoides major Clus. hist. 2. p. 100.

Geranium batrachoides, Gratia dei Germanorum Bauh.
pin. 310.

Habitat in Europa pratis &

Geranium pratense caule herbaceo erecto, foliis oppo-
sitis subpeltatis multipartitis nervosis lobis penna-
tis acutis Casan. Desf. pag 210 tab 87. fig. 1

Caules erecti villosi angulosi dichotome ramosi peda-
les et ultra. Folia inferiora longe petiolata
superiora subsessile omnia subtus pallidiora
villosa laciniis lanceolatis acutis pennatis.
Stipula ovato-lanceolata pedun-
culi in dichotomia et apice villosi. In flori-
foliola involucri subulata 4 phylla foliola
calycis villosa, oblonga nervosa anastom-
tata. Flores albi venis violaceis vel coeruleis

palustre G. pedunculis longissimis, declinatis
quinquelobis incis. l. v. p. 6174 fl. Dan. tab. 596.
Burm. ger. 13.

Geranium sanguineum majus Best. eyfl. vern. t. v. g. fig. 2.
Geranium badrachioides palustre, flore sanguineo Dill.
app. 55. Elth. 160. t. 134 fig. 161.

Habitat in Ruspa, Germania &

Geranium palustre caule herbaceo villosa, foliis opposi-
tis villosis quinquelobis incis, pedunculis longissimis
declinatis Casan. de s. mar. 211. tab. 87 fig. 2

Cauli erigitur ramosus villosus. Folia infera radicalia
longe petiolata superiora brevissime sive parvula
lacini lanceolati incis acuti subtus raris pilis
simpliciter venosa. Stipula lanceolata. Pedun-
culi axillares elongati. involucria subulata folio-
la calycis ovata subvillosa aristata. Corolla magna
capsula glabra

alontifolium G. foliis subpeltatis septempartitis, petalis integris verno
foliatis Hort. New. 2. p. 435. L'Heretier Jardin Tab 40
Habitat in Helvetia et Delphinatu 4

similis batrachode et flores minores

mhi cognoscere

Batrachodes 9.

geranium batrachodes caule herbaceo erecto dichotomo,
foliis oppositis, quinquepartitis incisi, flombus comibus
magnis, calycibus inflatis Caran. Desf. pag 211. tab. 86

Fig. 2.

Habitatio alpestris 4

Caulis erectus, dichotomus, pubescens, sesquipedalis. Folia
inferiora petiolis breviora, superiora floralia sessilia sive
partita laciniis lanceolatis attenuatis inciso subpinnatif.
7 is puberula subtus pallidiora & nervis exstantibus. Stipulae
lanceolatae. Pediculi a dichotomia, axillis et apice
villosi biflori. involuella 4or lanceolata. Calyx ovatus
dein inflatus folioli lanceolatis nervosis anastatis villo-
si. Corolla coeruleo purpurea. Gynostemium pubescens

valde affinis *pratensis*

petalis integris a *pylva* diversa an eadem cum *aeon* foli-
L'Her.

macrochilum G. calycibus inflatis, petalis integris, pistillo longissimo
scapo dichotomo Hort. Cliff. 343 + Mant 434. Gaerq. collect.

1. pag. 2 s. O. Burm. ger. 10

Geranium batrachoides odoratum Bauh. pin. WD. Monf. hist
2. p. 514. f. 4. v. 16. fig. 15.

Geranium batrachoides longius radiatum odoratum Bauh
hist. 3. pag. 477.

Habitat in Italia &

Geranium macrophyllum foliis oppositi 5 lobatis, calycibus
inflatis sphaericis tubis, pistillo declinato longissimo
Caran. inf. pag. 212. tab. 25. fig. 1.

foliis oppositis
lobis inciso-
serratis

caulis pedale erecti superne dichotomi villosissimi. Folium
radicalia longissime petiolata caulina opposita petiolis
aequalia, subrotunda profunde 5 f. lobis in
cisa dentatis dentibus obtusis mucronatis. Stipulae lan-
ceolatae marcescentes. Pedunculi in dichotomia et
apice pedicelli biflori, breves vel pubescentes bractea
plures parvas lanceolatae floris nudaer. Calyces foliis
villosissimis ovatis trinervi coloratis aristatis. Capsula
glabra

maculatum & caule dichotomo erecto, foliis quinquepartitis
inæcis: summis sessilibus l. n. 1. V. Burm ger.

17.

geranium batrachioides americanum maculatum,
floribus obsolete canalicis Dill. Elth. 150. V. 132. fig. 159.

Habitat in Carolina, Virginia, Liberia &

caulis erectus, raris dichotomus. folia radia septempartita
lobis inæcis maculis florescentibus. caulina opposita
stipula obtusa. pedunculi longi. Petala integra
capsula villosa

geranium maculatum caule erecto herbaceo foliis opposi-
tis sive partitis inæcis summis sessilibus; petalis integris
nervis rotundatis Cavan. Desf. p. 213. Tab. 06. fig. 2

praterse G.

apopheloides 9

Geranium pedunculis bifloris, foliis multipartitis orbiculatis
laciniis acutis radice tuberosa Burm. geran. no 27. Cav.
^{col. p. 213}
Geranium colymbanum montanum saxatile, per ampla ra-
dix, foliis parvis altius incisi, flore atro-purpureo.
Tall. no: 67.

Habitat in Italia 4

Caulei longi filiformes glabri. Folia petiolata, opposita
orbiculata profunde incisa: laciniis inaequalibus, obtu-
satis. Corolla ampla integra, purpurea Burm

non vidi

Lucidum g. calycibus pyramidatis angulatis elevato-nyctosi, foliis
quinquelobis rotundatis fl. Dan. tab. 213

Warm. Ger. 19.

Geranium saxatile Thal. her. 44. t. 5.

Geranium lucidum saxatile Bauh. pin. 310.

Geranium rotundifolium saxatile montanum Col. ceph.
1. p. 130. t. 137.

Habebat in Europa nyctis umbrosis 3

Geranium lucidum caule herbaceo, foliis oppositis petalis lu-
cidi rotundato lobatis, calycibus pyramidatis
transversum nyctis Cavan. Desf. p. 214 tab. 80. fig. 2.

Caules pedales glabri. Folii inferiora longe pitholata
superiora brevius opposita et alterna. lobi extropu-
narum latiores ^{oppositi} ^{minores} ^{intermedi} subtrifidi laterales
subtrifidi lacina intermedia triseriata glabra vel rare
pilosu stipula ovata. Peduncululi axillares ad folium
minus biflori folius longior. foliola calycis ovato
lanceolata aristata Capsulo glabro petala inter
germina

rotundifolium G. petalis subintegris longitudine calycis, caule prostrato,
foliis reniformibus incisè *Spic. pl. p. 957. Lin. Mant. 434*
Wurm. ges. n. 20.

Geranium alatum Duch. herb. 205.

Geranium folio melio rotundo Bauh. pin 310.

Geranium columbinum majus, flore minore comite Vaill. parif.
79. t. 15. fig. 1.

Habitat in Europa cultis O

rotundifolium G. petalis subintegris calyci subangusto equalibus. foliis
reniformibus lobatis incisè sinuibus glandulosis *H. Kew*
2 pl 437

Geranium rotundifolium caule prostrato, foliis oppositi infero
ribus rotundis hemiquinquepartiti superioribus subcuneatis
petalis integerrimis calycis paulo longioribus Cavan
disf. pag 214. Tab 93. fig. 2.

Caules dichotomi, procumbentes villosi pubescenti
ad genicula rubefactes inrasati. Solia opposita
inferiora subrotunda petiolis breviora 5-7. fida lobi
terni vel 5 fido dentati obtusi. Superiora basi cuneata villosa
lo villosa. Stipula lanceolata. Pedunculi axillares
superioris folio longiores. Calyces villosi angustati

robertianum G. calycibus pilosis decemangulatis Lin-Spici pl. p.
955 + Fl. Dan. t. 694. Musm. ger. 10

Geranium 3. Fuchf. hist. 206

geranium robertianum primum. Bauh. pin. 319.

Habitat in Europa rupibus et muris & C

Geranium robertianum foliis ternatis pinnatis incis; caly-
cibus rubris decem flocatis pilosis Caron. des. p. 215
tab. 86 fig. 1

robertianum Ger. foliis quinatis ternatisque incis; calycibus
decem angulatis H. Kew. 7 p. 437

Caules teres villosi pedalis et ultra. Folia petioli
brevis opposita. folio lanceo-pinnatifida dentibus
obtusis mucronatis. ^{ultra adpressis} Stipula ovato attenuata + Pedun-
culi axillares biflori. pedicelli breves. Calyx ventricoso
ovatus foliola lanceolata flocata aristata. Corolla
plenumque rubra interdum alba Petala uterque

anemonifolium f. *foliis palmatis*: foliolis pennatifidis, caule fere
visoso Hort. New. 2. p. 432. Part. Major.

Geranium palmatum caule dichotomo inter nodos aphyllis longis
ramis: foliis radicalibus palmatis lobis pennatis, superioribus hastato trilobis
Cavan. Desf. 4. p. 216. t. 84. fig. 2.

Habitat in Madera
Tota glaberrima
Caulis crassitie digiti brevissimus, rami bipedales - folia
concola radicalia profundissime sive partita fere
lobis breviora superiora opposita tripartita laciniis
pennatifidis pinnis incisi dentibus obtusi mucronati
subtus pubescentia. Stipulae ~~ovatae~~ acuminate orate
radicalium reniformis diametro pollicari
glaberrima in dichotomia et apice biflori involucrium
tetraphyllum ^{foliolis} calycis laciniolata orata
nervosa. Corolla coerulea. Capsula glabra
Geranium ^{utilans} Ehrh. beytrage 7. p. 164

Grosularioides G. foliis cordatis subrotundis lineatis incisè crenatis,
caule herbaceo. Spei: pl. p. 440⁺ Mant. 432 Burm. ger. 53.

Geranium africanum, uva crispè folio, calyculis proci-
dentibus, floribus exiguis lobellis Herm. Aug. 6. 207.

N. 289.

Habitat ad Cap. 6. Spei 4.

Geranium grosularioides caule prostrato lavi herbaceo
foliis cordatis subrotundis lobato-incisè crenatis pedun-
culis capellanibus Cavan. Diss. p. 245. Tab. 119. fig. 2.

glaberrima. Caules plures prostrati compressi bipedales.
Folia radicalia numerosa ramea opposita longissime
nervolata superiora profunde incisè laciniis 3 dentatis
nervi axillares superiores foliis longiores 4-fidula
subrotunda acuta reflexa. Antheris in foliolo 3. 4. pedicelli
3. lacini foliolo calycis laciniolata attenuata
cauleque glabris

Grosf. G.

foliis cordatis subrotundis incisè dentatis, caulebus glabris
nervi pedunculi subinfloribus filiformibus Hort. Kew. 2
p. 420.

rupestre φ aculeis ~~se~~ villosa scapis subinfloribus foliis ^{bi} pennatis pinnis
incois ~~pinnatis~~ ^{incois} ~~laciniis~~ ^{laciniis} linearibus
geranium rupestre Radice crassa lignosa; foliis bipennatis de super
fomento-conescentibus inodentibus, scapis bi-f. 3 floris Cavan. disc.
p. 225 Tab. 90 fig. 3.

Habitat in Montserrat Hispania 4

Geranium hispanicum magna radice, cicutis foliis crassioribus
Tournef. inff. p. 269

Folia longe petiolata: foliola alterna: pennula ovata lan-
ceolata minima. Stipula bifurca. Scapus umbella bi-f. 3 flora
ter minutus. Calyx aristatus Cavan.

Tota planta villosa Radice ~~superne~~ ^{superne} ~~crassa~~ ^{crassa} ~~digitata~~ ^{digitata}
~~angustis~~ ^{medio} ~~pinnis~~ ^{laciniis} ~~linearibus~~ ^{linearibus} Folia digitalia pinnis linearibus
Scapi ~~longe~~ ^{duplo} ~~longiores~~ ^{longiores} Stipulae lanceolatae
acutae ~~superne~~ ^{superne} ~~crassa~~ ^{crassa} ~~ovata~~ ^{ovata} ~~lan-~~ ^{lan-} ~~ceolata~~ ^{ceolata}

Teneiroides G. pedunculis trifloris, involucri calycibusque obtusis,
foliis bipinnatifido-lacinatis, caule herbaceo Hort. Kew. 2.
p. 420. L'Herminier Journ. Tab. 11.
Habitat. ad Cap. b. p. C.

non vidi