

germ

ut Charant. speciei adhibet Ramond nem semen pedicellatum vel sessile  
germ Desl Rose quod forte locum habet Desfont

antarcticum G. foliis radicalibus pennatis caulinis superionibus  
tripartitis floribus erectis petalis calycis brevioribus

Habitat ad fretum magellanicum

Flores omnino gaei rualis palmari vel pedali ~~longi~~ <sup>longi</sup> simplici  
plex superne in pedunculo <sup>divisus</sup> bi-<sup>foliis</sup> f. triphyllus  
Folia radicalia et inferiora <sup>interrata</sup> pennata. folioli oblongis  
oppositis ternatisque basi acuti obtuse serratis puberulis  
terminali cordato subrotundum reliquis major in caulibus  
sublanceolatis in 3-5 fidi lateralia integerrima superius  
tripartita laciniis lanceolatis extrorsum serratis.  
Stipula oblonga. Pedunculi inaequaliter tomentosi laciniis  
calycis alterno majori ovata. Petala obovata

a f. May  
genum in herb. musc. vidi foliis superionibus pennatis laciniis  
lanceolatis



risale *Q* floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis  
his Lin. 1. v. fl. Dan. tab. 722.

*Caryophyllata septentrionalium* Lob. ii. 694.

*Caryophyllata aquatica*, nutante flore Bauh. pin. 321.

B. *Caryophyllata aquatica altera* Bauh. pin. 322.

hybrida *Q* flore nutante calyce folioso, corollam polypetalam ex-  
teate Jacq. Musc. 2. p. 33. ii. var. 86.

*Caryophyllata montana* 3. Oles. hist. pl. var. p. 104.

Habitat in Europa praevalens subhumida 4

Caules plures pedales erecti simpliciter villosi. Vertices. <sup>villosi</sup> folia  
radici petiolata radicalia interrupte pennata pennis  
vel tri-<sup>stola</sup> oblongis alternis incisi serrati terminali non reliquis  
duplo majori trifida incisa. caulina ternata uncinifor-  
mici serrati incisa stipula serrata. foliola calycis  
ovata. Petala spatulata  
— retali longitudine calycis.

Intermedium g. foliis radicalibus pennatis <sup>bus sub</sup> cau. lenis ternatis floribus  
mutantibus petalis calycis brevioribus

Habitu

Caulis bipedalis villosus apice dichotome divisis. Folia  
radicalia petiolata pennis 3-5 lateralibus parvis  
inaequalibus obtuse serratis sessilibus terminali maxima  
tri-pollucibus basi cordata subrotunda triloba laciniis unis obtuse  
serratis; caulina suprema opposita florum lacini  
simplicia subsessilia foliola obovata serrata unis  
su. Pedunculati ~~et~~ apice ad dichotomia longi uniflori  
villosi laciniis calycis lanceolato attenuato  
petala obovata



japonicum *G.* floribus erectis; fructibus hirsutis: antheris nudis, foliis  
subrotatis Thunb. fl. jap. 220x1 v. 400

Habitat in Japonia

Caulis teres flexuosus, erectus, hirsutus pedalis et ultra, apice  
parum et rarius ramosus. Rami alterni, brevissimi, tomentosi.  
Folia alterna petiolata subrotunda interdum quinqueloba  
dentata villosa, molles, pollicaria, Petioli tomentosi. Styli  
to foliaceo, ovato unisp. dentato, petalo longitudine caly-  
ci. Anthera uncinata glabra Thunb.

urbanum & flore inclinato floribus erectis, fructibus globosis  
villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis L  
fl. Dan. Tab. 672.

Caryophyllata Dod. pempt. 137.

Caryophyllata vulgaris. Bauh. pin. 321.

Habitat in Europa umbrosis &

Caulis bipedalis pilosus subpilosus. Folia petiolata superiora  
ternata folia obovata utraque acuta inaequaliter serrata  
intermedium bipollicare lateralibus minoribus sessilibus.  
Stipulae utraque ad basin petioli subrotunda dentata  
inversa. Pedunculi villosi canescenti. Flores parvi longi  
calycis foliola lanceolata petala calycis longiora petalis  
aequantia



canadense G. floribus erectis feminibus hirsutis: antheris nudis, foliis  
refl omnibus pennatis: pinnis lanceiformibus incisim mucronatis in  
Cim Gott. 1774. p. 93. t. 4. l. v. p. 400

Paryophyllata canadensis, foliis acutioribus flore luteo majore  
Hall. hort. Gott. p. 104

Habitat in Canada

Caulis erectus <sup>apice luteo</sup> teres ramis purpureis  
pilosus. Folia radicalia petiolata <sup>internode pinnate</sup>  
pinnis oblongis in se. pinnis oppositis in aliis <sup>inferius</sup> <sup>ultra</sup> <sup>profer</sup>  
de inaequaliter serratis in aliis incisim serratis terminali  
maxima reniformi subrotunda incisim sublobata obtuse  
serrata serraturis mucronatis in aliis incisim acutius  
serrata <sup>exor pinnis</sup> <sup>suprema</sup> <sup>simplex</sup> trifida. Calycis foliola ovata  
reflexa margine cana. Petala <sup>lutea</sup> ~~flava~~ stipula lanceolata  
exteriori basi acuta fructus utraque urbano

Juncus Anethum floribus erectis, antheris uncinatis nudis foliis caulinis pennatis petiolis  
stipulisque incisim fissis, petalis calycis longioribus Hort. kew 2. p. 217  
Juncus aleppicum Haegy. coll. 1. pag. 80.

virginianum q floribus nutantibus, pedali calyce minoribus fructibus  
globosis: aristis uncinatis nudis, foliis ternatis Lin. l. V. p.  
479 + Spec. pl. pag. 7164

*Caryophyllata virginiana* albo flore minore, radice inodora  
Herm. huzdb. p. 121. parad III. 4. IIII

specum laciniatum Murr. in Comment. Gott. 1774. p. 308. 2.

Habitat in Virginia, Sibiria &

Caulis Vero pilosus superne densus. Folia petiolata  
inæqualiter serrata incisè superiora triloba pilis ad  
spersa pedunculi hirti uniflori. foliola calycis ovata petala  
albo

specum canadense Fairch. hort.



gemiculatum Geum

Habitat in Carolina Herb. Rich.

Caulis herbaceus, erectus, superne ramosus, villosus. Folia subpetiolata, <sup>ca</sup> tri-  
loba, grosse et inaequaliter serrata. Floralia lanceolata. Pediculi inaequali. Ca-  
lyx foliolis ovata. Anthe villosa, medio gemiculata & inflexa, apice cur-  
vata. Stipulae oblongae, apice dente uno altiore

radiatum Geum

Habitat in Carolina herb. Buch.

Herbium. Caulis erectus, simplex, superne in pedunculatos divisus, pedalis vel parum  
ultra. Folia radicalia longe petiolata, interrupta pinnata, 3 juga: foliola latera  
lia sessilia, serrata incisiva, terminale palmare, subrotundo-cordatum: caulina ob  
ovata, subrotunda, venosa, nervosa - lineata, dentibus inequalibus fissis acutis  
serrato-incisiva. Floralia trifida: lacini lineares. Calycis foliola lanceo  
lata. Flores erecti, Cresta superne glabra, inferne villosa, apice hamosa



montanum 9 flore inclinato solitario, fructu oblongo: antheris villosis  
erectis Spec. pl. p. 717 Gaequ. fl. austr. 4. 4. 373.

Caryophyllata montana Pan. epit. 727.

Caryophyllata alpina Pona bald. 342.

Caryophyllata alpina lutea Bauh. pin. 322

β. Caryophyllata alpina minor Bauh. prodr. 139. pin. 322.

Calyophyllata alpina minima, flore aurea Bauh. ii. 399.

Habitatio alpebus Helvetiae, Austria, Delphinatus 7

Caulis subvillosus folia superiora sessilia tripartita laciniis  
apice emarginatis corolla magna petala calycis majora subro-  
tunda emarginata

reptans. G. foliis uniformibus incisi. alternis minoribus flagellis  
reptantibus L. V. Haenke fl. austr. 5. app. 8. 22

Caryophyllata alpina, apicifolia Bauh. pin. 322.

Caryophyllata alpina tenuifolia incana, flore lacteo longius radiata  
Boiss. mus. 160. 4. 120. Barr. II. 406.

Habitat in Helvetia et valle Barpilonensi <sup>vulgo</sup>

Caulis digitalis villosus uniflorus folia radicalia puberula  
temperata pennatis foliis serratis incisi terminali  
major trifida. Caulis sessilis trifida. Flori magnus  
folia lacina calycis lanceolata



album  
g. floribus erectis, femuribus ortho que utriusque pilosi, foliis pennatis  
quaeque hort. 2. tab. 175

non vidi

fructum G. flombus eredis, anthesis uncinatis nudis, foliis caulinis pinnatis  
tis: folioli stipulisque inciso serratis, petalis calyce longioribus  
Hort. Kew. 2 p. 217.

*Geum canadense*

Murr. in nov. Com. Gott. 5. p. 33. T. 4. fig. 13.

*Geum aleppicum* Faerq. collect. 2. p. 88.

Habitat in America septentrionali &

idem cum canadense L. V.



Cardianum - G. folia radicalibus floribus erectis, foliis radicalibus subpinnatis,  
caulinis simplicibus serratis ovato lanceolatis hispatis alternis  
Walt. fl. Carol. caule decumbente Walt. fl. Carol. pag 150  
Habitat in Carolina.

non vid.

aleppicum G.

Genus aleppicum Jacq. coll. 1. p. 80.

Habitat 4. <sup>pulis hirsutum</sup>  
habitus Gei urbani. Caulis plures erant. Teretis sesquipedales. Folia  
radicalia pennata petiolata. foliolo terminati maximo rotun-  
dato lobato lateralibus ovatis magnitudine inaequalibus. omnibus  
sesquibus inaequaliter serratis interdum foliolo extrema inflexo  
palmata in aliis omnia profunde incisiva. folia caulina laniceo  
lata. suprema simplicia. Stipulae sessi incisiva. Petala  
tubera calycis parum longiora. fructus ut in Geo urbano  
Jacq.

non videtur a fructo non desumendum  
differentia desumenda est. Ken



anemoneoides L. pentapetala, foliis pennatis pinnis omnibus diffractis  
Linn. l. V. p. 400

Leg. am. ac. 2. p. 353 v

Dryas pentapetala foliis pennatis L. V. ed. 13. p. 399

Dryas anemoneoides Pall. et B. p. 733. Tab. L. c. fig. 4.

Anemone pupilla Gaertn. in n. com. ped. n. p. 14. Pl. p. 543.  
t. 19. fig. 2. 3.

Habitat in Cantabrigia 7

Folia radicalia pennata glabra foliolis 7-9. oblongis  
lineariibus subturciformibus. Superne obtuse serratis  
inferioribus mucronatis. Stipulae filiformes. Scopus fili-  
formis folio duplo longior, nudus folio unico termina-  
to sesquialter. Flos unicus. Calycis foliicola acuta. Corolla  
calycis duplo major petala subrotunda lina.

non vidi syn. ex Baeh. her. Dubia

geoides *D. pentapetala*, foliis pennatis. pinnis extremis confluentibus.  
L. N. p. 401.

*Dryas geoides* Pall. N. 3. p. 732. T. Y. fig. 1. Jacq. bot. 4. T. 60.

Habitat in Sibiria

subaphyllis

Caulis palmatis teres glaber superne in ramo uno alterove  
unifloro diversus. Folia interrupte pennata multiplex pinnis

terminalibus majoribus integerrimis extenuis apice obtuse serratis subnervis raris  
pennatis foliis villosa. caulina remotissima lanceata integerrima cum stri-  
pulis utraque lanceata. Petala oblonga flava calycis  
longiora



pentapetala B