

Ghinia

1 m un dato G. fructibus muticis
2 spinosa G. fructibus quadrijugis

Curasavica Verbenae diandrae foliis longis, calycibus aristatis, foliis ovatis serratis
L.V. p. 66. 7. Sp. pl. p. 20. D

Veronica similis fruticosa Curasavica Herm. par. 240.

Tamonea spicata Aubl. Pl. Gu. pag. 659. tab. 268.

Habitat in Curasavo americanis.

Ghinea

~~delectus~~ Ghinea Schreberi, Tamonea seu est
ad Didynamiam spectat non vid.

municata Ghiesb. fructibus muticis Sw. prodr. pag. 94.

Tamonea fricata Aubl. Guian. 660. t. 260.

Habitat in Guiana, Cayenna ☉

Caules erecti, tetragoni, pedales, nodosi folia petiolata, opposita, tomen-
tosa, subovata, dentata. Flores fricati; alterni, fructu opposito a stella
res. Squamula ad basin singuli floris. Corolla caulea. Baccia nigra
aubl.

Spernosa *Phunia* fructibus quadrijugis Sw. prodr. (Tamonea) pag 94.
Verbena curasavica

Prompfera Houtt. relap. t. 2.

Verbena *curasavica* Herm. parad. 240

Verbena curasavica: diandra, fructi longi, calycibus aristatis, foliis ovatis
argute serratis Lin. Sp. P. V. pag

Habitat in Curasavo