

Gradiolus

~~1797 de Glad. & Gradiolus non lincos~~ Jar
1797 Glad. ruber v. indus Hort. Pa

adda inter species dubias Glad. mucronat.
pubescens Lamour

adda Gradiolus tuberosus Burm

~~Gracia videtur Gaoque
a W. L. D. an. Betaceae
con juncta diversa
videtur~~

~~prothacium L. monst. 183 exy baphur in Operosoli scab.~~
Luo Dor Thab.

bractes

~~bractes~~

punctata et numerica

angustifolia

~~numerica~~

~~punctata~~

bractes Anthol. lucida

numerica

marmoratus Glad foliis ensiformibus nervosis glabris maculosis, floribus
duplicibus, stylo separatis La Mart. T. Enci: pag 110.

Habitat in Cap. b. frei

gladulus paniculatus foliis linearibus, floribus horizontalibus sessua
dis im maculatis, petalis inferioribus longioribus La Mart

Dict. 2. p. 727.

Breyn. prodro. 24. t. 12. f. 1.

non vidi

an eadem in pennis
Marta Dubra

Substylacibus

villosi

Spicis secundis
corollae tubo longissimo, laciniis linearis-lanceolatis, ~~altis~~

72
tubiflorus 72 Gladiolus

~~muticis mucronatis immaculatis, foliis nervoso plicatis.~~
Gladiolus tubiflorus; caule tereti, tubo longissimo, & pathis foliis que his-

Gladiolus tubiflorus. foliis linearibus plicatis
gutis Lin. Suppl. 96

Gladiolus tubiflorus; polystachyus tubo corollae longissimo, & pathis
tis villosis, florum foliis que ellipticis plicatis hirsutis Thunb. Nov. I. c. 23. t. 2. f. 2.
altornis secundis, Gladiolus tubiflorus, foliis linearis-lanceolatis villosis subplicatis & pro
tubo filiformi longioribus, tubo longissimo, & pathis hirsutis Hort. Kew. 1. p. 62.

spathis multoties
longiore Lamarck
Dict. 2. p. 724
Habitat in Cap. b. 3. p. 7

Folia radicalia, circiter 7 ex, saepe longiora, angusta, utrinque attenuata,
Gladiolus angustifolius: basi in petiolum, erecta, ^{villosa} nervosa, vix plicata. Scapus pollicaris vel subma-
foliis; hirsutus; nit., basi foliis involutus, superiora villosa-canescens. Flores quatuor circiter
foliis angustissimis quatuor, secundis vel alternis, distantes. Spathae sesquipollicares; sur-
nervis caule longiorum & sensim parum minores, villosa-canescens, tri-valves: valvulae
vibus, & pathis altis lanceolatae, attenuatae, apice glabrae; exterior longior. Corollae tubus
nis secundis, tubo filiformi longioribus: limbi lacinae lanceolatae, alternae mucronatae
Lamarck. Herb. 1. p. 119

194. 113. 1

68

substylacibus
in Lamarck

ad Lamarck

73

tubatus

~~74~~
 Gladiolus corollae spicis secundis, corollae tubo longissimo, laciniis oblongis inaequalibus. Vitis inferioribus macula rubra, foliis ensiformibus, plicatis, ~~et~~
 Gladiolus tubatus; corollae tubo gracili, longissimo; laciniis alternis ~~et~~
 mucronatis; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis; spatula bivalvi. Facqu.
collecl. Suppl. 19. 4c. rar. 2. t. 264
^{Suppl.}
B. Facqu. collecl. 19. 4c. rar. 2. t. 264.

~~75~~
 Gladiolus longiflorus; foliis ensiformibus, plicatis, villosis; corollae
 tubiformibus, longissimis; petalis undulatis, reflexis. Aodr. reper.

t. 5.
 Gelblich in Cap. 6. sp. 7

Bulbus subrotundus, magnitudine axellarum. Folium quinquę - decem unciis
 longa. Scapus teres villosulus foliis brevior, crassitie penae Columbi

nae, teres villosulus, mollis. Oculi plures, exerti; ~~quibus~~

Spatha ^{bivalvis} villosa, viridis, apice ferruginea, acuta, concava, striata, ^{et} ~~et~~ ⁱⁿ
 lacina valvula exterior integra, interdum tridentata; interior multo

brevior, bidentata. Corollae tubus cylindricus, fere tripollicaris, in
 cartilagineo albido limbo lacinae ~~concoloratae~~ unciali, acuta

ochroleuco, albidae, dorso medio purpurascante; Suprema concava,
 exerta, tres alternae mucronatae; inferiores basin versus macula
~~nigra~~ superioribus minoribus. Facqu. L. C.

+ 64

vasta

Peeringer gl. foliis linearibus - exformibus planis, fauce labii superioris trilobata
mutato. lamina unguiformibus perpendicularibus; bracteis obtusis

Art. New. 1. p. 65 *

* Habitat in Cap. b. p. p. i.

Folia glabra, spithama longiori. Scapus teretis, foliis paulo brevior, interdum ramifus. bracteis brevis, ovalis, obtusis, interdum apice inciso, membranaceis. Corolla pallide, fulva. Tubus unice brevior. laciniis oblongo-ovalis, obtusis, interdum obsolete emarginatis, tubo brevioribus: superiores tres in fauce macula flava margine rubricata, oblique angulata. lamina tribus compressis, obtusis perpendicularibus flava, diametro sesquilineari Art. New

13. Suppl: foliis longioribus: corollae non tubo rubricata: lamina laciniis superiores pallide
Gardner

74 74
panicea 47

~~panicata~~
Gladioli foliis oblongis ~~pluratis~~ villosis, vaginis glabris
corollis campanulatis, 3 patas ^{h^{ab}} trivalvibus, valvula externa
acuminata, vaginae foliis oblongo-lanceolatis vaginis glabris +
4^{ta} panicea; foliis oblongo-lanceolatis villosis pluratis distinctis, vaginis
glabris, 3 patha trivalvi, scapo polystachyo, corollae limbo campanulato
Gaey. Suppl. 12. 42. var. 24. 207.

Habitat in Cap. b. spei 4

Rubus fibroso panicatus. Stola plura, distincta, in vaginam longissi-
mam desinentia, molliter villosa. Scapus saepe polystachyus, ter lon-
gitudine foliorum, teretiusculus, inferne erectus, superne pan-
nicatus villosus. Flores erecti, circiter quini inodori, 4 pediceli.

forma essentialis spatha ~~trivalvi~~ villosa: valvula externa major, lanceolata acuminata,
Corolla saturatissime panicea, sesquipollicari: tubus cylindricus
erectus: limbus campanulatus; calicines lanceolatae, subaequales,
patentes & imae, tribus alternis mucrone in noxio terminatae.
Gaey. l. c.

Varietas floribus majoribus, minoribus.

~~Squalida 4. foliis linearibus lanceolatis, floribus alternis sessilibus, tubo bracteis longioribus, lamina ovato-oblonga Hort. Kew. 1. p. 614~~

~~patula a lamina cuneiformi-oblonga obtuse emarginata basi subhyalina
fructu 13 foliis fructis, lamina ovato-oblonga integerrima basi concoloribus~~

~~Habitat in Cap. b. p. c.~~

~~variet. a. Fr. ovata valde affinis: differt lamina corollae angustioribus, magis pellucidis ideoque venis extantioribus; leviter emarginatis. Color corollae pallide nivescenti seu foveida carneus, cum parvo flavo-auri.~~

~~var. 13. Folia acuminata, fructu, plana, glabra, vix fulturanda. Siquis teres, glaber, foliis duplo longior. Flores sessiles. Bracteis duobus ad basin singuli germinis membranaceis, apice fuso, vix seminatiles. Corolla 1 petala, pallide lactea, venis obscuris. Lacinia limbi ovato-oblonga, obtusiuscula, integerrima: exteriori prope apicem rubicunda; interiorum una exteriori paulo latior Hort. Kew.~~

75 ~~77~~
purpurea ~~77~~ Gladulus foliis ensiformibus, pediculis villosis, vaginis glabris, stape dentis
noto Corollae patentissimae, laciniis oblongis acutis, spathae trivalvibus
acutis, foliis lanceolato-ensiformibus, vaginis glabris, +
Stipa purpurea; foliis ensiformibus villosulis pluriatis distinctis, vaginis
glabris, spathae trivalvi, scapo polystachyo, corollae limbo patentissimo
Facqu. collect. 3. p. 262. G. rar. 2. t. 206

Habitat in Cap. b. spec. 2

Folia plura, erecta, basi longe vaginantis, acuta. Scapus longitudine
foliorum, pauciflorus, villosus. Spathae ~~in trivalvi~~, univale ~~acuta~~,
valvula exterior longior. Flores distincti, saepe terni. Corollae tubus
paucide purpurascens: limbi lacinae subaequales, ~~laciniobtusae~~
patentissimae, longitudine tubi & aetate purpureae. Facqu. loci.
An modo varietas praecedentis? paucum differre videtur.

Cinnamomea tria foliis lanceolatis crispis, floribus alternis Thurb. d. sp. p. 10* S. V. p. 824
Garia cinnamomea, foliis lanceolatis undulatis, spica secunda Lin. Suppl.
neg. 92.

Habitat in Cap. bone spici collebus

Fl. suave olet istar Cinnamomum

Bulbus conicus deorsum imbricatus; truncatus, margini acuto fibroso, glaber
magnitudine pipi. Scapus simplex, teris, flexuoso-erectus, vincti-purpureus,
glaber, spithameus. Folia radicalia duo, margine obverso vaginaria, ob-
tusis, subfalcato-reflexo, nervo medio elevato, scapo triplo breviora.
Potyledones unicum, amplexicaule, ovatum, obtusum apice reflexum, inte-
grum, glabrum, unguiculare. Caulina duo spathiformia, remota: inferius
convoluta vaginans, vagina longa, apice compressum, obversum pollicem
superius unguiculare. Flores secundi 3-9, erecti. Rachis subflexuosa, glabra
Spatha ext. tenor coriacea, obtusa cum acumine, apice perspurascens
interior apice bifida. Corolla tubi ~~calyce longius subunguiculari~~
perspurascens. Limbi lacinae 3, utraque alba: ext. tenor tres ext. duo pers-
purascens. Stamata Thurb.

Differetia gl. Adriolo capite foliis lancanibus caule aphyllis tubo corollae
spatha vix longior, petalis obovatis, scapo brevior

non vidi

76 ⁴⁷
mucronatus ^{pub} Gladiolus corollae subringentibus; spathis trivalvatis integerrimis,
foliis margine hispulis, vaginis basi quoque angulato-glabris +
Gladiolus mucronatus; corolla subringente, mucronata; foliis
cuneiformibus, plicatis, hispulis, spatha trivalvi villosa; scapo
ramoso. Jacq. collect. 4. p. 162. Fr. var. 2. t. 253

Gladiolus ringens; polystachyus, foliis plicatis hispulis; corolla
ringente, spathis hispulis Thunb. prodr. 186. Art. 800. h. n. hupf.
vol. 6.

Habitat in Cap. b. spec. 7

Folia radicalia plura, distincta, triquadripollicularia, nervosa,
margine hispida: vaginae longae, in petioliformes. Scapus foliorum
altior, raro simplex, pauciflexuosus. Flores subsessili,
plures. Spathae vides: valvulae lanceolatae, concavae, hispidae
ciliatae, striatae. Corolla biunilobis; tubus longitudine spa-
thae, pubescentibus, pallidus; fauce flavescens. Limbus labii
superioris tres superiores cuneiformes, obtusae, mucronatae, dilute
purpureo-violaceae; inferiores patulae, magis que flavae. Stigmata

teretifolius

subro spathis nervosis linguatae ^{per} laciniis oblongis subaequalibus, tubo,
foliis Bubulatis varietibus.

~~91. bit. ... sp. Bulow~~

Habitat in Cap. b. sp. Bulow

Scapus semipedalis, teres, tri-vel tetraphyllus, vaginis foliorum tantum
tutus. Folia altitudine scapi, subfiliformia, acutis pinnis: vagi-
nae arctae. Spica sesquipedalis, disticha pubescentiata.
Diuiter diodeca in flora. Spathae viridiusculae, ferru-
gineae, obtusae, multinerviae. Corolla corpurpurea - coru-
labens, parva; tubus albidus purpureo lineatus.

~~Conjungitur a Humboldt cum fruce villosa fragrans.~~

~~Corollae plura minime albae, vel sordidiorum, vel flavascentes. Spathae
scapus purpureo villosus, compressus. Folia diglossa - pithomosa, adscissurae bipin-
nae, ^{ovatae} ~~ovatae~~ ^{obtusae} ~~obtusae~~, obtusae, longiusculae sub-~~
Humb. l. c.

Optice Estacosa fragrans. l. c.

77 ~~78~~
villosus 77 Glaudiolus corollis subampumulatis distichis, ^{triphyllis integerrimis} tubo & spatheo sequen-
te, laciniis linearibus subcuneatis, foliis oblongo lanceolatis
trixia villosa foliis oblongo lanceolatis subacutis villosis
subplicatis, tubo & spatheae aequali Hort. Kew. t. p. 50
Habitat in Cap. b. spei. Ex herbario Royeni &

Totus villosus tubus praeteriti anni lateralis, tunicatus, subovatus, mag-
nitudine a vallanae. solia ~~vag~~ in petiolo vaginante desi-
nenti, bi- tripollicaria, semipollicem lata, acutiuscule,
fenuiter venosa nervosa, subplicata; unicum sessile,
lineare inferne in Scapo. Scapuli & pitha maeus, canescens.
Spica interdum simplex, interdum inferne ramo cincta.
Stylor quinque ad septem, parum distantes, duplo vel triplo
minores quam in Glad. plicato, violacei. Spatha ~~triphylla~~
valvulis linearibus, acutis, integerrimis, apice & labris.

Longitudine ~~vagi~~

~~Hort. Kew. t. p. 50~~ Gaëquini
trixia villosa (michi videtur diversa). a Glad. plicato differt.
corollis minoribus spatheae valvulis integerrimis; corollis
minoribus; laciniis limbi angustis.

plicatus 2^o *Gladiolus* corollae campanulatae secundae, spathe trivalvi, val-
vula exteriore tridentata, foliis oblongo lanceolatis

Sisyrinchium latifolium, floribus patentibus vix difformibus Breyn.
4c. rar. 22. t. 9. f. 2.

Axia plicata, foliis ensiformibus plicatis villosis Lin. amoen.
acad. 4. p. 300

Axia flabellifolia, foliis flabelliformibus, corollae tubo spathe
duplo longiore De la Roche Diss. n. 12

Gladiolus plicatus, foliis oblongo ensiformibus plicatis villosis,
scapo laterali, corollae regularibus Lin. spec. pl. 53

Gladiolus plicatus, foliis oblongo lanceolatis villosis plicatis,
tubo spathe longiore Herb. Vern. 1. p. 63

Gladiolus plicatus, corollae subcampanulatae secundae, foliis
ensiformibus, plicatis, hirsutis; spathe trivalvi, valvula
interiore tridentata. Faiqu. collect. 4. p. 155. 4c. rar. 2. t. 257

angustifolius B. Faiqu. collect. 4. p. 156. 4c. rar. 2.

Habitat in Cap. b. spec. 4 subreticulata, digitalis creta vel acuta
Bolia bene circiter bene, scapo paulo longiore, obtuso, crasso
Bene apice obliqua, villosa, mollia, nervosa plicata, nervosa
seta

^{pedalis,}
~~capis~~ ^{flexuosus} (simplex vel ramosus, ^{distichi} ~~horis~~, villosus, subaerescens: Rami brevissi-
mi, inferiores longiores. Flores primum alterni, dein secundi. Spathae
villosae in rachide ~~villae flexuosae~~. Corollae lacinae ^{subaequales, undulatae} ~~marginatae crispae~~
praesertim inferne, ^{oblongae, obtusae, rotatae;} ~~saepius flabelliformia, saepe~~ ^{trig. usque terminalae} ~~quadratae in apice~~
~~ut in Ate~~
Folia flabelliformia, saepe quadrata in apice ut in Arela Thuab.

79 ~~80~~
fragrans 24

Gladiolus corollis subcompunctatis secundis, spathis trivalvulis in
teyernis, foliis ensiformibus +
gladiolus fragrans; corollis subcompunctatis, secundis; foliis ensi formi-
bus plicatis, hispidis; spatha tribus valvulis integerrimis omnibus Faeger
Bot. Schoebr. p. 7. t. 14.

Habitat in Cap. b. spec. 4

Spathae Valvulae apice & cariosis. Odor fragrantis & sive Faeger l. c.

77
+ caulis ramosus et simplex affinis plicato at spathis ab illo diversis f. mammosa

flexuosus G. corolla argentea tubo spatha acuta longiore; scapo flexuoso
Thunb. Fl. n. 2. Tab 1.

Habitat in Cap. b. p. c.

Scapus teres sesqui digitum valde attenuatus, pedalis erectus
Folia nulla sub florescentia, nisi supra spaci angusta
ternata. Spatha lanceolata-oblonga acuminata, glabra
tubo corollae parum brevior. florum spica ovata florum
parum magis approximata. demum parum remotiore
Corolla alba & ornata. limbus argenteus. Thunb.

x

80
Sambucinus. Gladiolus corollis campanulatis, laciniis alternis subplicatis,
spatha bivalvibus, foliis ensiformibus; scapo ^{sub} compresso +
gladiolus Sambucinus; corollis campanulatis; foliis ensiformibus, subplicatis,
villosis; scapo ramoso glabro; spatha bivalvi; laciniis corollae
alternis undulatis. Faerq. hort. Schoen: 1. p. 7. t. 15

Habitat ad Cap. b. spei

folia, adiacentia circiter quatuor, plerumque scapo longiora, sex-
pollicaria, oblonga, & loco quini. Corollae laciniis oblongae, ob-

Coerulea, basi
macula lutea: trisae, subaequales Corolla # laciniis oblongae, obtusae,
subaequales Faerq. l. c.

77
+ of valde affinis gl. plicato et diversis spatha. Scapi compressus ramosus, floris coeruleis
basimaculata lutea.

imbriatus? foliis ensiformibus, floribus imbricatis Lin. Spec. pag. 52. 7

Habitat in Russiae Senose 74

† Flores parvi versus unum unum latus imbricatis Lin. in
Georg. iter. l. p. 196

forte Antholyza speciosa Thunb.

non vid.

87
latifolius ~~St~~ Gladolus corollae tubo & spathe breviora, foliis lato lanceolatis & capis lon-
gioribus. †

gladiolus latifolius; Linnæus, foliis lato-lanceolatis plicatis nervosis ma-
xime longioribus, tubo & spathe breviora Lamarck. illust. 1. p. 119

Habitat in insula Francia. Commerson †

marginatus ~~Spica polytachya, foliis ensiformibus nervosis margine~~
~~incrassatis, spicis pluribus adpressis, tubo incurvo, stigmatibus bifidis~~

~~Hot New 1. p. 59.~~

~~gladiolus marginatus in foliis cartilagineo marginatis glabri multi-~~
~~nerviis, spica elongata, floribus alternis nutantibus ten-~~

~~Suppl. pag. 954~~

+

gladiolus marginatus polytachyus, spica longissima, floribus alter-
nis ternis, foliis ensiformibus multinerviis marginatis tubis
gl. n. 20

Habitat ad Cap. b. sp. 6

scapus simplex et polytachyus, subligosus foliis vaginatis
teris glaber sonetis, crassitie sepe penna clypea, pedalis vel 4
pedalis. Folia ensiformia, vaginantis scapo breviora, semipol-
licem vel ultra longa, cras in medio et margine vix vix crassius
flavescent marginata, nervi minoribus elevatis lineata, glabra
specia inferiora longiora pedalia et ultra superiora breviora,
mita media. Flores magni terni. alterni. Spica digitalis vel pedalis
4 cernuus

02

Secundus ~~82~~ ^{multiflorus} ~~Gladolus. Epilobium secundum in albidis, spathis glabris apice laevibus~~ ^{membranaceis}
~~no, perispermatis longioribus +~~

gladiolus secundus; polystachyus foliis plicatis hirsutis, corolla vigin-
 gente, spathis glabris Thunb. prodr. 186. Act. Soc. h. n. hafn. 6 t.
 Cum fig.
 Habitat in Cap. b. spec.

Folia scapo multo breviori, subperfoliata, plura usque sex, plicata
 multinervia, hirsuta - Scapus spithameus, profunda descendens; flexuo-
 sus, tenax, glaber. Flores in ramis flexuosos, plurimos, interdum quor-
 decim, secundi. Spathae vix seminaequilares, membranaceae, apice
 laeviores, striatae, brunneae. Corolla tubus, spathis vix longior
 filiformis. Thunb. l. c.
 Flores distantes

Coenobii

83 84

paleaceus ~~84~~ Gladiolus spicis imbricatis, corollae tubo filiformi, spathis membranaceis hyalinis longiore, foliis linearibus
Habitat in Cap. b. Spei. Ex herbario Preyeri &

Dolia scapo brevioris. ^{nervosa} Scapo inferne vaginatas pilis raris adspersus,
~~nervosus~~. Spica tri pollicaris. Spathae paleaceae, lanceolatae hyalinae,
ferrugineo-maculatae et striatae. Corollae tubus bracteis duplo longior
filiformis.

80

fol. linearibus, nervosa, scapo piloso, bracteis imbricatis

nitescens glaberrima hispida pubescens, foliis lanceolatis plicatis
nerviis, caule ramoso, spathis distinctis tubo brevioribus. La Mart
T. Enc. pag 119.
Habitat in Cap. b. frei

non redi

~~Sp~~
Spathaceus 24 Gladiolus spicis imbricatis, corollae tubo spathis membranaceis gla-
bris longiore

Gladiolus Spathaceus; caule ramoso, floribus spicato-imbricatis, nec spathis
membranaceis aristatis, foliis plicatis Lin. suppl. 96. glabri

Gladiolus spathaceus; polytachyas; ^{spathis} membranaceis aristatis, foliis ensiformi-
bus plicatis hispidis Thunb. Glad. n. 25.

Habitat in Cap. b. spici 4

Folia longitudine scopi. Scapus spithameus. Flores albi spicae digitales,
plurimae. Flores imbricatis Flores spathis multo longiores, albi. Spatha
saepe lacera. Similis gl. tubifloro et plicato Thunb. l. c.

communis gl. corollis cernuis, tubo simpliciter, foliis ensiformibus multiner
vis Thunb. gl. n. 9

gladiolus floribus univertis dispositis major et procerior Bauh
pin. 41.

B. gladiolus utrinque florus Bauh. pin. 41.

gladiolus communis; foliis ensiformibus, floribus distantibus
Linn. L. V. p. 86

Habitat in Europa aequali &

capus bipedatus erectus teres simplicissimus, ultra medi
um vaginatus folia obversa, alternatim vaginantis
ensiformia, 9 nerva scapo multo brevior, pollicem lat
florificandi. rachis flexuosa spathe lanceolata
tubo corollae longior

† strictus ~~et~~ Gladiolus spica racemosis secundis imbricatis, corollae tubae & spathae brevioris
ore, foliis lanceolato-ensiformibus plicatis, & capis anguloso
gladiolus strictus; foliis linearilanceolatis villosis plicatis, tubo & spa
thae aequali Hort. Kew. 1. p. 63.

Gladiolus nervosus; foliis ensiformibus plicato-nervosis villosis,
racemulis pluribus alternis, tubo & spathae brevioris Lamant. dict. bot.
2. p. 724 illust. v. 1. p. 119

Habitat in Cap. b. sp. 4

Scapus ~~caulis~~ erectus, pedalis, flexuosus, angulosus, griseo-villosus. foliis caule
breviora vel fere aequantia, pollicem fere lata, basi attenuata, acuta.
Spica racemosa, plerumque ternis, rematis, patentibus, quadri-^{acutis} septemflori.
Flores saturate coerulei, spatha triphyllo ^{acutis} univalves, ^{acutis} peltatis: valvula

† obtusa, mucronata ex terior linearilanceolata, duo interiores breviora panem breviora, angu
lata, villosa
† flores, acuta, corollae tubae & spathae brevioris, laciniis alternis mu
cronatis.

~~pyramidalis glab. specia pyramidalis longissima basi laxa subramosa
floribus amplis liliaceis, stylo tripartito bifido la m. m.
T. Enc: pag 110
Habitata C. b. specia
specia sesquipedalis~~

mollis
Stylidatus

86

~~Antholyza~~
~~Stylidatus~~ ~~Antholyza~~ Gladulus spicis alternis secundis sessilibus imbricatis, spathis
villosis apice membranaceis longitudine tubi.

Antholyza hirsuta; foliis ensiformibus, angustis nervosis; caule striato
hirsuto; floribus ascendentibus, in spicas unilaterales dispositis.

Lamarck Dict. bot. 2. p. 201.

Gladulus sulcatus; hirsutus; foliis linear-ensiformibus, floribus
nigentibus ascendentibus in spicas secundas dispositis,
staminibus exsertis Lamarck. illustr. 1. p. 119

Habitat in Cap. 6 spicis

Scapus caulis erectus sesquipedalis, erectus, striato-angulatus, superne
flexuosus, villosocanescentis, inferne aetate glaber. folia spicis
thamaca et ultra, vix unquam lata, spicis sursum breviora et
angustiora, striata, molliter villosa. spica alternae, sessiles
quatuor, remotae, octo-decimflorae, secundae, ascendentes,
imbricatae. spathae trivalves, villosocanescentes: valvula exte-
rior semipollicari et parum ultra, linear-lanceolata, striata
obtusae cum mucrone, interdum bifida parum bifida, apice membra-
nacea, fasciata, glabra; interiores breviores, lanceolatae, attenuatae,
vide

acutae. Corollae ^{fere bipollicari:} Tubus spatha vix longior: Limbi laciniæ angustae. Stamina
limbo parum longiora

Differet a Gladiato striato: foliis modo striatis nec nervosis: valvula exterior
spatharum duplo longius: corollae tubo crassior, sensim in limbum desinens,
spatha longiora, nec filiformi spatha breviora. a Glad. Spathae
spathis non membranaceis, gla nec glabris, foliis minime plicatis; Spathis
non membranaceis, nec glabris. Ab Antholyza plicata; foliis non plicatis,
nervis exstantibus; Spathis lineari-lanceolatis, nec ovatis.

Stonbury Hill. North of the corner of Dorchester Lane.
von Hayn, Dr. Florae Kopenhav.
Herb. Borom. Kopenhav.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

omenus cogniti

pyramidalis
lacinatus
punicus
Gla. videtur hirsutus, foliis linearibus
variosis, p. tubis longioribus p. et alii apicis
Anomorphosis multonata
Anomorphosis multonata
Anomorphosis multonata

Gla. idus foliis lanceolatis nervosis, floribus sessilibus-
imbricatis, tubo linearis, longitudine spatulae Burm. prodr. 2

Gla. idus foliis ensiformibus laciniis, floribus, tubo fili-
formi longisimo. Burm. prodr. 2.

Gla. idus foliis linearibus, floribus horizontalibus secundis
immaculatis, petalis inferiori paulo longioribus Lamour. Diet.
bot. 2. p. 127.

Gla. idus flore ferme regulari miniatu, angustifolius Brey-
no ii. var. 24. t. 12. f. 1.

Varietas Gla. angustifolia ^{gu} secundum Burm. prodr. 2. an potius
varietas Gla. brevifolia?

Plures adhuc species tam hujus quam precedentis in Andr. ^{generis}

Gla. idus. Notrepotit. inveniri vidi ex Ephemeridibus variis, sed cum non
Herb. 847.
pl. 11. p. 65. nisi sexaginta tria ad me pervenerint, et sic tandem modo mihi
t. 79. f. 3 non nisi ex solo nomine Virioli notae, eas ~~est~~ ^{est} enumerare

requies. cum nullum

Habitus: Scapus plenisque teris. Solia margine altero vaginantia, Stria
ta. Floras sessiles. Antho flexuosa. Floris sessiles.

Genus, quod characteris praecedens quoad ad differentias specificas
difficillimum, non pro Veris quod plures non nisi variantas sunt
et haepe ut nisi colore diversi, cum vero ab autoribus uti species distin-
ctas habentur ab a plurimorum opinione recedere nobis. Semina gladiolorum
secundum Gaertnerum. anillata blunt