

Gleditsia

1. Inacanthos G. caule junis triplicibus acillantis
2. inermis G. caule inermi

Chenopodium Gleditschii

Herb. Gleditsia
Iner a ^{superior} axillares, solitarii, compositi. Folia in omnibus foliis sessilia,
pari, 7 puz inferiora opposita, superiora alterna, oblonga, obtusa cum mucroni, crenulata
crenulata, glabra.

Brachi purpurascens, striati. Spina bicollicaris, compressa, spinuli laterales
3-4. ~~an~~ remoti alternis armata.

Tetracanthos γ caule spinis triplicibus aculearibus Linn. L. V

Acaia americana, abrus folio, Triaanthos Planch. man. 1. 7. 352.

Fig. 1.

Melilotus Mitch. gen. 15.

Gleditsia spinosa DuRoi. arb. 1. p. 266. 7. 105.

monosperma β . Acaia abrus folio, Triaanthos, Capsula ovali unicum semen
claudente Catesb. car. 1. p. 43. 7. 43.

Habitat in Virginia γ

Arbor Ramis ultimis teretibus in cornibus glabris inferioribus spinis
recta horizontali bipollicari basi utraque spina breviori acuta
Folia inferiora bipinnata 7 jugis. folioli 12 jugis pinnae sesquialtera oblon-
gi mucronatis venosi inferioribus alternis. superiora pinnata
15 jugis folioli pollicariibus ^{inferioribus mucronatis} ^{superioribus mucronatis} ~~prevenis~~ petiolati obtusi apice
subseriatis ovato-oblongi venosi glabri petioli vellosi. Pedunculis
foliariis ex eadem gemma cum foliis plantis. ramulus ad eorum
tam foliorum gibbosus flores racemosi distantes.

polyperma α . Leguminibus polypermis, folioli lineari-oblongis

horrida γ folioli ovato-oblongis, spinis cebernis.

varietas δ . non vid.

inermis G. caule inermi Len. Spec. pl. puz. 1509

Acacia javanica non fructifera, foliis maximis splendens. Plukn. alm.
6. t. 123. fig. 3.

Acacia americana non fructifera, flore purpureo, staminibus longioribus
siliquis planis villosis Mill. ic. t. 5.

Habitat in Java

Folia bipinnata: parvula quadrupla: inferius minoribus. Pano glabra
acuta nitida. Petiolus communis terminatur fune miti Len.

non vid.