

Glinus

1. Colocoides G. caule herbaceo procumbente, foliis obovatis  
<sup>procumbente, prostrato</sup>
2. Didamnos G. caule frutescente, foliis orbiculatis tomentosis planis
3. Sediflorus G. caule frutescente erecto, in scapo foliisque obovatis plicatis pubescenti  
canis.

*Ditamnoides* fl. caule n. goso, foliis orbiculatis tomentosis. Burm. ind

113.

alpine totoides, *Ditamai* cretici foliis; madagascariana Planch  
alm. 10. 1. 356. fig. 6.

Habitat in India orientali.

Caulis plures, basi crassitie via feli emportici, diffusi  
subramosi. rami superne alterni, pollicares uti caules  
superne tomentosi absque peli conspicuis ut in antea. Edia  
se. loba petiolata duo ad quatuor, basi subaerata.  
avenia enervia, plana tomentosa & peli stellatis  
brevibus quora in totoides. Peduncululi ad gemmulo  
aggregata breves. Calycis foliola

caule fruticoso

plano

1. Cotoides *g.* caule piloso, foliis obovatis Loez A. 145. & S.V

alpine helotropis cognata Cup. hort. Path.

alpine cotoides sicula Boc. sic. 21. t. 11.

Portulaca bethica, lutescens, spina aquatica Bar. ic. 470. t. 336

Habitat in Hispania in Apam adyosus, locis mundatis &

Caulis plures <sup>for</sup> pedales undique diffusi, procumbentes, pilos  
coni ramosi. Rami alter ni ramulosi, pilos <sup>coni</sup> <sup>rami</sup>. Folia

obovata, petiolata <sup>bina</sup> <sup>vel</sup> <sup>terna</sup> <sup>ad</sup> <sup>unum</sup> <sup>latere</sup> <sup>caulis</sup>  
palleiana, <sup>cras</sup> <sup>fuscula</sup> <sup>sub</sup> <sup>ter</sup> <sup>na</sup> <sup>ad</sup> <sup>unum</sup> <sup>latere</sup> <sup>caulis</sup>  
undulato subpleiata, palleiana inaequalia, utrinque foliis

stellatis cineri. Flores pubescentes ad gemmula et folia 4-6.

peduncululi brevissimi, persistentes foliola calycis lanceolata  
acuta coriaria persistentia. Nectari foliola bifida

caule herbaceo piloso, procumbente foliis obovatis

specimen in herb. Mus. a Loez lectum in Egypto an sanctus, foliis lanceola

tis utrinque acutis, alia obovata, pauciora  
Helostemum hesperium est secund. herb. Boyni gener. Cotoides

2 Sesiflorus Glinus <sup>Glinus</sup> foliis <sup>ovatis</sup> obovatis plicatis, caule fruticoso, <sup>terceto</sup> folioli calycinis  
Glinus Sesiflorus caulibus diffusis, floribus capitatis, axillaribus  
Sesiflorus Loefl. Desf. pag. 95.

Habitus reliquorum. Tota planta, e pulis densiformis incana: pili  
congruis quam in Gline Lotode.

Caulis de horto ramosissimus: rami diffusis, articulatis, ad genium  
li parum crassiores.

Folia ad genicula 2-4 basi acuta, subretusa, plicato undulata,  
angustialana  
x lores axillares, plures. Pedunculi brevissimi. Spirula rigida, minuta,

e basi pedunculorum, persistentes

Calycis foliola ovata.

Capsula ut in Gl. Lotode

Dictamnoides Glinus caule rigido, foliis orbiculatis tomentosi pilis  
plano, caule frutescente prostrato, foliis calycinis lanceolatis  
Glinus dictamnoides caule rigido, foliis orbiculatis to  
mentosi Lin. S. V. 455

Caules plures, crassitie via feli compressi, <sup>prostrati,</sup> diffusi, subramosi

Rami super ne alteri, uti caules super ne tomentosi  
pili tamen <sup>minus distincti</sup> non <sup>quasi in</sup> conspicui uti stipulae glaberrime

Folia petiolata, duo vel quatuor simul, basi subaequalia, ov  
ata, enervi, plana, tomentosa e pilis stellatis, bre  
viora <sup>sub</sup> quam in totoide.

Pedunculi ad gemmula, aggregati, boves.

Calycis foveola lanceolata.

3 retajum P. foliis cuneiformibus, caule intricato  
Pegonum retajum foliis <sup>sub</sup> carnosis, sessilibus, cuneiformibus retajis  
Boiss. Desj. pag. 21

Habitat Alexandria <sup>regium</sup>  
Frutex ramifera, diffusus <sup>rami</sup> alterni <sup>vestis</sup> <sup>gubri</sup>  
subvellosi, tuberculati et capsae foliorum  
Folia plura, unguiculata, sessilia inaequalia, obtusissima  
carnosa arena integerrima tenuissime villosa  
subcaespitibus. Flores in racemulis brevissimis ex eadem  
gemma ac folia, folia pedunculata folio breviora. Calycis  
siliis villosis caneris videtur. Petala oblonga extus  
villosa.