

Globularia

Spelman's Glob. nana et repens eadem planta herb. Desfont

*Globularia alpina minima* organifolia Tournef  
Caulis basi ramosi, digitales. Folia longe petiolata herb. Tournef

*Alypum* J. caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque. Lin  
S. V.

*Thymelea* foliis acutis, capitulo fructifero Bauh. pin. 463.

*Alypum* mons peliansum J. frutex Terribilis Bauh. hist. 1. pag. 598  
Nesf. Act. pans. 1712. pag. 376. Tab. 10.

*Globularia fruticosa* Smyth. foliis tridentatis Garid. aus. 210

*Hymnolophum sabardinum* Clus. hist.

Habitat in Gallopr. Valentia et Italia ad rupes et saxatosa  
ramuli <sup>pubescentes</sup>

Frutex ramosis glaber cortice cinereo. Folia inferiora ramo  
nim fasciculata saepe 10 <sup>inæqualia</sup> superiora alterna, petiolo la basi  
parum attenuata, acuta apice mucronata integra vel tridenta  
ta unguiculata glabra <sup>avenaria</sup> capitula ~~terminalia~~  
plenaque saepe terminalia interdum ad apices ramorum  
axillaria, <sup>magnitudine Cerati</sup> alterna solitaria sessilia. Calyx imbricatus  
Squamis ovatis obtusis subbilatis

capitulis terminalibus

axilla vibusque subsessilibus

Longifolia globularia caule fruticoso foliis omnibus lineari lanceolatis integerrimis  
~~foliis~~ ~~globularia~~ ~~caule~~ ~~fruticoso~~ ~~foliis~~ ~~omnibus~~ ~~lineari~~ ~~lanceolatis~~ ~~integerrimis~~  
Olym<sup>us</sup> ~~capitulis~~ ~~axillaribus~~ ~~pedunculatis~~  
Habitat in Madera 5

Frutex quadripedalis erectus. Rami glabri superne angulati, nusquam spiciferi.   
Folia subpetiolata, alterna bi- / tri-polluciana, lanceolata utrinque attenuata, integerrima vix venosa, glabra. Pedunculi in axillis superioribus solitarii unguiculati villosi inferne squamis ferrugineis ovatis subimbricatis superne nudi. Capitula solitaria magnitudine pisi.   
Tolola calycis ovata villosa <sup>apiculis</sup> propositum margine

Olymum five herba Vernitilis procerior, cortice cinereo si abro, foliis acuminato longior Sloan hist. jam. 1. p. 14. tab. 5. fig. 3.  
Globularia longifolia caule fruticoso, foliis omnibus lineari lanceolatis integerrimis, capitulis axillaribus. Hort. Kew. 1. pag. 130.

*minimus Pentadulus*

*ad anagallidis Genus amandatus*

Bisnaganca J. caule fruticoso, foliis radicalibus cuneiformibus retusis,  
caulinis canaliculatis ~~superioribus subdecumbentibus~~ <sup>inferioribus</sup> canaliculatis  
Scabra bisnaganca f. globularia frutescens, rigidis foliis rotun-  
dioribus cordatis monf. her. 3. p. 51. Plukin. alm. 336. tab. 50

fig. 5.

Habitat in Bisnaganca <sup>superioribus</sup> ~~superioribus~~ <sup>inferioribus</sup> ~~subdecumbentibus~~ <sup>subperfoliata</sup>  
rami glabri. Folia <sup>inferioribus</sup> ~~superioribus~~ <sup>angustiora</sup> ~~subdecumbentia~~, canaliculata tri-  
nervia integerrima unguiculata vel parum ultra. Pedun-  
culus terminalis elongatus apicem versus adpressis squamis  
nonnullis minutis. Capitulum terminale solitarium sub-  
globosum. Calycis communis foliola duplici serie ovata.

vulgaris *g.* caule herbaico, foliis radicalibus *tridentatis*; caulinis *lanceo*  
*latis* Lin. S. V. *it. oct. 654*

*Aphyllanthes amguellare* Cam. hist. 10. t. 7.

*Bellis corulea caule folioso* Bauh. pin. 262.

*B. Bellis corulea apula* Tabern. hist. 2. p. 709

*B. Bellis corulea montpelica* Tabern. hist. 2. p. 709.

Habitat in Europa apud *Duris* *g.* *tenuis* *pubescenti*, *integerrima*

*glabra* *caulis* *plures* *erecti* *simplicissimi* *6 pollicares*. *Folia* *radicalia*  
*oblonga* *retrolata* *oblonga* *basi* *attenuata* *unguiculata* *venosa*  
*in pedunculis* *obtusis* *obtusis* *venosa* *subtridentata* *caulina* *trifolia* *alternis* *erecto*  
*patentibus* *acutis* *unguiculata* *superioribus* *minoribus*. *pedunculibus*  
*ternis* *capitulum* *terminali* *solitarii* *perispermum*  
*maior* *globosum*. *Squamae* *Calycis* *communis* *lanceolatae* *dupliciter*  
*terni*

caule herbaico folioso foliis radicalibus oblongis subtridentatis  
caulinis lanceolatis

*Spinosa* g. foliis radicalibus <sup>lineariformibus</sup> crenato aculeatis; caulinis integerrimis muc.  
natis

Bellis spinosa, flore globoso Bauh. prod. 121.

Bellis ? cœnea spinosa Bauh. pin. 262.

Habitat in collibus Hispanis &

radix superne divisa. Caules plures palmares vel frithamoi erecti.

# defuncti

simplicissimi, glabri, striati. <sup>in pedunculis simplicibus</sup> folia radicalia cuneiformia  
petiolata, unguiculata rigida, glabra ovata emissa, crenu-

lata tridentata. caulina pauca <sup>interdum</sup> superne via alla peltata  
f. radicalibus depressis minoribus acuta sursum versus sensim

remotiora. Capitulum terminale globosum solitarium  
magnitudinis junci. Calycis foliola lanceolata uti palea

rigidi sicula subperungentes

a gl. vulgari differt foliis radicalibus rigidis subserrulatis  
caulinis paucioribus.

Cordifolia caulis subnudo, foliis canei formibus <sup>prostratis</sup> tricuspidatis, intermedio  
minimo, stolonibus <sup>prostratis</sup> foliosis

Bellis montana compta montana Fr. Jacq. Bauh. pin. 262.

Scabrosa bellidis folio, humilis, caule nudo, radice repente, folio cordato Monj  
her. 3. pag. 50. f. 6. v. 15. fig. ult

Globularia cordifolia caulis subnudo, foliis canei formibus tricuspidatis,  
intermedio minimo

15. Scabrosa bellidis folio ~~minimo~~ pyrenaica minima Monj. her. 3. p. 51.

Habitat in Pannonia Austria, Helvetia, Pyrenaeis &

Radices repentes lignosae hinc inde emittentes cauliuli bipollicares foliosi  
si apice stoloniferi stolonibus repentes procumbentes filiformes simplicibus  
fimi. Folia in caulibus sterilibus petiolata alterna, et unguiculata  
obovata, glabra ~~vel nervosa~~ <sup>vel palmatis</sup> ~~emarginata~~ tridentata dent intermedio brevior  
scapi digitales <sup>vel palmatis</sup> filiformes striati, folio uno vel altero lanceola  
to instructi, simplicis fimi. Caputulum terminale globosum plus duplo  
major. Foliola calycina duplici serie ovato-lanceolata subulata  
aliam habet foliis ad majoribus nervosi ad radicem aggregatis stolonibus  
nullis, Scapo folio brevior

nudicaulis? Caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis

Aphyllanthi Textri legit.

Bellis coerulea caule nudo Bauh. pin. 262

Scabra bellidis folio, humilis, caule nudo, radice non repente  
mon. hist. 3. p. 50 f. 6. tab. 15. fig. 4.

Habitat in Pyrenaeis et austro montibus?

Planta caespitosa. Folia radicalia, digitalia extorsum unguem lata  
lanceolae cuneiformi lanceolata in petiolum attenuata, avenae  
enervia, glabra, integerrima, parum emarginata minime vero denta  
ta. Scapus erectus foliis duplo altior saepe folio <sup>lanceolato</sup> ~~novo~~ novo in  
medio teres substrictus. Capitulum terminale majus quam in  
reliquis hemisphaericum. Calycis communis foliolo duplici sine glabe  
rima lanceolata

-----  
cuneiformi lanceolata emarginata

orientalis Globularia caule subnudo, capitulis alternis sesquibus, foliis lanceolato-ovatis  
integris Lin. Spec. pl. 140\*. L. V. pag. 143.

Globularia orientalis floribus per caulem sparsis Tournef. Corol. 35.

Habitat in Natolia 24.

Folia obovata in petiolo depresso, acuta, integra, nuda, plurima. Caulis  
pedalis, simplicissimus: Folia minima, lanceolata, alternis remotis. Cap-  
sula in summitate caulis, 7 ad 10, alterna, sespica Lin. Spec. l. c.